©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Zur Kenntnis der Scatopsiden Süd-Afrikas.

Von Dr. **Günther Enderlein**, Berlin.

Aus dem Museum Kapstadt mache ich folgende zwei noch unbekannte Scatopsiden bekannt.

Rhegmoclema Enderl. 1912.

Rhegmoclema Peringueyi nov. spec.

♀. Tiefschwarz, poliert glatt, der schlanke Hinterleib etwas matt. Tarsen etwas grau. Fühler dick, nach dem Ende zu schwach verdickt. Glieder sehr kurz. Haltere schwarz. Flügel und Adern hyalin, c, r, r_1, rr und der Basalabschnitt von m geschwärzt. rr in der Flügelmitte endend, etwa von Fühlerlänge. Randabschnitt zwischen r_1 und rr fast doppelt so lang wie r_1. m an der Gabelstelle entspringend. Mediangabelstiel etwa halb so lang wie die Gabel, gerade. Gabel erst schmal und wenig divergierend (nicht bauchig), Enddrittel stark divergierend. Randabschnitt der Mediangabelzelle etwa so lang wie rr. cu_1 fast gerade, den Rand nicht erreichend. Proximale Ecke von cu_2 kräftig, distale flach.

Körperlänge 2,1 mm. Flügellänge $2^1/_4$ mm.

Süd-Afrika, Durban. August 1920, gesammelt von C. P. v. d. Merwe.

Gewidmet wurde diese Spezies dem Direktor des Museums Kapstadt Herrn Dr. Péringuey.

Reichertella Enderl. 1912.

Reichertella capensis nov. spec.

♀. Tiefschwarz, ziemlich glatt; durch kurze bräunlichgraue Pubescenz etwas matt erscheinend. Fühler mäßig dick, gleichdick, nur die zwei letzten Glieder viel dünner und durch hellgraue dichte Pubescenz heller erscheinend, Haltere schwarz. Flügel milchig hyalin, Costa r, r_1, rr und der Basalabschnitt von m leicht bräunlich getrübt. rr endet am Ende des 3. Fünftels. Radiomedianquerader ca. doppelt so lang als der punktförmige Basalabschnitt von rr. Randabschnitt zwischen r_1 und rr ca. $1^2/_3$ so lang wie r_1 und etwa so lang wie der Rand der Mediangabelzelle. Mediangabelstiel fast gerade, etwa halb so lang wie die Gabel; letztere im 2. und 3. Viertel fast parallel, im Endviertel etwas divergierend. cu_1 sehr schwach gebogen, Endviertel fehlt. cu_2 am Ende des 1. Drittels stark und abgerundet gebogen, Endteil fast gerade und ziemlich steil den Hinterrand treffend, in der Mitte von außen eine Spur eingedrückt.

Körperlänge 2,4 mm. Flügellänge $2^1/_4$ mm.

Süd-Afrika, Kapstadt, Lightfoot. September 1913.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitung Stettin

Jahr/Year: 1923

Band/Volume: 84

Autor(en)/Author(s): Enderlein Günther

Artikel/Article: Zur Kenntnis der Scatpsiden Süd-Afrikas. 67