

Drei neue Cetoniden-Arten. (Col.)

Von J. Moser, Ellrich.

Lomaptera fasciata n. sp.

Ischiops. bifasciatae Quoy similis. Viridis, nitida, elytris nigro-fasciatis. Capite, vertice laevi, fronte parce, clypeo densius punctato, clypei apice nigrescente; antennis piceis; prothorace medio laevi, ad latera versus sparsissime punctato; elytris transversim aciculatis, basi impunctato, humeris, interdum etiam elytrorum basi nigrescentibus, fascia transversa postmediana, suturam elytrorumque margines laterales haud attingente, nigra, marginibus apicalibus juxta suturam leviter sinuatis. Subtus pectore fere laevi, processu mesosternali compresso, inclinato, abdomine maris laevi, canaliculato, abdominis segmentis feminae transversim setosis, segmento ultimo ubique setifero-punctato, margine postico medio emarginato; pygidio laevi, apice aciculato, in mare subconico, in femina conico, subtus utrinque impresso; tibiis anticis in utroque sexu tridentatis. — Long. 30 mm.

Holl. Neu-Guinea.

Coenochilus angustulus n. sp.

Oblongus, parallelus, niger, nitidus. Capite sat fortiter punctato, fronte leviter biimpressa, griseo-setosa; prothorace longiore quam latiore, lateribus fortiter curvatis, angulis posticis obtusis, subrotundatis, margine antico medio leviter producto, dorso sat crebre punctato, medio longitudinaliter sulcato; scutello punctato, apice strigoso; elytris leviter sulcatis, sat remote punctatis, sulcis plus minusve strigosis; pygidio coriaceo, in femina leviter impresso. Subtus pectore, medio excepto, griseo-piloso, abdomine in parte media parce subtiliter punctato; juxta latera strigoso, medio in mare concavo; femoribus tibiisque flavociliatis. — Long. 16 mm.

Congo belge: Kisanu. P. Grosseno leg.; Kabinda. Dr. Schwetz leg.

Incala Schoutedeni n. sp.

♂. *I. lineolae* Westw. similis, minor et latior. Niger, opacus, griseo et flavo-griseo-variegatus. Capite subrugoso-punctato, clypeo medio elevato, producto; antennis piceis; prothorace longitudine paulo latiore, medio angulatim-dilatato, angulis posticis parum,

angulis anticis fortius productis, dorso subrugoso-punctato, flavo-griseo-variegato; scutello flavido-marginato; elytris griseo-variegatis, macula anteapicali maculisque duabus lateralibus flavidis ornatis; pygidio, macula media nigra. excepta, griseo-tomentoso. Subtus flavo-tomentosus et erecte flavido-setosus; pedibus gracilibus, tibiis anticis tridentatis, tibiis mediis maris curvatis. — Long. 18 mm.

Congo belge: Avakubi; Haut-Uelé: Moto. L. Burgeon leg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1923

Band/Volume: [84](#)

Autor(en)/Author(s): Moser Johannes

Artikel/Article: [Drei neue Cetoniden-Arten. \(Col.\) 165-166](#)