

Anne P R O C H A S K A

Brutvogeluntersuchung an der Tauber im Sommer 1985.

1. Einleitung

Die Probestrecke befindet sich zwischen Bad Mergentheim und Unterbalbach und hat eine Gesamtlänge von 3 km (Top. Karte L 6524 Bad Mergentheim).

2. Methodik und Untersuchungsgebiet

Vom 23.04. bis 30.06.1985 wurden acht Kontrollen durchgeführt: jeweils zur gleichen Tageszeit, vormittags zwischen 6.00 Uhr und 10.30 Uhr.

Wegen schlechten Wetters wurden die Kontrollen an verschiedenen Tagen abgebrochen bzw. verschoben.

Eine genaue Beschreibung des Untersuchungsgebietes gibt PROCHASKA (1983).

3. Ergebnisse

Folgende Vogelarten konnten nachgewiesen werden. (Z.T. nur Futter suchend, oder zum Trinken und Baden am Wasser).

B = sicherer Brutnachweis

Höckerschwan	Cygnus olor	
Stockente	Anas platyrhynchos	B
Reiherente	Aythya fuligula	
Teichhuhn	Gallinula chloropus	B
Bläshuhn	Fulica atra	
Mauersegler	Apus apus	
Buntspecht	Dendrocopos major	
Wendehals	Jynx torquilla	
Feldlerche	Alauda arvensis	
Rauchschwalbe	Hirundo rustica	
Mehlschwalbe	Delichon arbica	
Gebirgsstelze	Motacilla cinerea	B
Bachstelze	Motacilla alba	B
Neuntöter	Lanus collurio	
Wasseramsel	Cinclus cinclus	
Zaunkönig	Troglodytes troglodytes	

Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	
Grauschnäpper	<i>Musicapa striata</i>	
Nachtigall	<i>Luscinia luscinia</i>	
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	B
Amsel	<i>Turdus merula</i>	
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	
Sumpfteise	<i>Parus palustris</i>	
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	B
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	B
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	
Grünling	<i>Carduelis chloris</i>	
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	

Durch Hochwasser wurden verschiedene Teichhuhnnester weggeschwemmt. Es wurden drei führende Stockentenweibchen mit jeweils 12, 6 und 4 Juv. beobachtet.

Ebenfalls zwei führende Teichhuhnweibchen mit 4 und 2 Juv.

1985 konnten insgesamt 41 Vogelarten beobachtet werden; 1983 waren es 38 Arten.

3. Literatur:

PROCHASKA, A. (1983): Voruntersuchung zur Brutvogeluntersuchung an
der Tauber im Sommer 1983. Faun. u. flor. Mitt. "Taubergrund" 3:
1-3.

Anschrift des Verfassers:

Anne P R O C H A S K A

Eisenbergweg 41

D-6990 Bad Mergentheim

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Prochaska Anne

Artikel/Article: [Brutvogeluntersuchung an der Tauber im Sommer 1905. 21-23](#)