


Heft 25-30 je 24 Kugeln

mit je 1 Textblatt

coll. cycl. BK 18/VIII.50



von Guinard in


- Tab. 1. Byrrhus murinus Hellwig.
 — 2. Byrrhus semifriatus Hellwig.
 — 3. Byrrhus minutus Hellwig.
 — 4. Byrrhus nitens Panzer.
 — 5. Silpha melanocephala Hellwig.
 — 6. Silpha hemiptera Hellwig.
 — 7. Nitidula punctatissima Hellwig.
 — 8. Chrysomela cuprea Fabric.
 — 9. Chrysomela aenea Fabric.
 — 10. Chrysomela Sophiae Fabric.
 — 11. Chrysomela Beccabungae Hellwig.
 — 12. Altica flexuosa Hellwig.
 — 13. Altica globosa Hellwig.
 — 14. Cistela humeralis Fabric.
 — 15. Cistela bipustulata Hellwig.
 — 16. Cistela linearis Hellwig.
 — 17. Cistela brevis Hellwig.
 — 18. Cistela opaca Hellwig.
 — 19. Cistela fusca Hellwig.
 — 20. Cryptocephalus auitus Fabric.
 — 21. Cryptocephalus - Clytra affinis Hellwig.
 — 22. Attelabus intermedius Hellwig.
 — 23. Bruchus luteicornis Hellwig.
 — 24. Bruchus imbricornis Panzer.

Die sämtlichen in dem fünften Hefte des *Schneiderschen Neuesten Magaz. für die Liebhaber der Entomologie*, vom Hrn. Prot. Hellwig in Braunschweig bekannt gemacht, und vom Hrn. Illiger beschriebenen deutschen neuen Insekten Arten, habe ich das Vergnügen hier vollständig mitzutheilen. Dafs ich solche *ungetrennt* in einem Hefte liefere, wird vielleicht den Beyfall der Entomologen schon darum verdienen, weil solche nun desto bequemer mit den in eben diesem Hefte des *Schneid. N. Magaz.* schon enthaltenen Beschreibungen, die ich darum nicht wieder wollte abdrucken lassen, verglichen werden können, und weil sie ihrer so nahen und so augenscheinlichen Verwandtschaften und grossen Aehnlichkeit nicht füglich in einem andern Hefte ihre Stelle gefunden hätten.

D. PANZER.

XL
482
G3
P19
1796
[v. 57]
Hd 25-30
SCHNHRB



Byrrhus murinus Hellw.

BYRRHUS murinus.

Der mäusefarbige Fugenkäfer.

Byrrhus murinus, murinus elytris albo lineatis. *Fabric.* Ent. syst. VI. app. p. 437
Byrrhus murinus, cinereo ater, thorace concolero, vittis longitudinalibus tomentosis nigris. *Hellwig* in *Schneid. prompt.* V. n. 1. *Panzer* entom. germ. I. n. 12. p. 33.

Elytrorum vittae atro holosericeae: fasciae saepius interruptae griseae.

Habitat Brunsvigiae. *Dn. Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Byrrhus semistriatus Hellw.

BYRRHUS semistriatus.

Der halbgestreifte Eugenkäfer.

Byrrhus semistriatus: ater nitidus antennis pedibusque flavis. *Fabric.* Ent. syst.
VI. app. p. 437. -

Byrrhus semistriatus: ater nitidus elytris substriatis apice laevissimis, antennis
pedibusque rufo piceis. *Hellwig* in *Schneid. prompt.* V. n. 2. *Panzer* en-
tom. germ. n. 9. p. 32.

Habitat Brunsvigiae. *Dn. Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta. c. Antenna aucta.



Byrrhus minutus Hellw.



BYRRHUS minutus.

Der kleine Fugenkäfer.

Byrrhus minutus, niger obscurus elytris laevissimis. *Fabric.* Ent. syst. VI. app.
p. 437.

Byrrhus minutus, niger nitidus, elytris non striatis. *Hellwig* in *Schneid.* prompt.
V. n. 3. *Panzer* entom. germ. n. 19. p. 34.

Habitat Brunsvigiae.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

2775-2776

2775-2776

2775-2776

2775-2776

2775-2776

2775-2776



Byrrhus nitens Mihi.

BYRRHUS nitens.


Der goldglänzende Fugenkäfer.

Byrrhus nitens : totus aureo nitens. *Panzer* entom. germ. I. n. 20. p. 34.

Habitat in Germania.

Caput, thorax, elytra auro-nitentia glabra, punctis sparsis impressis. Antennae nigrae. Pedes picei. Corpus globosum subtus atrum.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Silpha melanocephala Hellw.

SILPHIA melanocephala.

Der schwarzköpfige Aaskäfer.

Silpha melanocephala: piceo rufa, capite nigro, elytris nitidis punctatis undique marginatis. *Hellwig* in *Schneid. prompt.* V. n. 4. *Panzer* ent. germ. n. 19. p. 122.

Affinis *S. minutae*. Habitat *Brunsvigiae*. *Dn. Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Silpha hemiptera Hellw.

SILPHA, hemiptera.

Der Aaskäfer mit den halben Flügeldecken.'

Silpha hemiptera : piceo rufa, capite nigro, elytris abdomine brevioribus truncatis. Hellwig in Schneid. prompt. V. n. 5. Panzer ent. germ. n. 20. p. 122.

Habitat in fungis Brunsvigiae. Dn. Prof. Hellwig.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

1880

1880

1880

1880

1880



Nitidula punctatissima Hellw.

NITIDULA punctatissima.

Der starkpunctirte Glanzkäfer.

Nitidula punctatissima: ovata thorace elytrisque lituris nigris variegatis, undique punctatis. *Hellwig* in *Schneid. prompt.* V. n. 6. *Panzer* ent. germ. n. 25. p. 128.

Habitat Brunsvigiae. *Dn. Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Chrysomela cuprea Fabr.

CHRYSOMELA cuprea.

Das kupferfärbige Goldhähnchen. La Chrysomele briquetée. Geoffr.

Chrysomela cuprea: ovata capite thoraceque aeneis, elytris cupreis, corpore atro.

Fabric. Ent. Syst. I. n. 35.

Geoffr. Ins. I. n. 15. p. 263.

Habitat in Germaniae floribus.

a. Magnitudo naturalis. b. Antenna aucta.



Chrysomela aenea Fabr.

CHRYSOMELA aenea.

Das metallfärbige Goldhähnchen. Le petit vertubleu.

Chrysomela aenea; ovata viridi aenea ano ferrugineo, antennis tibiis nigris.

Fabric. Ent. Syst. I. n. 109.

Geoffr. Ins. I. n. 12. p. 261.

Habitat in Germaniae plantis.

a. Magnitudo naturalis. b. Antenna aucta.



Chrysomela sophiae Fabr.

1 St. Jac.



CHRYSOMELA Sophiae.

Das Goldhähnchen auf der Sophienrauke.

Chrysomela Sophiae: ovata caerulea tibiis plantisque flavis. *Fabric.* Ent. Syft. I.
n. 115.

Schaller in act. soc. nat. cur. hal. I. p. 272.

Habitat in Sisymbrio Sophiae Germaniae.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Chrysomela Beccabungae Hellw.

J. St. Jec.



CHRYSOMELA Beccabungae.

Das Bachbungen Goldhähnchen.

Chrysomela Beccabungae: elongata linearis, caerulea; elytris punctato-striatis; striis rectis, ano rubro. *Hellwig* in *Schneid. Prompt.* V. n. 7. p. 600.

Galleruca Beccabungae. *Panzer* ent. germ. I. n. 8.

Habitat in *Veronica Beccabunga Brunsvigiae.* *Dn. Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Altica flexuosa Hellw.

ALTICA flexuosa.

Der boglichte Flohkäfer.

Altica flexuosa: saltatoria nigra elytris vitta media longitudinali flavicante, utrinque sinuata. *Hellwig* in *Schneid. prompt.* V. n. 8. p. 601. *Panzer ent. germ.* I. n. 28.

Habitat in pratis Brunsvigiae. *Dn. Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Altica globosa Hellw.

ALTICA globosa.

Der kuglichte Flobkäfer.

Altica globosa. suborbiculata, nigra nitidissima, antennis pedibusque piceis.
Hellwig in *Schneid*, prompt. V. n. 9. p. 602. *Panzer* entom. germ. I.
n. 32.

Habitat Brunsvigiae. Dn. Prof. *Hellwig*.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Cistela humeralis Fabr

CISTELA humeralis.

Der Fadenkäfer mit dem rostfärbigem Schulterfleck.

Cistela humeralis: nigra, elytris puncto bascos ferrugineo. *Fabric.* Ent. Syst.

II. n. 21.

Hellwig in *Schneid. prompt.* V. p: 607.

Habitat in Germaniae floribus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Cistela bipustulata Hellw.



CISTELA bipustulata.

Der zweyblatterigte Fadenkäfer.

Cistela bipustulata: nigra thorace subrotundo, elytris subtilissime punctato-striatis, macula baseos rubra, femoribus nigris. *Hellwig* in *Schneid. prompt.* V. n. 12. p. 606. *Panzer* ent. germ. I. n. 16.

Affinis satis praecedenti, at tamen distincta. *Dn. Prof. Hellwig.*

Habitat in Germania.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Cistela linearis Hellw.



CISTELA linearis.

Der gleichbreite Fadenkäfer.

Cistela linearis: nigra elongata, elytris punctato-striatis, antennarum basi et apice, ore pedibusque fulvis. *Hellwig* in *Schneid. prompt.* V. n. 13.
Panzer ent. germ. I. n. 17.

Habitat Brunsvigiae. Dn. *Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Cistela brevis Hellw.

CISTELA brevis.

Der kurze Fadenkäfer.

Cistela brevis: nigra, elytris punctato striatis, antennarum basi pedibusque fulvis. *Hellwig* in *Schneid. prompt.* V. n. 14.

Habitat Brunsvigtae. *Dn. Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Cistela opaca Hellw.

CISTELA opaca.

Der glanzlose Fadenkäfer.

Cistela opaca: atra capite thoraceque obscurioribus, elytris striatis, antennis pedibusque rufis. *Hellwig* in *Schneid. prompt.* V. n. 15.

Habitat Brunsvigiae. *Dn. Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

THE
JOURNAL OF
THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

Volume 100, Part 1, 1970
Published by the Royal Anthropological Institute
21, BEDFORD SQUARE, LONDON, W.C.1
Subscription price, £10.00 per annum in advance
Single parts, £2.50 each



Cistela fusca Hellw.

CISTELA fusca.

Der braune Fadenkäfer.

Cistela fusca: thorace semicirculari postice truncato, pubescens, cinereo - fusca, elytris leviter striatis. *Hellwig* in *Schneid. prompt.* V. n. 16.

Habitat in Germania. *Dn. Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

1881

1882

1883

1884

1885

1886



Cryptocephalus auritus Fabr.

CRYPTOCEPHALUS auritus.

Der geöhrte Fallkäfer.

Cryptocephalus auritus: ater thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. *Fabric.*
Syst. Ent. n. 8. p. 107. Spec. Ins. I. n. 12. p. 139. Maut. Ins. I. n. 15. p.
80. Ent. syst. T. II. n. 20. p. 57.

Clytra aurita. *Panzer.* entom. germ. I. n. 7. p. 190.

Chrysomela aurita: subcylindrica nigra: thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. *Linn.* Syst. Nat. n. 75. p. 526. ed. XIII. n. 15. p. 1702.

Herbst Archiv. VII. n. 19. tab. 44. fig. 5. g. h.

Hellwig in *Schneid.* prompt. V. p. 612.

Habitat in Germaniae fruticibus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Cryptocephalus - Clytra affinis Hellw.

CRYPTOCEPHALUS affinis.

Der verwandte Fallkäfer.

Cryptocephalus affinis: caeruleus, thorace utrinque macula pedibusque totis luteis. *Hellwig* in *Schneid. prompt.* V. n. 17.

Clytra affinis. *Panzer* entom. germ. I. n. 8. p. 190.

Clytra musciformis. *Schneider* prompt. II. n. 15.

Rossi faun. etrusc. ed, *Hellwig* I. n. 236.

Habitat Brunsvigiae. *Dn. Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Attelabus intermedius Hellw.

Jac. Sturm fec.

ATTELABUS intermedius.

Der mittlere Afterrüsselkäfer.

Attelabus intermedius: elytris rubris nitidis punctato-striatis, corpore capite thorace pedibusque nigris. *Hellwig* in *Schneid. prompt.* V. n. 19.

Rossi faun. etrusc. ed. Hellwig I. n. 349.

Habitat in Brunsviglae Corylo. *Dr. Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Bruchus luteicornis Hellw.

BRUCHUS luteicornis.

Der gelbbörnichte Muffelkäfer.

Bruchus luteicornis: nigricans, antennis pedibusque luteis, femoribus posticis incrassatis dentatis nigris. *Hellwig* in *Schneid.* prompt. V. n. 22.

Habitat Brunsvigiae. *Dn. Prof. Hellwig.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Bruchus imbricornis Mihi.

BRUCHUS imbricornis.

Der schuppenhörnige Muffelkäfer.

Bruchus imbricornis: ater elytris atomis albis, thorace antice attenuato, antennis pedibusque flavis. *Panzer* ent. germ. I. n. 11.

Habitat in Germania.

Caput exsertum atrum. Os flavum. Antennae articulis compressis imbricatis flavis. Thorax ater atomis cinereis adpersus. Elytra striata cinereo irrorata. Pedes flavi, femoribus basi nigris. Anus immaculatus.

a Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta. c. Antenna aucta. d. Pes auctus.

-
- Tab. 1. *Dytiscus arcuatus* Panzer.
 — 2. *Dytiscus trifidus* Panzer.
 — 3. *Dytiscus obscurus* Panzer.
 — 4. *Dytiscus collaris* Panzer.
 — 5. *Dytiscus interruptus* Panzer.
 — 6. *Elophorus aquaticus* Fabric.
 — 7. *Elophorus elongatus* Fabric.
 — 8. *Notoxus monoceros* Fabric.
 — 9. *Notoxus bipunctatus* Fabric.
 — 10. *Dermeestes ferra* Fabric.
 — 11. *Chrysomela sexpunctata* Fabric.
 — 12. *Chrysomela scutellata* Fabric.
 — 13. *Tillus ferraticornis* Fabric.
 — 14. *Ripiphorus paradoxus* Fabric.
 — 15. *Lucanus scarabaeoides*, mas. Creutzer.
 — 16. *Lucanus scarabaeoides*, femina Creutzer.
 — 17. *Curculio brunneus* Panzer.
 — 18. *Curculio Linariae* Panzer.
 — 19. *Curculio lepidopterus* Fabric.
 — 20. *Tenthredo femorata* Fabric.
 — 21. *Tenthredo punctum* Fabric.
 — 22. *Cimex bidens* Fabric.
 — 23. *Cimex bipinus* Panzer.
 — 24. *Cimex melanocephalus* Fabric.



Dytiscus arcuatus Mihi.

DYTISCVS arcuatus.


Der bogichte Wasserkäfer.

Dytiscus arcuatus: ferrugineus laevis, elytris nigris, margine strigaque disci arcuata, cum margine coeunte flavis. *Panzer* entom. germ. I. n. 15. p. 75.

Caput flavum. Thorax laevis obscurior. Elytra, potius flava, striga futurali maculisque baseos marginisque atris. Antennae pedesque flavi. Subtus ferrugineus.

Habitat in aquis stagnantibus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Dytiscus trifidus Mihi.



DYTISCVS trifidus.

Der dreyspaltige Wasserkäfer.

Dytiscus trifidus: ater laevis elytris nigris, macula baseos tripartita margineque pallidis. *Panzer* entom. germ. I. n. 16. p. 76.

Caput atrum. Thorax antice niger, medio pallidus, postice striga transversa nigra. Elytra potius pallida, macula baseos tripartita, et alia latiori irregulari disci atris. Antennae apice fuscae. Pedes pallidi.

Habitat in aquis stagnantibus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Dytiscus obscurus Mihi.

DYTISCVS obscurus.


Der dunkelfärbige Wasserkäfer.

Dytiscus obscurus: picens, elytris laevibus nigris, maculis liturisque pallidis indistinctis. *Panzer* entom. germ. I. n. 24. p. 77.

Caput et thorax pallida. Oculi nigri. Elytra laevia fusca, maculis lateralibus inordinatis pallidis. Antennae pedesque flavi.

Habitat in aquis stagnantibus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Dytiscus collaris Mihi.

DYTISCVS collaris.

Der Wasserkäfer mit dem schwarzen Halskragen.

Dytiscus collaris: ferrugineus elytris atris, punctato striatis, lituris disci cum margine apicisque pluribus confluentibus. *Panzer* ent. germ. I. n. 38. p. 79.

Caput et thorax ferruginea. Elytra potius ferruginea punctata: maculae transversae liturisque longitudinalibus disci atris. Antennae pedesque ferrugini.

Habitat in aquis stagnantibus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Dytiscus interruptus Miki.

DYTISCVS interruptus.

Der unterbrochene Wasserkäfer.

Dytiscus interruptus: ferrugineus, coleoptorum disco interrupte lateribusque inaequaliter pallidis. *Panzer* ent. germ. I. n. 43. p. 80.

Caput et thorax pallida Oculi nigri. Elytra fusca, punctis duobus baseos, maculis disci, lateribusque interrupte pallidis. Antennae pedesque pallidi.

Habitat in aquis stagnantibus. *Dn. C. Schwarz* insectorum indefessus scrutator, cui hunc et antecedentes Dytiscorum species debeo.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Elophorus aquaticus Fabr.

J. St. fec.

ELOPHORVS aquaticus.

Der gemeine Wasserranzelkäfer. Le Dermeste bronzé Geoffr.

Elophorus aquaticus: fuscus thorace rugoso, elytrisq. fusco aeneis. *Fabric.*

Ent. syst. T. I. n. 1. p. 204. Syst. Ent. n. 1. p. 66. Spec. Ins. T. I. n. 1. p. 77. Mant. Ins. T. I. n. 1. p. 42.

Silpha aquatica: cinerea elytris substriatis thorace emarginato longitudinaliter rugoso virescente. *Linn.* Syst. Nat. XII. n. 25. p. 573. ed. XIII. n. 1. p. 1628.

Dermestes viridi aeneus, thorace fasciis quatuor elevatis, elytris punctato-striatis. *Geoffr.* Ins. T. I. n. 15. p. 105.

Hydrophilus aeneus, viridi aeneus, thorace virescenti sulcato, elytris punctato-striatis, antennis pedibusque rufis. *Degeer* Ins. IV. n. 5. p. 379. tab. 15. fig. 5. 6.

Herbst Nat. d. Käf. V. n. 2. tab. 49. fig. 7. G.

Panzer entom. germ. I. n. 1. p. 83.

Habitat in aquis stagnantibus.

Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Etophorus elongatus Fabr.

•



•

•

•

E L O P H O R V S e l o n g a t u s .

Der länglichte Runzelkäfer.

Elophorus elongatus: thorace punctato aeneo, elytris porcatis fuscis. *Fabric.*

Ent. Syst. T. I. n. 3. p. 204.


Silpha elongata. *Schaller* in act. soc. nat. cur. hal. I. p. 257.

Herbst Nat. d. K. V. n. 4. tab. 49. fig. 9. 2.

Panzer ent. germ. I. n. 3. p. 83.

Habitat in aquis stagnantibus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Votoxus monoceros Fabr.

NOTOXVS monoceros.

Der einbornichte Schildkrotenkäfer. La Cuculle. Geoffr.

Notoxus monoceros: thorace in cornu supra caput protenso elytris puncto fasciisque nigris. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 6. p. 211. Syst. Ent. n. 1. p. 158. Spec. Ins. T. I. n. 1. p. 203. Mant. Ins. T. I. n. 4. p. 127.

Meloe monoceros: alatus, thorace in cornu supra caput protenso. *Linn.* Syst. Nat. XII. n. 14. p. 681. ed. XIII. n. 4. p. 1813.

Attelabus monoceros: *Fr.* Suec. II. n. 639.

Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 356. tab. 6. fig. 8.

Herbst im Archiv. V. n. 2. tab. 25. fig. 4.

Panzer entom. germ. I. n. 4. p. 87.

Habitat in floribus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Notoxus bipunctatus Fabr.

NOTOXVS bipunctatus.

Der zweypunktige Schildkrötenkäfer.

Notoxus bipunctatus: thorace ferrugineo elytris testaceis: puncto nigro. *Fabric.*
Ent. syst. T. I. n. 8. p. 212.

Panzer ent. germ. I. n. 5. p. 87.

Habitat in Germaniae floribus. Vix huius generis, ut iam illustr. *Fabricius* l. c. praeclare monuit.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

1871-1872

1873-1874

1875-1876

1877-1878

1879-1880

1881-1882

1883-1884

1885-1886



Dermestes Serra Fabr.



DERMESTES serra.

Der sägenhornige Speckkäfer.

Dermestes serra: ovatus niger antennis flavis: clava oblonga serrata. *Fabric.*

Ent. syst. T. I. n. 40. p. 234.

Dorkatoma dresdensis. *Herbst* Nat. d. K. IV. n. 1. tab. 39. fig. 8. a. b.

Panzer ent. germ. I. n. 58. p. 108.

Habitat in Germaniae fungis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872



Chrysomela sexpunctata Fabr.

CHRYSOMELA sexpunctata.

Das sechspunktige Goldbähnchen.

Chrysomela sexpunctata: nigra thorace rufo: punctis duobus elytris rufis: punctis tribus nigris. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 63. p. 320. Mant. Ins. T. I. n. 43. p. 70.

Panzer ent. germ. I. n. 26. p. 161.

Habitat in Germania. Nimis affinis *C. decempunct.* at tamen distincta.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.





Chrysomela scutellata Fabr.

CHRYSOMELA scutellata.

Das geschildete Goldhähnchen.

Chrysomela scutellata: ovata rufa, coleoptris maculis quinque nigris. *Fabric.*

Ent. syst. T. I. n. 101. p. 327.

Nitidula quinquepunctata. *Fabric.* Mant. Ins. T. I. n. 16. p. 52.

Herbst im Archiv. IV. n. 32. p. 88. tab. 23. fig. 20. C.

Panzer ent. germ. I. n. 45. p. 164.

Habitat in Germaniae plantis aquaticis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

Journal of the Royal Society of Medicine

Volume 10, Part 1, 1917

Published by the Royal Society of Medicine, 11, Bedford Square, London, W.C.1

Printed by the Royal Society of Medicine, 11, Bedford Square, London, W.C.1

Subscription price, 10s. 6d. per annum in advance, including postage

Single copies, 2s. 6d. each, including postage

Advertisements, 10s. per line per annum

Orders, cheques, and payments to the order of the Secretary

11, Bedford Square, London, W.C.1



Tillus ferraticornis Fabr.

TILLVS serraticornis.

Der sägenhornige Rauchkäfer.

Tillus serraticornis: ater elytris testaceis. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 3.

Dermestes dentatus. *Rossi* faun. etrusc. T. I. n. 82. tab. 3. fig. 2.

Panzer ent. germ. I. n. 2. p. 369.

Habitat in Germaniae floribus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Ripiphorus paradatus Fabr.

RIPIPHORVS paradoxus.

Der paradoxe Kammkäfer.

Ripiphorus paradoxus: niger thoracis lateribus elytrisque testaceis. *Fabric. Ent. syst. T. II. n. 5. p. 111.*

Mordella paradoxa: antennis pectinatis, thoracis lateribus elytrisque testaceis. *Fabric. Syst. ent. n. 2. p. 262. Spec. Ins. T. I. n. 2. p. 332. Mant. Ins. T. I. n. 4. p. 218.*

Mordella paradoxa. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 682. ed. XIII. n. 1. p. 2022. Faun. Suec. n. 831.*

Habitat in Germaniae floribus. Pl. Rev. *P. Dionysius Linder*, Ord. S. Benedict. Monastr. Banz in Franconia.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Lucanus scarabaeoides mas. Creutzer.



LVCANVS scarabaeoides, mas.

Der Dungkäferartige Schröter. Das Männchen.

Lucanus scarabaeoides: mandibulis supra dente elevato fuscus, elytris striis interruptis pilosis. *Panzer* ent. germ. I. n. 5. p. 245.

Habitat in ligno putrido quercino circa Neuwaldegg prope Viennam Austriae. Lectus, mense Septembri, et benevole communicatus a Cl. Chr. Creutzer Entomologo acutissimo Vindobonensi, cui insectum ipsum, cum annexa descriptione debeo.

Duplo fere minor *Luc. tenebrioide*. Facies Scarabaei eo magis, quod primo intuitu, praesertim mandibulis clausis, clypeus bicornis apparet.

Corpus totum fuscum obscurum, undique vage punctatum pubescens. Caput thorace dimidio angustius. Antennae huius generis. Mandibulae breves arcuatae acutae, supra dente magno, basi valde dilatato compresso, versus apicem sensim attenuato, apice obtuso, parum inflexo. Thorax convexus margine subreflexo.

antice emarginatus, postice subtrilobus. Scutellum fasciculo pilorum rufescentium. Elytra convexa, stiliis quinque interruptis, e pilis brevibus densis rigidis nigricantibus, et inter has aliis subtilioribus, oculo nudo vix conspicuis. Alae elytris duplo longiores, fusco hyalinae, macula costali lutescente. Pectus et abdomen profundius punctata, concolora. Pedes breviusculi, tibiis serratis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta. c. Caput cum mandibulis lente auctum. d. Mandibula cum dente elevato acuto. e. Elytrum auctum. f. Pes anticus auctus.



Lucanus scarabaeoides femina Creutzer.



Agathidium minus (L.)

LUCANVS scarabaeoides, femina.

Der Dungkäferartige Schrüter. Das Weibchen.

Lucanus scarabaeoides: mandibulis supra dente elevato fuscus, clytris stris interruptis pilosis. *Panzer* l. c.

Habitat cum mare: differt a mare capite paullo angustiore mandibulisque dente minuto, vix distincto, acutiusculo.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta. c. Caput cum mandibulis auctum.
d. Mandibula lente aucta.



Curculio brunneus Mihi.

CVRCVLIO brunneus.

Der braune Rüsselkäfer.

Curculio brunneus: longirostris brunneus, coleoptris punctato-striatis, apice punctis duobus elevatis, rostro apice nigro. *Panzer* ent. germ. I. n. 52. p. 308.

Habitat Mannhemii. *Dn. Joseph Baader.*

Rostrum deflexum apice nigrum. Oculi nigri. Thorax depressus medio carinatus. Scutellum nigrum. Elytra striata, striis elevatis, punctata, punctis regularibus subquadratis impressis, apice punctis duobus elevatis. Femora inermia. Corpus subtus ferrugineo-fuscum.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Curculio Linariae Mili.

J. Stoffer

CVRCVLIO Linariae.

Der Leinkraut Rüsselkäfer.

Curculio Linariae: longirostris ater cinereo-tomentosus, elytris striatis, rostro depresso. *Panzer* ent. germ. I. n. 27. p. 304.

Habitat in Antirrhini Linariae L. radicibus, metamorphosin ibidem in folliculis galliformibus subiens. *Dn. M. Schitzlein* Erlangae detexit.

Rostrum inflexum atrum. Antennarum clava apice cinerea. Thorax ater subglobosus medio subcarinatus. Elytra argute striata cinereo tomentosa. Femora mutica. Variat colore fusco-testaceo.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Curculio lepidopterus Fabr.

CURCULIO lepidopterus.

Der schuppigte Rüsselkäfer.

Curculio lepidopterus: brevisrostris femoribus acute dentatis niger, elytris viridis squamosis, pedibus rufis. *Fabric. Ent. syst. T. IV. app. p. 454.*

Habitat in Austriae campis arenosis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Tenthredo femorata Fabr.



TENTHREDO femorata.

Die Schenkel-Blatwespe. Le Frelon noir à échancrure. Geoffr.

Tenthredo femorata: antennis clavatis luteis, corpore atro, femoribus posticis maximis. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 1. p. 104. Syst. Ent. n. 1. p. 317. Spec. Ins. T. I. n. 1. p. 405. Mant. Ins. T. I. n. 1. p. 252.

Crabro niger, segmento primo margine inciso: lunula flava. *Geoffr.* Ins. T. II. n. 3. p. 263. tab. 14. fig. 4.

Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 26. fig. 4.

Schäffer Ic. Ins. Ratisb. tab. 104. fig. 1. 2.

Habitat in Germaniae Salice.

a. Pes posticus auctus. b. Tarsus auctus, cum articulis patelliformibus.



Tenthredo punctum Fabr.

TENTHREDO punctum.

Die Blatwespe mit den rothen Hinterschenkeln.

Tenthredo punctum: antennis septemnodiiis, corpore nigro, abdominis lateribus albis, femoribus posticis rubris. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 58. p. 119. Spec. Inf. T. I. n. 44. p. 415. Mant. Inf. T. I. n. 46, p. 255.

Tenthredo punctum. *Linn.* Syst. Nat. n. 23. p. 924. ed. XIII. n. 23. p. 2660.

Habitat in Germaniae Pinn.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Cimex bidens Fabr.

CIMEX bidens.

Die zweyzahnigte Wanze.

Cimex bidens. thorace acute spinoso griseus antennis rufis. *Fabric.* Ent. syst.
T. IV. n. 54. p. 93. Spec. Ins. T. II. Syst. Ent. n. 23. p. 701. Spec. Ins.
T. II. n. 35. p. 344. Mant. Ins. T. II. n. 41. p. 283.

Cimex bidens. *Linn.* Syst. Nat. n. 23. p. 718. ed. XIII. n. 23. p. 2135. Fn.
Suec. n. 921.

Degeer Ins. III. n. 6. p. 259. tab. 13. fig. 8.

Fuesly ins. helv. n. 482.

Habitat in Germaniae plantis.



Cimex bispinus Mihi.


CIMEX bispinus.

Die doppelstachlichte Wanze.

Cimex bispinus: thorace acute spinoso testaceus, antennis pedibusque testaceis.

Duplo minor praecedenti, aſt thorace spinofiori. Caput nigricans. Thoracis
spinae atrae. Corpus subtus testaceum nigro punctatum.

Habitat in Germania. *Dn. Joſeph Baader.*



Cimex melanocephalus Fabr.

CIMEX melanocephalus.

Die schwarzköpfige Wanze.

Cimex melanocephalus: griseus capite scutelloque basi nigro aeneis. *Fabric.* Ent. syft. T. IV. n. 176. p. 125. Syft. Ent. n. 99. p. 716. Spec. Ins. T. II. n. 134. p. 360. Mant. Ins. T. II. n. 175. p. 297.

Habitat Mannhemii. *Dn. Joseph Baader.*

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

- Tab. 1. *Staphylinus olens* Fabric.
 — 2. *Staphylinus maxillosus* Fabric.
 — 3. *Staphylinus cyaneus* Fabric.
 — 4. *Staphylinus erythropterus* Fabric.
 — 5. *Staphylinus acneocephalus* Fabric.
 — 6. *Staphylinus toffor* Fabric.
 — 7. *Staphylinus politus* Fabric.
 — 8. *Staphylinus nitidus* Fabric.
 — 9. *Staphylinus fulvipes* Fabric.
 — 10. *Staphylinus bipustulatus* Fabric.
 — 11. *Staphylinus clavicornis* Fabric.
 — 12. *Staphylinus fuscipes* Fabric.
 — 13. *Staphylinus canaliculatus* Fabric.
 — 14. *Staphylinus piceus* Fabric.
 — 15. *Staphylinus rivularis* Paykull.
 — 16. *Staphylinus pallidipennis* Panzer.
 — 17. *Oxyporus marginatus* Fabric.
 — 18. *Oxyporus merdarius* Fabric.
 — 19. *Oxyporus pygmaeus* Fabric.
 — 20. *Oxyporus rufipes* Fabric.
 — 21. *Oxyporus erythropterus* Panzer.
 — 22. *Paederus ruficollis* Fabric.
 — 23. *Paederus fulvipennis* Fabric.
 — 24. *Paederus dimidiatus* Panzer.



Staphylinus olens Fabr.

STAPHYLINVS olens.

Der oelichte Raubkäfer. Le grand Staphylin noir lisse. Geoffr.

Staphylinus olens: niger opacus immaculatus capite thorace latiori. *Fabric. Ent. syst. T. II. n. 6. p. 521. Mant. Inf. T. I. n. 4. p. 219.*

Staphylinus ater, extremo antennarum articulo lunulato. *Geoffr. Inf. T. I. n. 1. p. 360. tab. 7. fig. 1.*

Staphylinus maior niger. Degeer Inf. T. IV. n. 3. p. 22.

Staphylinus olens: niger opacus immaculatus, antennis apice lunatis. *Paykull Monograph. Staphylin. n. 4. p. 9.*

Panzer Ent. germ. I. n. 5. p. 352.

Habitat in Germaniae cadaveribus. A *Linnaeo* et olim a *Fabricio*, perperam pro varietate *St. maxillofi* habitus. Magnitudine et longitudine omnes nostrates huius generis superat.

THE HISTORY OF THE

PLANT KINGDOM

IN WHICH THE SEVERAL KINDS OF PLANTS ARE DESCRIBED, AND THE USES OF THEM EXPLAINED.

BY J. VAN BOYLE, ESQ.

IN TWO VOLUMES.

LONDON: Printed by J. B. B. 1754.

IN TWO VOLUMES.

LONDON: Printed by J. B. B. 1754.

IN TWO VOLUMES.

LONDON: Printed by J. B. B. 1754.



Staphylinus maxillofus Fabr.

STAPHYLINVS maxillofus.

Der Raubkäfer mit den grossen Kinnladen.

Staphylinus maxillofus: pubescens niger fasciis cinereis. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 9. p. 521. Syst. Ent. n. 3. p. 265. Spec. Inf. T. I. n. 3. p. 334. Mant. Inf. T. I. n. 5. p. 220.

Staphylinus maxillofus: pubescens niger fasciis cinereis, maxillis longitudine capitis. *Linn.* Syst. Nat. n. 3. p. 683. ed. XIII. n. 3. p. 2026. Fn. Suec. n. 841.

Staphylinus balteatus. *Degeer* Inf. T. IV. n. 4. p. 18. tab. 1. fig. 7. 8.

Staphylinus maxillofus: niger nitidus, abdomine elytrisq. fasciis cinereis. *Paykull.* Staph. n. 2. p. 5.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 20. fig. 1.

Panzer Ent. germ. I. n. 8. p. 353.

Habitat in Germaniae putridis, victitans rapina. Adultus interdum lanuginem amittit. Figurae a *Linnaeo* e *Boccon.* (Mus. di piante rare tab. 31. f. A. A. p. 38.) citatae, antecedentem potius repraesentare videntur.

THE HISTORY OF THE

PLANT KINGDOM

IN WHICH THE SEVERAL KINDS OF PLANTS ARE DESCRIBED, AND THE USES OF THEM SET FORTH.

BY JOHN RAY, M.A. SERMONS, &c. &c.

IN TWO VOLUMES.

LONDON, Printed by J. Sturges, at the Angel in St. Dunstons Church, 1704.

THE SECOND EDITION, CORRECTED AND ENLARGED.

1729.



Staphylinus cyaneus Fabr.

STAPHYLINVS cyaneus.

Der blaue Raubkäfer. Le Staphylin bleu. Geoffr.

Staphylinus cyaneus: ater opacus thorace elytrisque caerulefcentibus. *Fabric.*

Ent. fyft. T. II. n. 11. p. 521.

Staphylinus atro caerulefcens, extremo antennarum articulo lunulato. *Geoffr.*

Inf. T. I. n. 2. p. 361.

Staphylinus cyaneus: niger capite, thorace elytrisqne cyaneis. *Parkull. Staph.*

n. 7. p. 13.

Habitat in Germaniae campis arenofis.

STAPHYLINUS

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...

Staphylinus (Staphylinus) ...



Staphylinus erythropterus Fabr.

STAPHYLINVS erythropterus.

*Der Raubkäfer mit den rothen Flügeldecken. Le Staphylin à etuis
couleur de rouille. Geoffr.*

Staphylinus erythropterus: ater elytris antennarum basi pedibusque rufis. *Fabric.*
Ent. syst. T. II. n. 14. p. 522. Syst. Ent. n. 5. p. 265. Spec. Inf. T. I. n. 5.
p. 335. Mant. Inf. T. I. n. 8. p. 220.

Staphylinus erythropterus: ater elytris pedibusque rufis. *Linn.* Syst. Nat. n. 4.
p. 683. ed. XIII. n. 4. p. 2027. Fn. Suec. n. 842.

Staphylinus, ater non nitens, elytris pedibusque rufis. *Geoffr.* Inf. T. I. n. 9. p. 364.

Staphylinus erythropterus: niger maculis lanuginosis nitentibus flavis, elytris an-
tennarum basi, pedibusque rufis. *Paykull.* Staph. n. 3. p. 7.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 2. fig. 2.

Panzer Ent. germ. tab. 12. n. 10. p. 355.

Habitat in fimetis et agaricis putridis.



Staphylinus aeneocephalus Fabr.

J. St. fsc.

STAPHYLINUS aeneocephalus.

Der metallköpfige Rautkäfer.

Staphylinus aeneocephalus: niger aeneo nitidus elytris pedibusque testaceis, antennis fuscis. *Fabric. Ent. syst. T. II. n. 15. p. 522.*

Staphylinus aeneocephalus. Degeer Ins. T. IV. n. 8. p. 22.

Staphylinus aeneocephalus: nigro-fuscus, elytris rufescentibus, capite thoraceque aeneis. *Paykull. Staph. n. 6. p. 11.*

Panzer Ent. germ. I. n. 11. p. 353.

Habitat in Germaniae putridis.

und die folgenden Punkte zu berücksichtigen:

1. Die Bedeutung der Natur für die Menschheit.

Die Natur ist ein Teil der menschlichen Kultur und hat eine wichtige Rolle in der menschlichen Entwicklung gespielt. Die Natur ist eine Quelle der Inspiration und der Kreativität. Die Natur ist eine Quelle der Lebensenergie und der Lebenskraft.

Die Natur ist eine Quelle der Lebensenergie und der Lebenskraft. Die Natur ist eine Quelle der Lebensenergie und der Lebenskraft. Die Natur ist eine Quelle der Lebensenergie und der Lebenskraft.

Die Natur ist eine Quelle der Lebensenergie und der Lebenskraft.

Die Natur ist eine Quelle der Lebensenergie und der Lebenskraft.

Die Natur ist eine Quelle der Lebensenergie und der Lebenskraft.



Staphylinus fossor Fabr.

J. St. f.

STAPHYLINVS fossor.

Der grabende Raubkäfer.

Staphylinus fossor: niger capite thoraceque obscure piceis, elytris aureis, tarsis anticis dilatatis. *Fabric. Ent. syst. T. II. n. 16. p. 523.*

Panzer Ent. germ. I. n. 12. p. 353.

Habitat in Germaniae putridis. Tarsi antici dilatati. F.



Staphylinus politus Fabr.

STAPHYLINVS politus.

Der geglättete Raubkäfer. Le petit Staphylin noir. Geoffr.

Staphylinus politus: niger thorace elytrisque nitidis, thorace lineis punctorum impressorum. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 20. p. 524. Syst. Ent. n. 7. p. 266.
- *Spec. Inf.* T. I. n. 7. p. 335. *Mant. Inf.* T. I. n. 11. p. 220.

Staphylinus politus: niger, thorace elytrisque nigricantibus nitidis. *Linn.* Syst. Nat. n. 5. p. 683. ed. XIII. n. 5. p. 2028. *Fn. Suec.* n. 605.

Staphylinus ater: extremo antennarum articulo subgloboso, elytris thorace brevioribus. *Geoffr.* Inf. T. I. n. 3. p. 361.

Staphylinus politus: ater nitidus, capite thorace elytrisque aeneis, alis nigris. *Paykull.* Staph. n. 31. p. 42.

Staphylinus aeneus. *Degeer* Inf. T. IV. n. 9. p. 23.

Schaeffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 39. fig. 12.

Panzer Ent. germ. I. n. 14. p. 354.

Habitat in animalium cadaveribus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Staphylinus nitidus Fabr.

STAPHYLINVS nitidus.

Der glänzende Raubkäfer.

Staphylinus nitidus: ater nitidus elytris testaceis. *Fabric.* Ent. syst. T.I. n. 24.

p. 524. Mant. Inf. T. I. n. 13. p. 220.

Staphylinus nitidus: ater nitidus, elytris rufis, alis nigris. *Paykull* Staph. n. 30.

p. 40.

Panzer Ent. germ. I. n. 16. p. 254.

Habitat in fimo.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Staphylinus fulvipes Fabr.

STAPHYLINVS fulvipes.

Der gelbfüßichte Raubkäfer.

Staphylinus fulvipes: ater nitidus elytris pedibusque testaceis, thorace ovato.

Fabric. Ent. syst. T. II. n. 31. p. 526.

Panzer Ent. germ. I. n. 22. p. 355.

Habitat sub muscis et sub foliis deciduis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Staphylinus bipustulatus Fabr.



STAPHYLINVS bipustulatus.

Der zweyblatterigte Raubkäfer.

Staphylinus bipustulatus: niger elytris puncto postice ferrugineo. *Fabric.* Ent. syft. T. II. n. 34. Syft. Ent. n. 11. p. 266. Spec. Inf. T. I. n. 12. p. 336. Mant. Inf. T. I. n. 18. p. 221.

Staphylinus bipustulatus. *Linn.* Syft. Nat. n. 16. p. 685. ed. XIII. n. 16. p. 2029. Fn. Suec. n. 847.

Panzer Ent. germ. I. n. 24. p. 355.

Habitat sub lapidibus primo vere. Elytrorum puncta, potius lineolas fistunt. Magnitudine variat.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Staphylinus clavicornis Fabr.

STAPHYLINVS clavicornis.

Der keilhornigte Raubkäfer. Le Staphylin Iunon. Geoffr.

Staphylinus clavicornis: niger immaculatus thorace rotundato laevi, antennis extrorsum crassioribus. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 37. p. 527. Gen. Inf. Mant. p. 241. Spec. Inf. T. I. n. 14. p. 336. Mant. Inf. T. I. n. 21. p. 221.

Staphylinus ater, oculis prominentibus crassis. *Geoffr.* Inf. T. I. n. 24. p. 371.

Staphylinus Iuno: niger oculis magnis prominentibus, antennis clavatis. *Paykull.* Staph. n. 25. p. 33.

Panzer Ent. germ. I. n. 27. p. 356.

Habitat ad ripas aquarum, et sub foliis deciduis putridis. Mera varietas *Staph. bigutt.* esse videtur.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Staphylinus fuscipes Fabri

STAPHYLINVS fuscipes.

Der braunfüßichte Raubkäfer.

Staphylinus fuscipes: ater thorace subrotundo, elytris pedibusque piceis. *Fabric.*

Ent. syst. T. II. n. 38. p. 527. Spec. Inf. T. I. n. 15. p. 336. Mant. Inf. T. I.
n. 22. p. 221.

Staphylinus fuscipes. *Linn.* Syst. Nat. n. 23. p. 685. ed. XIII. n. 22. p. 2030.

Fn. Suec. n. 857.

Panzer Ent. germ. I. n. 28. p. 356.

Habitat in arenosis humidis. Thorax dilute marginatus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Staphylinus canaliculatus Fabr.

STAPHYLINVS canaliculatus.

Der Raubkäfer mit dem rinnenartig ausgehöhlen Bruststück.

Staphylinus canaliculatus: flavus capite abdominisque cingulo atris, thorace canaliculato. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 42. p. 528. *Mant. Inf.* T. I. n. 29. p. 221.

Staphylinus canaliculatus: rufo flavus, capite abdominisque apice nigris, thorace postice canaliculato. *Paykull.* Staph. n. 23. p. 31.

Panzer Ent. germ. I. n. 44. p. 358.

Habitat sub lapidibus primo vere. Ad *Pselaphos Herbst.* spectare videtur.
a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Staphylinus piceus Fabr.

STAPHYLINVS piceus.

Der pechbraune Raubkäfer.

Staphylinus piceus: niger thorace depresso: lineis elevatis tribus, elytris piceis.

Fabric. Ent. syst. T. II. n. 55. Syst. Ent. n. 20. p. 267. Spec. Inf. T. I.
n. 25. p. 338. Mant. Inf. T. I. n. 35. p. 222.

Staphylinus piceus. Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 686. ed. XIII. n. 23. p. 2031.

Panzer Ent. germ. I. n. 44. p. 358.

Habitat sub lapidibus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Staphylinus rivularis Paykull.

STAPHYLINVS rivularis.

Der Strand-Kaubkäfer.

Staphylinus rivularis. niger elytris longioribus abdomineque depressis, thorace quadriforcato antice rotundato, pedibus rufo brunneis. *Paykull*. Staph. n. 46. p. 65.

Habitat sub arborum corticibus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Staphylinus pallidipennis Michx.

STAPHYLINVS pallidipennis.

Der bleichflügelichte Raubkäfer.

Staphylinus pallidipennis: ater thorace canaliculato, elytris macula tibiisque flavis. *Panzer* Ent. germ. I. n. 46. p. 358.

Caput magnum transversum depressum. Mandibulae exsertae. Thorax obcordatus medio linea impressa. Elytra nigra punctata medio macula flava. Femora nigra; tibiae flavae. Alae pallidae.

Habitat sub corticibus arborum demortuae.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Oxyporus marginatus Fabr.

OXYPORVS marginátus.

Der gerändete Stumpfkäfer.

Oxyporus marginatus: ater nitidus thoracis margine pedibus elytrisque rufis:
his futura maculaque marginali nigris. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 6. p. 532.

Panzer Ent. germ. I. n. 4. p. 359.

Habitat in Germaniae sylvaticis sub foliis deciduis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Oxyporus merdarius Fabr.

OXYPORVS merdarius.

Der Koth - Stumpfkäfer.

Oxyporus merdarius: ater thorace elytris pedibusque rufis. *Fabric. Ent. syst.*
T. II. n. 11. p. 533.

Staphylinus merdarius. *Fabric. Mant. Inf. T. I. n. 25. p. 221.*

Panzer Ent. germ. I. n. 8. p. 360.

Habitat in putridis, suffocatis, et in fungis putrescentibus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Oxyporus pygmaeus Fabr.

OXYPORVS pygmaeus.

Der Zwerg - Stumpfkäfer.

Oxyporus pygmaeus: nigricans thorace elytrisque pallidis. *Fabric.* Ent. syst. T. II.
n. 13. p. 534. Gen. Inf. Mant. p. 241. Spec. Inf. T. I. n. 4. p. 339. Mant.
Inf. T. I. n. 5. p. 222.

Panzer Ent. germ. I. n. 10. p. 360.

Habitat in fungis putridis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Oxyporus rufipes Fabr.

OXYPORVS rufipes.

Der rothfüßichte Stumpfkäfer.

Oxyporus rufipes: ater nitidus pedibus rufis. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 21. p. 535.

Staphylinus rufipes. *Fabric.* Mant. Inf. T. I. n. 31. p. 22.

Panzer Ent. germ. I. n. 16. p. 361.

Habitat in agaricis putrescentibus. *Linnaei et Geoffroae* Synonyma infida.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Oxyporus erythropterus Miki.



OXYPORVS erythropterus.

Der Stumpfkäfer mit den rothen Flügeldecken.

Oxyporus erythropterus: ater, elytris rufis, pedibus testaceis.

Caput atrum. Antennae fuscae. Thorax rotundatus laevis. Elytra rufa.
Pedes testacei. Corpus atrum.

Captus semel sub lapide.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Paederus ruficollis Fabr



PAEDERVS ruficollis.

Der rothbalfichte Traubenkäfer. Le Staphylin noir à corcelet rouge. Geoffr.

Paederus ruficollis: niger thorace rufo, elytris cyaneis. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 2. p. 537. Gen. Inf. Mant. I. p. 241. Spec. Inf. T. I. n. 2. p. 339. Mant. T. I. n. 2. p. 223.

Staphylinus ruficollis: niger elytris caeruleis, femoribusque basi rufis. *Paykull.* Staph. n. 18. p. 26.

Herbst Archiv. VII. VIII. n. 2. p. 180. tab. 48. fig. 5. a. b.

Panzer Ent. germ. I. n. 2. p. 362.

Habitat sub lapidibus tempore verno.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Paederus fulvipennis Fabr. .

PAEDERVS fulvipennis.

Der Traubenkäfer mit den ganz rothen Flügeldecken.

Paederus fulvipennis: ater nitidus elytris totis pedibusque testaceis. *Fabric.*

Ent. syst. T. II. n. 4. p. 537.

Panzer Ent. germ. I. n. 5. p. 362.

Habitat sub lapidibus.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Paederus dimidiatus Mihi.

J. St. f.



PAEDERVS dimidiatus.

Der Traubenkäfer mit den halbrothen Flügeldecken.

Paederus dimidiatus: ater thorace elytris postice, femoribusque rufis. **Panzer**
Ent. germ. I. n. 3. p. 362.

Antennae basi rufae. Thorax rotundatus rufus. Elytra postice rufa.
Femora rufa.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

-
- Tab. 1. *Lethrus cephalotes* Fabric.
— 2. *Scarabaeus nasicornis* Fabric.
— 3. *Scarabaeus subterraneus* Fabric.
— 4. *Scarabaeus fossor* Fabric.
— 5. *Scarabaeus testaceus* mas. et fem. Fabric.
— 6. *Scarabaeus coniugatus* Panzer.
— 7. *Scarabaeus inquinatus* Fabric.
— 8. *Scarabaeus haemorrhoidalis* Fabric.
— 9. *Scarabaeus bipunctatus* Fabric.
— 10. *Scarabaeus quadrimaculatus* Fabric.
— 11. *Scarabaeus fuscus* Fabric.
— 12. *Scarabaeus testudinarius* Fabric.
— 13. *Scarabaeus porcatus* Fabric.
— 14. *Scarabaeus Schreberi* Fabric.
— 15. *Cicindela emarginata* Fabric.
— 16. *Melolontha farinosa* Fabric.
— 17. *Melolontha squamosa* Fabric.
— 18. *Melolontha argentea* Fabric.
— 19. *Melolontha graminicola* Fabric.
— 20. *Melolontha pulverulenta* Fabric.
— 21. *Pap. N. Aegeria* Fabric.
— 22. *Pap. N. Populi* Fabric.
— 23. *Pap. N. Rhamni* Fabric.
— 24. *Pap. S. Galathea* Fabric.



Lethrus cephalotes Fabr.



LETHRVS cephalotes.

Der Kolbenkäfer.

Lethrus cephalotes: corpore subrotundo nigro. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 1. p. 4.

Mant. Inf. T. I. n. 1. p. 2.

Lethrus. *Scop.* introduct. in hist. nat. p. 439. 195.

Lucanus? apterus. *Pallas* inf. ross. I. p. 1. tab. A. fig. 1. a. b. c.

Scarabaeus cephalotes. *Pallas* it. app. n. 23. p. 461.

Bulbocerus cephalotes. *Achar.* in Nov. Act. Suec. II p. 243. tab. 5. fig. 3. 4—19.

Clunipes scarabaeoides. Act. Soc. nat. cur. Berol. VI. tab. 8. fig. 8.

Kugelann in *Schneid.* prompt. III. p. 257.

Panzer Ent. germ. I. addend. p. 164.

Habitat in Austriae et Carinthiae campis aridis.

a. Magnitudo naturalis. b. Vna ex mandibulis adunco falcatis. c. Ant.

tenna clava prona. d. Eadem clava supina.

Acht und zwanzigstes Heft.



Scarabaeus nasicornis Fabr.



SCARABAEVS nasicornis. Mas.

Der Nashornkäfer. Das Männchen. Le Nasicorne. Le Moine Geoffr.

Scarabaeus nasicornis: scutellatus thorace. prominentia triplici, capitis cornu recurvo, elytris laevibus. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 38. p. 14. Syst. Ent. n. 29. p. 11. Spec. Inf. T. I. n. 39. p. 11. Mant. Inf. T. I. n. 36. p. 6.

Scarabaeus nasicornis. *Linn.* Syst. Nat. n. 15. p. 545. ed. XIII. n. 15. p. 1537. Fn. Suec. n. 378.

Scop. carn. n. 14. ic. 14.

Geoffr. Inf. T. I. n. 1. p. 68.

Roefel Insekt. II. Scar. I. tab. 7. fig. 8. 10.

Voet Coleoptr. I. tab. 18. fig. 120. 121.

Drury Inf. I. tab. 34. fig. 7. 8.

Iablonsky Nat. d. Käf. I. p. 287. tab. 6. fig. 4. 5.

Pauzer Entom. germ. I. n. 2. p. 1.

In den Lohbeeten der Kräutergärten, vorzüglich denen aus Eichenborke bereiteten. Variirt in Ansehung seiner Grösse überaus, und ganz vorzüglich in Ansehung des Bruststückes, so daß es verzeihlich wird, wenn man unter so manchen starken Abweichungen, Spuren anzutreffen glaubt, aus welchen man schließen dürfe, die Natur erlaube sich nur dann solcher Abweichungen, wenn sie sich anschike, wahre *Arten* zu erzeugen.

- Stellt ein Männchen in mittlerer Grösse vor.



Scarabaeus subterraneus Fabr.

Jac. Sturm fec



SCARABAEVS subterraneus.

*Der Erdwühler. Der unterirrdische Dungkäfer. Le Souterrein.
Degeer.*

Scarabaeus subterraneus: scutellatus thorace inermi, capite tuberculis tribus: medio subcornuto. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 70. p. 22. Syst. Ent. n. 46. p. 14. Spec. Inf. T. I. n. 58. p. 15. Mant. Inf. T. I. n. 61. p. 8.

Scarabaeus subterraneus: thorace glabro, capite tuberculis tribus, elytris striis crenatis. *Linn.* Syst. Nat. n. 28. p. 548. ed. XIII. n. 28. p. 1546. Fn. Suec. n. 382.

Herbst Nat. d. Käf. II. n. 85. p. 123. tab. 11. fig. 7.

Preysler inf. bohem. I. n. 16. tab. 1. fig. 3.

Panzer Ent. germ. I. n. 5. p. 2.

Lebt im Kuhdünger häufig. Die Streifen auf den Flügeldecken sind allerdings gekerbt, wenn es gleich die vergrößerte Figur dieses Käfers nicht anzeigt.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.



Scarabaeus fossor Fabr.

Jac. Sturm del.



SCARABAEVS Fossor.

Der Grabkäfer. Der Gräber. Le Fossoyeur Devill. La tête armée. Geoffr.

Scarabaeus Fossor: scutellatus thorace inermi retuso, capite tuberculis tribus: medio subcornuto. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 72. p. 23. Syst. Ent. n. 47. p. 14. Spec. Inf. T. I. n. 59. p. 15. Mant. Inf. T. I. n. 62. p. 8.

Scarabaeus Fossor. *Linn.* Syst. Nat. n. 31. p. 548. ed. XIII. n. 31. p. 1546. Fn Suec. n. 384.

Geoffr. Inf. T. I. n. 20. p. 82.


Voet. Coleopt. I. tab. 21. fig. 143.

Herbst Nat. d. Käf. II. n. 86. p. 128. tab. 12. fig. 1.

Panzer Ent. germ. I. n. 6. p. 2.

Ueberall im Kuhdünger häufig, und ändert mit rothbraunen Flügeldecken ab, was man ehemals für *S. oblongus* Scop. hielte.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.



Scarabaeus testaceus Fabr.

S C A R A B A E V S testaceus.

Der lichtbraune Dungkäfer.

Scarabaeus testaceus: scutellatus testaceus, capite bituberculato, elytris punctato striatis. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 83. p. 27. Syst. Ent. n. 50. p. 15. Spec. Inf. T. I. n. 63. p. 16. Mant. Inf. T. I. n. 69. p. 9.

Panzer symb. ent. I. tab. VIII. fig. 1 — 7.

— — Ent. germ. I. n. 17. p. 5.

Dieser noch vor nicht gar langer Zeit von manchem verdienstvollen Entomologen für eine Abänderung des *Scarab. mobilicornis* F. gehaltenen Art, kan das Recht als *wahre Art* auch hier aufgestellt zu werden, nun nicht mehr streitig gemacht werden. Aller Aehnlichkeit ohngeachtet, die dieselbe mit dem *S. mobilic. F.* haben kan, weicht sie nur zu sehr, und ganz vorzüglichst durch den Kopfbau des Weibchens ab. Hr. Prof. *Fabricius*, den ich hievon persönlich zu überzeugen das Vergnügen hatte, ist ganz von seiner vorigen Meinung,

den *S. testaceus* für eine *Variet.* des *S. mobilis*. zu halten abgegangen, und hat mir verstatet, solchen als wahre Art aufs neue zu restituiren. In meinen entomologischen Beyträgen habe ich mich a. a. O. weitläufiger hierüber erklärt, und die vorzüglichsten Gründe zusammengestellt.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung des Männchens. c. Der vergrößerte Thorax und Kopf des Männchens. d. Ebendasselbe vom Weibchen.



Scarabaeus conjugatus Mihi.



S C A R A B A E V S 'coniugatus.

Der vereinigte Dungkäfer.

Scarabaeus coniugatus: scutellatus thorace inermi, capite tuberculis tribus medio subcornuto, elytris testaceis striatis, fascia futuraque pone apicem atris. *Panzer* Ent. germ. I. add. p. 164.

Habitat in Germaniae stercore. *Dn. Schneider.*

Statura *S. Fossoris* at duplo minor. Clypeus emarginatus ater tuberculis tribus: intermedio maiori subcornuto. Thorax inermis ater punctatus, antice foveola parva impressa, margine antice utrinque macula testacea. Scutellum parvum triangulare nigrum. Elytra testacea striata, pone apicem fascia lata crenata atra, quae vero marginem haud attingit, et futura a fascia ad apicem usque excurrente pariter atra. Corpus subtus, antennae, pedesque atra. Tarsi fusci. Elytrorum striae punctatae.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Scarabaeus inquinatus Fabr.

Jac. Sturm fec.

SCARABAEVS inquinatus.

Der schmutzige Dungkäfer.

Scarabaeus inquinatus: scutellatus, capite trituberculato, elytris griseis fusco maculatis. *Fabric.* Ent. Syst. T. I. n. 83. p. 28. Mant. Inf. T. I. n. 74. p. 9.

Scarabaeus inquinatus. *Herbst* Archiv IV. p. 6. n. 16. tab. 19. fig. 5. *Nat. d. K.* II. n. 97. p. 156. tab. 12. fig. 13.

Scarabaeus tessulatus. *Laichard.* inf. tyr. I. n. 7. p. 74.

Panzer Ent. germ. I. n. 23. p. 7.

Preysler inf. bohem. I. n. 96. tab. III. fig. 10. a. b.

Einer der gemeinsten Dungkäfer, der sogleich mit Anfang des Frühjahrs in allen Menschen- und Kuhkoth überall häufig anzutreffen. Er varirt in Hinsicht der schwarzen Flecken auf den Flügeldecken sehr: oft sind letztere mit zarten kurzen Härchen besetzt, am öftesten aber ganz glatt. Nicht selten fehlen die drey Höckerchen auf dem Kopfschild, auch ist an dem Brustschild nicht immer jene gelbe Einfassung zugegen.

a. Natürliche Gröfse. b. Vergrößerung.



Scarabaeus haemorrhoidalis Fabr.

SCARABAEVS haemorrhoidalis.

Der Rothafter.

Scarabaeus haemorrhoidalis: scutellatus niger, thorace nitido punctato, capite tuberculato, elytris striatis apice rufis. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 93. Syst. Ent. n. 56. p. 16. Spec. Inf. I. n. 70. p. 17. Mant. I. n. 77. p. 9. *Sc. granarius* var. β .

Scarabaeus haemorrhoidalis: scutellatus thorace inermi, capite tuberculato, elytris apice rubris. *Linn.* Syst. Nat. n. 33. p. 548. ed. XIII. n. 33. p. 1545. Fn. Suec. n. 386.

Scarabaeus haemorrhoidalis *Herbst* Nat. d. Käf. II. n. 95. p. 152. tab. 12. fig. 11.

Scarabaeus sanguinolentus. *Herbst* Archiv. IV. n. 15. p. 6. tab. 19. fig. 4.

Scarabaeus alpinus. *Scop.* carn. n. 21. ic. 21.

v. *Moll.* Naturh. Briefe I. n. 11. p. 164.

Schaller in act. soc. nat. cur. hal. I. n. 11. p. 248.

Panzer Ent. germ. I. n. 27. p. 8.

Oft fehlt der rothe Fleck auf der äussern Ecke der Flügeldecken. Hinlänglich verschieden vom *S. granarius* F. mit dem er sonst verwechselt worden. Findet sich auf Gebürgstriften im Kuddünger.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.



Scarabaeus bipunctatus Fabr.



SCARABAEUS bipunctatus.

Der zweypunktige Dungkäfer.

Scarabaeus bipunctatus: scutellatus muticus thorace nigro rubro marginato, elytris rubris, puncto nigro. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 109. p. 34. Mant. Inf. T. I. n. 89. p. 10.

Scarabaeus bipunctatus. *Lepech.* it. II. p. 324. tab. 10. fig. 7.

Scarabaeus coccinelloides. *Pallas* inf. ross. I. p. 12. tab. A. fig. 12.

Laxmann nov. comment. petrop. XIV. p. 593. tab. 24. fig. 1.

Herbst Nat. d. Käf. II. n. 189. p. 294. tab. 16. fig. 10.

Kugelann in *Schneid.* prompt. III. n. 7. p. 260.

Panzer Ent. germ. I. n. 33. p. 9.

Dieser sonst nur im südlichen Rußlande und am Wolgaströme für einheimisch und ausschließlich geglaubte schöne Dungkäfer, bewohnt nach der Versicherung des Hrn. Apoth. *Kugelanns*, dem die Insektenkunde so manche wichtige

Acht und zwanzigstes Heft.

Entdeckung dankbar zugesteht, auch unser deutsches Vaterland — und ich durfte ihn deshalb nicht übergehen. Hier ist das *größere* Weibchen abgebildet.

a. Natürliche GröÙe. b. Vergrößerung.



Scarabaeus quadrimaculatus Fabr.

Jac. Stur.

S C A R A B A E V S quadrimaculatus.

Der vierfleckigte Dungkäfer.

Scarabaeus quadrimaculatus: scutellatus muticus oblongus niger thorace elytrorum maculis duabus pedibusque rubris. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 115. p. 36.
Mant. Inf. T. I. n. 94. p. 10.

Scarabaeus quadriguttatus. *Herbst* Archiv. IV. n. 31. p. 10. tab. 19. fig. 15.

Scarabaeus quadriguttatus. *Herbst* Nat. d. Käf. II. n. 164. p. 270. tab. 18. fig. 8.

Panzer im Naturf. XXIV. n. 3. tab. 1. fig. 3.

— — Entom. germ. I. n. 38. p. 10.

Die Synonymen bey *Fabric.* l. c. aus *Linne* und dessen *Fn. Suec.* gehören nicht hieher: sie bezeichnen den *Sc. quadripustul.* *Fabric.* welchen *Herbst* unter *Sc. quadrimacul.* in der *Nat. d. Käf.* abgebildet hat. Im Kühldünger.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.

THE FLORA OF THE MOUNTAINS OF THE HIMALAYAS

BY
J. D. HOOKER

FRUITED BY THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
INDIA

AND
THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
BENGAL

AND
THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
MADRAS

AND
THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
SINDH

AND
THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
PUNJAB

AND
THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
RAJASTHAN

AND
THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
GUJARAT

AND
THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
HYDRABAD

AND
THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
MYSORE

AND
THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
NAGPUR

AND
THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
ORISSA

AND
THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
TRIPURA

AND
THE
HONORABLE THE GOVERNMENT OF
WEST BENGAL



Scarabaeus sus Fabr.

non. Stenon. 1791.

SCARABAEVS ius.

Der zarthärige Dungkäfer. Das Schwein.

- Scarabaeus Sus*: scutellatus muticus oblongus obscure rufus, elytris testaceis nigro maculatis. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 117. p. 36. *Mant. Ins.* T. I. n. 95. p. 11.
Herbst Archiv. IV. n. 29. p. 9. tab. 19. fig. 14. a. b.
— — *Nat. d. Käf.* II. n. 165. p. 271. tab. 18. fig. 9.
Panzer Ent. germ. I. n. 41. p. 11.

Im Menschenkoth an Weegen.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.



Scarabaeus testudinarius Fabr.

S C A R A B A E V S testudinarius.

Der schildkrötenartige Dungkäfer.

Scarabaeus testudinarius: scutellatus muticus niger elytris fulcatis piceis ferrugineo punctatis. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 122. p. 38. Syst. Ent. n. 72. p. 19. Spec. Inf. T. I. n. 81. p. 29. Mant. Inf. T. I. n. 98. p. 11.

Herbst Archiv. IV. n. 21. p. 7. tab. 19. fig. 7. a. b.

— — *Nat. d. Käf.* II. n. 196. p. 277. tab. 18. fig. 13.

Panzer Ent. germ. I. n. 43. p. 11.

Anf frisch gedüngten Feldern, und fliegt nicht selten über diesen. Der *Scarab. Moeris Pall.* gehört hierher nicht.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung. c. Eine vergrößerte Flügeldecke.



Scarabaeus porcatus Fabr.

SCARABAEUS porcatus.

Der gefurchte Dungkäfer.

Scarabaeus porcatus: scutellatus muticus fuscus elytris porcatis. *Fabric.* Ent. syst.

T. I. n. 126. p. 38. Syst. Ent. n. 75. p. 20. Spec. Inf. n. 29. p. 21. Mant.

Inf. T. I. n. 101. p. 11.

Herbst Archiv. IV. n. 24. p. 8. tab. 19. fig. 9. a. b. c.

— — Nat. d. Käf. II. n. 168. p. 275. tab. 18. fig. 12.

Scarabaeus foveolatus. v. *Moll.* Nat. Briefe I. n. 19. p. 173.

Panzer Ent. germ. I. n. 47. p. 12.

Im Dünger auch unter modernden Vegetabilien: fliegt im Frühjahr häufig in der Luft umher.

a. Natürliche Größe, b. Vergrößerung. c. Eine vergrößerte Flügeldecke.



Scarabaeus Schreberi Fabr.



SCARABAEVS Schreberi.

Der Schrebersche Dungkäfer. Le Boufier à pointes rouges Geoffr.

Scarabaeus Schreberi: exscutellatus muticus ater glaber, elytris maculis duabus rufis. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 225. p. 63. Syst. Ent. n. 120. p. 30. Spec. Inf. T. I. n. 151. p. 33. Mant. Inf. T. I. n. 172. p. 17.

Scarabaeus Schreberi. Linn. syst. Nat. n. 45. p. 551. ed XIII. n. 45. p. 1556.

Copris niger nitidus, thorace antice gibbo, elytro singulo macula duplici rubra. *Geoffr.* Inf. T. I. n. 7. p. 91.

Schüffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 73. fig. 6.

Harrer Besch. d. Sch. Inf. I. B. n. 20. p. 25.

Voet Inf. II. n. 49. p. 29. tab. 28. fig. 49.

Herbst Nat. d. Käf. II. n. 203. p. 318. tab. 20. fig. 8.

Panzer Ent. germ. I. n. 72. p. 18.

Im ieden K ü h d ü n g e r nicht selten. Die vier auf dem Bruststücke stehenden Höckerchen fehlen öfters.

a. Natürliche Gröfse. b. Vergrößerung. c. Das vergrößerte Bruststück etc.



Cicindela emarginata Fabr.



C I C I N D E L A emarginata.

Der an den Spitzen der Flügeldecken ausgerändete Sandkäfer.

Cicindela emarginata: caerulea, ore antennis pedibusque rufis, elytris apice emarginatis. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 37. p. 177.

Carabus dentatus. *Rossi* fn. etrusc. I. p. 222. n. 551. tab. 2. fig. 11.

Panzer Ent. germ. I. addend. p. 367.

Dieser seltene schöne Sandkäfer ist auch im österreichischen zu Hause, und so nach als ein eigentliches deutsches Insect anzusehen.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.



Melolontha farinosa Fabr.

M E L O L O N T H A farinosa.

Der azurblaue Maykäfer. L'écailleux violet Geoffr.

Melolontha farinosa: supra caeruleo subtus argenteo squamosa nitens, clypeo integro. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 77. p. 173. Syst. Ent. n. 31. p. 38. Spec. Inf. T. I. n. 47. p. 43. Mant. Inf. T. I. n. 61. p. 23.

Scarabaeus violaceus squamosus: squamis subtus argenteis. *Geoffr.* Inf. T. I. n. 13. p. 79.

Voet Coleopt. I. n. 73. tab. 9. fig. 73.

Drury Inf. T. II. tab. 32. fig. 4.

Melolontha caerulea. *Herbst* Nat. d. Käf. III. n. 73. tab. 35. fig. 5.

Panzer Ent. germ. I. n. 19. p. 225.

Gehört noch zu den, wenigstens gegenwärtig, seltenen deutschen Insekten. ist aber mehreremale im österreichischen gefunden worden. Die Bemerkung ist allerdings richtig, daß dieser Käfer im heißen Wasser sein prächtiges azurblau in das schönste Grün umwandelt.

a. Natürliche Gröſſe. b. Vergrößerung. c. Ein vergrößerter Hinterfuß.



Melolontha squamosa Fabr.

M E L O L O N T H A squamosa.

Der schuppichte Maykäfer.

Melolontha squamosa: supra viridi squamosa subtus pallido nitens, capite fusco.

Fabric. Ent. syst. T. II. n. 78. p. 174.

Scarabaeus farinosus: scutellatus muticus niger polline virescente, elytris abbreviatis. *Linn.* Syst. Nat. n. 64. p. 555. ed. XIII. n. 64. p. 1564. Fn. Suec. n. 399.

Scarabaeus argenteus. *Scop.* carn. n. 9. ic. 9.

Voet Coleoptr. I. n. 71. tab. 9. fig. 71.

Melolontha argentea. *Herbst* Nat. d. Käf. III. n. 74. tab. 25. fig. 6.

Nicht selten. Varirt in Ansehung der Grösse und der Farbe.

a. Natürliche Grösse, b. Vergrößerung.



Melolontha argentea Fabr.

M E L O L O N T H A argentea.

Der am Unterleib silberne Maykäfer.

Melolontha argentea: clypeo marginato nigra, subtus argenteo nitens elytris testaceis. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 80. p. 174. Syst. Ent. n. 32. p. 38

Spec. Inf. T. I. n. 48. p. 44. *Mant. Inf.* T. I. n. 61. p. 23.

Scarabaeus Philanthus. *Sulzer* abgek. Gesch. d. Inf. p. 18. tab. 1. fig. 8.

Scarabaeus Sulzeri. *Fuesly* Inf. helv. n. 35. p. 3.

Melolontha Philanthus. *Herbst* Nat. d. Käf. III. n. 72. tab. 25. fig. 4.

Panzer Ent. germ. I. n. 21. p. 225.

Auf blühenden Staudengewächsen im heißen Sommer.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.



Melolontha graminicola Fabr.



MELOLONTA graminicola.

Der Gras-Maykäfer.

Melolontha graminicola: argenteo-squamosa clypeo reflexo. *Fabric.* Ent. syst.

T. II. n. 81. p. 175.

Melolontha farinosa. *Herbst* Nat. d. Käf. III. n. 71. tab. 25. fig. 3.

Panzer Entom. germ. I. n. 22. p. 226.

Eine sehr schätzbare Entdeckung des Hrn. Prof. *Hellwigs* in Braunschweig, dessen Güte ich auch dieses abgebildete Exemplar verdanke.

a. Natürliche Größe. b. Vergrößerung.



Melolontha pulverulenta Fabr.

Jac St. fcc.

MELOLONTHA pulverulenta.

Der gepuderte Maykäfer.

Melolontha pulverulenta: corpore polline virescenti argenteo, elytris pedibusque testaceis. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 93. p. 178. *Syst.* Ent. n. 33. p. 39.

Spec. Inf. T. I. n. 56. p. 45. *Mant. Inf.* T. I. n. 69. p. 24.

Melolontha minuta: supra viridi, subtus argenteo-squamosa nitens pedibus monodactylis. *Panzer* im Naturf. XXIV. n. 11. p. 9. tab. I. fig. 11.

Sehr selten: aus dem südlichen Deutschlande, einst nur aus Italien.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.



Papilio N. Aegeria Fabr.

PAPILIO Nymphalis Aegeria.

Der Queckengrasfalter. Der Waldargus. Le Tircis. The Enfield Eye. Het bonte Zand oogje.

Papilio Nymph. Aegeria: alis dentatis fuscis luteo maculatis: anticis utrinque ocello, posticis supra ocellis subtus punctis quatuor. *Fabric.* Syst. Ent. n. 214. p. 492. Spec. Inf. T. II. n. 325. p. 73. Mant. Inf. T. II. n. 381. p. 37. Ent. Syst. T. III. P. I. n. 293. p. 94.

Papilio Nymph. Aegeria. Linn. Syst. Nat. n. 143. p. 771. ed. XIII. n. 143. p. 2295. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 166.

Geoffr. Inf. T. II. n. 16. p. 148.

Scop. carn. n. 432. ic. 432.

Sepp. Inf. I. 33. Tab. VI.

Roefel Inf. Bel. IV. tab. 33. fig. 34.

Schaeffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 75. fig. 1. 2.

Esper eur. Schm. I. tab. 7. fig. 1.

Bergstraeß. nomencl. I. tab. 22. fig. 6. 7.

Borkhausen eur. Schm. I. n. 17. p. 78. et n. 17. p. 236.

Die Raupe dieses Falters ist mattgrün, mit dunkelgrünen und weissen Streifen und überall mit zarten weissen Härchen besetzt. Sie kommt im August zum Vorschein. Gegen Ende desselben, oder auch erst im September verwandelt sie sich in eine eckigte Puppe. Die Nahrung der Raupe ist Queckengras und mehrere weiche Grasarten. Der Falter erscheint schon im Frühlinge und fliegt fast den ganzen Sommer. Sein Aufenthalt sind düstere Hainen und Wälder, in welchen er einzeln lebt.



Papilio N. Populi Fabr.

J. St. sc.

PAPILIO Nymphalis Populi.

*Die Pappelnymphe. Der Eisvogel. Der grosse Eisvogel. Der
Aespenfalter. Le Silvain. Le Grand Silvain. De
Nimweegsche Kappel.*

Papilio Nymphal. Populi: alis dentatis fuscis albo fasciatis maculatisque, subtu
luteis albo fasciatis: maculis caeruleiscentibus. *Fabric. Syst. Ent. n. 251 p. 502.*
Spec. Inf. T. II. n. 386. p. 87. Mant. Inf. T. II. n. 466. p. 47. Ent. Syst.
T. III. P. I. n. 343. p. 111.

Papilio Nymph. Populi. Linn. Syst. Nat. n. 162. p. 776. ed. XIII. n. 162. p. 2310.
Fn. Suec. n. 1055.

Syst. Verz. der W. Schm. n. 1. p. 172.

Schaeffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 40. fig. 8 9.

Roessel Insekt. B. III. tab. 33. fig. 1. 2. IV. tab. 31. fig. 1—5.

Esper eur. Schm. I. tab. 12. fig. 1. tab. 31. fig. 1.

Bergsträff. nomencl. I. tab. 15. fig. 3. 4. tab. 19. fig. 3. 4. tab. 31. fig. 1. 2. 3.
tab. 98. fig. 1. tab. 112. fig. 4.

Borkhausen eur. Schm. I. n. 1. p. 3. et n. 1. p. 193.

Der Kopf der Raupe ist herzförmig getheilt, und das nächste fleischfarbige Gelenke hinter demselben erhebt sich auf einmal sehr, und läuft in zwei mit vielen Dörnchen besetzte Spitzen aus. Die übrigen Gelenke haben fleischerne mit vielen kleinen Dörnchen besetzte Erhöhungen, und wechseln in der Farbe mit dem grünen und fleischfarbigen ab, sind dabey mit dunklern Spiegelflecken geziert. Sie lebt einsam auf der Aespe oder Zitterpappel (*Populus tremul* L.) und auf den Buchen. Der Falter fliegt im Junius und Julius, am liebsten auf Wiesen und feuchten Plätzen, welche zwischen Waldungen liegen.



Papilio D. Rhamni Fabr.

PAPILIO Danaus Rhamni.

*Der Kreuzdornfalter. Der Citronenschmetterling. Der ganz gelbe
Tagvogel. Le Citron. Papilion de la Canicule. The
Brimstone Butterfly.*

Papilio Dan. Rhamni. alis integerrimis angulatis flavis: singulis puncto ferrugineo. *Fabric.* Syst. Ent. n. 155. p. 478. Spec. Inf. T. II. n. 220. p. 50. Mant. Inf. T. II. n. 253. p. 24. Ent. syst. T. III P. I. n. 661. p. 211.

Papilio Dan. Rhamni. Linn. Syst. Nat. n. 106. p. 765. ed. XIII. n. 106. p. 2172. Fn. Suec. n. 1042.

Syst. Verz. der W. Schm. n. 1. p. 164.

Geoffr. Inf. T. II. n. 47. p. 74.

Schaeffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 35. fig. 1. 2. 3.

Degeer Inf. I. p. 132. tab. 15. fig. 1 — 10. *Uebersetz.*

Sälzer Kennz. d. Inf. tab. 13. fig. 84.

Roesel Insekt. B. III. p. 264. tab. 46. fig. 1 — 4.

Esper eur. Schm. I. tab. 4. fig. 4.

Bergstrüff. nomencl. I. tab. 15. fig. 7. 8.

Borkhausen eur. Schm. I. n. 1. p. 117. et n. 1. p. 252.

Die Raupe dieses Falters ist grün, mit einem hellern Bauche und mit vielen kleinen weißen Härchen besetzt, ob sie gleich glatt zu seyn scheint. Ihre Futterpflanze ist der Kreuzdorn und der Faulbaum (*Rhamnus catharticus*. *Rb. Frangula* L.), wo man sie vom Anfange des Mayes bis zu Ende des Sommers findet. Der Falter zeigt sich in den ersten warmen Frühlingstagen, oft schon im Februar, und man findet ihn bis im tiefen Herbst in Gärten, Wiesen und Wäldern.



Papilio S. Galathea Fabr.



PAPILIO Satyrus Galathea.

*Der Marmorargus. Das Bretspiel. Der Lieschgrasfalter. Le
Demi-dueil. Common Half-Mourner.*

Papilio Satyr. Galathea: alis dentatis albo nigroque variis: subtus anticis ocello unico, posticis quinque. *Fabric.* Syst. Ent. n. 230. p. 496. Spec. Inf. T. II. n. 349. p. 79. Mant. Inf. T. II. n. 421. p. 43. Ent. syst. T. III. P. I. n. 745. p. 239.

Papilio Nymph. Gem. Galathea. Linn. Syst. Nat. n. 147. p. 772. ed. XIII. n. 147. p. 2298.

Syst. Verz. der W. Schm. n. 1. p. 166.

Geoffr. Inf. T. II. n. 46. p. 74. tab. XI. fig. 3. 4.

Roefel Insekt. B. III. p. 227. tab. 37. fig. 1 — 7.

Schaeffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 98. fig. 7. 8. 9.


Esper eur. Schmett. I. tab. 7. fig. 3. et tab. 25. fig. 1.

Bergsträsser nomencl. I. tab. 6. et tab. 92.

Borkhausen enr. Schm. I. n. 48. p. 105. et n. 48. p. 245.

Die Raupe dieses Falters ist bald grün bald gelb mit einigen dunklern Linien. Ueber den Schwanzspitzen stehen zwey rothe Dörnchen. Ueber dem ganzen Rücken sind viele kleine Häichen. Ihr Körper ist stark und fast eyrund. Sie verwandelt sich in einer verkehrt aufgehängten Lage. Ihre Puppe ist nicht vieleckigt, sondern mehr zugerundet, und nähert sich den Puppen der Phalänen. Der Falter erscheint im Julius und dauert bis in den September. Seine Aufenthaltsörter sind Gärten, Wiesen und freie graslichte Plätze in den Wäldern. *Borkb.*

-
- Tab. 1. *Donacia striata* Panzer.
 — 2. *Donacia Festucae* Fabric.
 — 3. *Donacia discolor* mas Panzer.
 — 4. *Donacia discolor* fem. Panzer.
 — 5. *Donacia dentipes* Fabric.
 — 6. *Donacia Nymphaeae* Fabric.
 — 7. *Donacia Sagittariae* Fabric.
 — 8. *Donacia collaris* Fabric.
 — 9. *Donacia micans* Panzer.
 — 10. *Donacia palustris* Panzer.
 — 11. *Donacia vittata* Panzer.
 — 12. *Donacia limbata* Panzer.
 — 13. *Donacia clavipes* Fabric.
 — 14. *Donacia semicuprea* Panzer.
 — 15. *Donacia simplex* Fabric.
 — 16. *Donacia testata* Panzer.
 — 17. *Donacia Hydrocharis* Fabric.
 — 18. *Buprestis decostigma* mas. Fabric.
 — 19. *Buprestis decostigma* fem. Fabric.
 — 20. *Buprestis rubi* Fabric.
 — 21. *Buprestis pruni* Panzer.
 — 22. *Buprestis cyanicornis* Fabric.
 — 23. *Tortrix arcuana* Fabric.
 — 24. *Tortrix Schwarzana*.



Donacia striata Mihi.



DONACIA striata.

Der gestreifte Flusspflanzenkäfer.

Donacia striata: aenea abdomine argenteo, elytris argute striatis, striis violaceis, interstitiis punctatis. *Panzer* Ent. germ. I. n. 4. p. 215.

Caput aeneum medio fulcatum. Oculi prominuli globosi fusci. Antennae fuscae, articulis basi flavis. Thorax cylindricus viridi aeneus, medio violaceus canaliculatus, margine laterali impresso et gibbo. Scutellum viridi aeneum triangulare. Elytra truncata viridi aenea, margine laterali inaurata, striata, interstitiis punctatis violaceis. Femora clavata, postica dentata. Corpus subtus argenteo-villosum. E maioribus.

Habitat in plantis aquaticis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

Neun und zwanzigstes Heft.



Donacia festucae Fabr.

J. St. f.

DONACIA Festucae.

Der Schwingel - Flusspflanzenkäfer.

Donacia Festucae: caeruleo nigra femoribus posticis incrassatis dentatis. *Fabric.*

Ent. syst. T. II. n. 2. p. 116.

Panzer Ent. germ. I. n. 2. p. 214.

Habitat in Germaniae Festuca fluitante, Caltha palustri et Iride Pseud-acoro. L.

3. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia discolor Mihi Mas.

J. St. fec.

DONACIA discolor Mas.

Der unbeständig farbige Flusspflanzenkäfer. Das Männchen.

Donacia discolor: obscure aenea, elytris cupreis crenato-striatis, femoribus posticis dentatis. *Panzer* Ent. germ. I. n. 12. p. 216.

Caput obscurum exsertum. Oculi prominuli globosi atrii. Antennae fuscae, articulis basi flavis. Thorax teretiusculus antice margine laterali gibbo, medio lineae exarata. Elytra linearia, crenato-striata. Femora clavata: postica dentata. Tibiae basi flavae. Corpus subtus nigrum.

Frequens primo vere in plantis aquaticis et paludosis, Caltha palustri, Ranunculo Ficaria. L. cet. Si quae alia species inprimis haec est, quae maxime coloribus ludit. Variat elytris cupreis, violaceis, et viridi aeneis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia discolor Femina.



DONACIA discolor Femina.

Der unbeständig farbige Flusspflanzenkäfer. Das Weibchen.

Donacia discolor: obscure aenea, elytris cupreis crenato-striatis, femoribus posticis dentatis. *Panzer* Ent. germ. I. n. 12. p. 216.

Habitat cum mare.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia dentipes Fabr.

DONACIA dentipes. *)

Der zahnſchenklichte Fluſſpflanzenkäfer.

Donacia dentipes: aenea elytris cupreis: margine omni viridi, femoribus posticis dentatis. *Fabric.* Ent. ſyſt. T. II. n. 3. p. 116.

Panzer Ent. germ. I. n. 3. p. 214.

Habitat in Pſeudacoro, Caricibus, Typha cet. in paludosis et aquis ſtagnantibus.

*) Quum plerarumque huius generis ſpecierum femora denticulis armata ſint, hinc minus commoda ſpecifica nuncupatione *dentipedis*, haec inclaruiſſe videtur. Eſt omnino in votis, infecta, nominibus gaudere, quae haud procul diſtent, a nota, qua inprimis diſtinguntur ſpecifica. Inique verum ii agunt, et ſcientiae parum conſulunt, qui tali tenui opere in iis nominibus mutandis incumbunt. Non leve enim periculum ſcientiae imminet, ſi in dies multiplicantur ſpecierum nomina: quo facto, ut artem, non ſpeciebus rite definitis, ſed nominibus undique corraſis maleque ſaepius excogitatis, augeamus. Hinc praestat, nomen ſervare, quod primus inventor pro ſpecie ſua illuſtranda elegit, quam id, liceat in melius, mutare: non enim a nomine, ſed a debita et ſuccincta definitione, ſpeciei cuiuscunque eſſentia exſpectanda.


a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

THE HISTORY OF THE

PLANT KINGDOM

BY
J. E. SMITH, Esq.
F.R.S.
IN TWO VOLUMES.
LONDON:
PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, 1773.

THE HISTORY OF THE PLANT KINGDOM, AS FAR AS THE KNOWLEDGE OF IT IS NECESSARY TO THE UNDERSTANDING OF THE HISTORY OF MAN, AND THE CONDUCT OF HIS AFFAIRS, IS THE SUBJECT OF THIS WORK. THE AUTHOR HAS BEEN ASSISTED BY THE OBSERVATIONS OF SEVERAL OF HIS FRIENDS, WHOSE NAMES ARE MENTIONED IN THE PREFACE. THE WORK IS DIVIDED INTO TWO PARTS, THE FIRST OF WHICH CONTAINS A DESCRIPTION OF THE PLANTS OF THE WORLD, AND THE SECOND A HISTORY OF THE PLANTS OF THE WORLD, AS FAR AS THE KNOWLEDGE OF IT IS NECESSARY TO THE UNDERSTANDING OF THE HISTORY OF MAN, AND THE CONDUCT OF HIS AFFAIRS.



Donacia Nymphaeae Fabr.



DONACIA Nymphaeae.

Der Flusspflanzenkäfer auf der Seerose.

Donacia Nymphaeae: thorace elytrisq[ue] cupreis, corpore cinereo villos[us], femoribus posticis dentatis. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 4. p. 116.

Panzer Ent. germ. I. n. 5. p. 215.

Habitat in Nymphaea et Potamogetone.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia Sagittariae Fabr.

DONACIA Sagittariae.

Der Flusspflanzenkäfer auf dem Pfeilkraut.

Donacia Sagittariae: supra aenea, elytris submicantibus, subtus villosa aurea, femoribus posticis dentatis. *Fabric. Ent. syst. T. II. n. 5. p. 117.*

Panzer Ent. germ. I. n. 5. p. 215.

Habitat in Sagittaria et Arund. Phragmit. L.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia collaris Mihi.



DONACIA collaris.

Der grüne Flus pflanzenkäfer mit dem blauen Bruststück.

Donacia collaris: thorace cylindrico cyaneo, elytris viridi aeneis submicantibus.

Panzer Ent. germ. I. n. 11. p. 216.

Habitat in Germaniae Sparganio. Affinis *D. Sagittariae* cui simillima: differt thorace cyaneo.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

THE VOLUME

CONTAINING THE

ENTIRE CONTENTS OF THE

ENTIRE COLLECTION

OF THE

ENTIRE COLLECTION



Donacia micans Mihi.

DONACIA micans.

Der glänzende Flusspflanzenkäfer.

Donacia micans: viridi aenea, elytris punctatis transversim striatis micantibus, femoribus posticis dentatis.

Caput obscure aeneum. Oculi globosi prominuli. Antennae obscure aeneae, unicolores. Thorax subquadratus viridi aeneus, antice margine laterali tuberculatus, medio linea impressa. Scutellum viride. Elytra viridiaenea, punctis in strias dispositis, transversim striata, micantia. Corpus subtus aeneum. Pedes aenei, femoribus posticis clavatis dentatis.

Habitat in plantis aquaticis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia palustris Mhi.

DONACIA palustris.

Der Sumpf-Flusspflanzenkäfer.

Donacia palustris: abdomine pedibus antennisque rufis, elytris atro-aeneis punctato-substriatis. *Panzer* Ent. germ. I. n. 13. p. 217.

Caput atro aeneum subviolaceum medio fossula impressa. Antennae rufae, articulo primo clavato maximo. Thorax obscure aeneus antice margine laterali gibbo, medio linea exarata. Elytra obtusa atro aenea punctato-substriata. Pedes rufi, femoribus posticis clavatis in omni sexu dentatis. Corpus subtus rufum.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia vittata Mihi.



DONACIA vittata.

Der gebänderte Flusspflanzenkäfer.

Donacia vittata: elytris inauratis, margine laterali vittaque baseos abbreviata atrovioleaceis.

Caput aureum nitidulum inter oculos linea impressa. Antennae fuscae articulo primo maximo. Thorax punctatus subaequalis medio linea impressa. Elytra inaurata opaca, punctato-friata, margine laterali vittaque baseos abbreviata atrovioleacea. Corpus subtus argenteum. Pedes aurei, femoribus posticis clavatis.

Habitat in Nymphaea, Potamogetone.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia limbata Mili.



DONACIA limbata.

Der gesäumte Flusspflanzenkäfer.

Donacia limbata: elytris aeneis margine laterali limbo purpureo, femoribus posticis inermibus.

Caput aeneum nitidulum punctatum medio linea impressa. Antennae fuscae, articulo primo aeneo. Thorax aequalis aeneus punctatus medio linea obsoleta. Elytra truncata aenea, punctato-friata, micantia margine laterali limbo purpureo. Corpus subtus pallide aeneum. Pedes aenei femoribus clavatis inermibus.

Habitat in Ranunculis aquaticis cet.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia clavipes Fabr.



DONACIA clavipes.

Der Keulenschenklichte Flusspflanzenkäfer.

Donacia clavipes: aenea, abdomine argenteo villoso, femoribus posticis clavatis inermibus. *Fabric. Ent. syst. T. II. n. 7. p. 117.*

Panzer Ent. germ. I. n. 8. p. 216.

Caput, pedes et abdomen villositate cinerea tecta. Elytra aenea, margine laterali viridia.

Habitat in plantis aquaticis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia semicuprea Mihi.

DONACIA femicuprea:

Der halbkupferrothe Flusspflanzenkäfer.

Donacia femicuprea: elytris viridi aeneis disco cupreis, antennis pedibusque piceis. Caput obscure aeneum, linea inter oculos impressa obsoleta. Antennae piceae. Thorax obscure cupreus punctatus linea medio exarata. Elytra viridi aenea punctato-striata, disco cuprea. Pedes picei: femoribus omnibus clavatis inermibus. Corpus subtus obscure aeneum.

Habitat in plantis aquaticis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia simplex Fabr.



DONACIA simplex.

Der Flusspflanzenkäfer mit stachellosen Schenkeln.

Donacia simplex: aenea nitidula, pedibus omnibus simplicibus. *Fabric.* Ent. syst.
T. II. n. 9. p. 118.

Panzer Ent. germ. I. n. 9. p. 216.

Habitat in plantis aquaticis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia tersata Mili.

DONACIA *tersata*.

Der glatte Flusspflanzenkäfer.

Donacia tersata: aenea opaca elytris laeviusculis punctato-striatis, femoribus posticis simplicibus.

Corpus depressum. Caput aeneum medio linea obsoleta. Antennae fuscae, articulis basi rufis. Thorax depressus subaequalis antice margine laterali gibbo. Elytra sublaevia aenea punctato-striata. Pedes nigri, femoribus basi rufis inermibus. Corpus subtus opaco-aeneum.

Habitat in plantis aquaticis.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Donacia Hydrocharis Fabn.

DONACIA Hydrocharis.

Der Flusspflanzenkäfer auf dem Froschbiss.

Donacia Hydrocharis: cinerascens subtus argenteo villosa pedibus simplicibus.

Fabric. Ent. syst. T. II. n. 10. p. 118.

Panzer Ent. germ. I. n. 10. p. 216.

Habitat in Germaniae Typha, Hydrocharide intacta.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Buprestis decostigma Mas Fabr.

J. St. fec.

BVPRESTIS decostigma.

Der Prachtkäfer mit sieben gelben Punkten.

Buprestis decostigma: elytris integris elevato striatis fuscis: punctis quinque flavis.

Fabric. Ent. syst. T. II. n. 71. p. 203.

Panzer Ent. germ. I. n. 10. p. 229.

Caput et thorax obscure aenea punctata. Antennae nigrae. Elytra punctis elevatis confluentibus punctata, apice sub lente ferrulata.

Puncta elytrorum numerum ab illustr. *Fabric.* constitutum non servant: hinc in figura nostra *duodecim* numerantur. Aberrationis huius ratio in sexus variabili indole equidem mihi quaerenda, quare marem *hanc* seminae sequentis habeo.

Habitat in Austriae Quercu.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Leptostethus decostigmatus Fabricius

BVPRESTIS decoctigma Femina.

Der Prachtkäfer mit sieben gelben Punkten. Das Weibchen.

Buprestis decoctigma: elytris integris elevato striatis fuscis: punctis quinque flavis.

Fabric. l. c. Panzer l. c.

De Villers in faun. ex hac propriam constituit speciem, quod frustra! In omnibus enim haec cum priori convenit *Buprestis*: ergo numerus punctorum solus, haud pro differentia specifica admittendus. Varietas sexus mihi videtur.

Habitat cum priori.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Buprestis Rubi Fabr.

J. St. fec.

BVPRESTIS Rubi.

Der Himbeer Prachtkäfer.

Buprestis Rubi: elytris integris: fasciis cinereis undatis, corpore cylindrico nigro.
Fabric. Syft. Ent. n. 30. p. 221. Spec. Inf. T. I. n. 44. p. 280. Mant. Inf.
T. I. n. 66. p. 182. Ent. syft. T. II. n. 91. p. 208.

Buprestis Rubi. *Linn.* Syft. Nat. n. 14. p. 662. ed. XIII. n. 14. p. 1934.

Panzer Ent. germ. I. n. 19. p. 231.

Elytra sub lente ferrulata.

Habitat in Germaniae Rubo.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Buprestis Pruni Mihi.

J. St. f. ec.



BVPRESTIS Pruni.

Der Pflaumen Prachtkäfer.

Buprestis Pruni: elytris integris obscure violaceis, apice fasciis tribus undatis cinereis: corpore elongato cyaneo.

Caput aeneum inter oculos linea impressa. Antennae nigrae. Thorax aeneus nitidulus punctatus. Elytra integra, sub lente apice ferrulata, atro violacea, apicem versus suturatiore, fasciis hinc tribus undatis, punctoque ante fascias albis. Corpus subtus atro cyaneum nitidum. Pedes aenei.

Habitat in Germaniae Pruno domestica L.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Buprestis cyanicornis Fabr.

BVPRESTIS cyanicornis.

Der Prachtkäfer mit den himmelblauen Fühlhörnern.

Buprestis cyanicornis: elytris integris obscure viridibus, thorace lineis duabus obscurioribus, antennis caeruleis. *Fabric.* Ent. syst. T. II. n. 94. p. 208.

Buprestis Stephanelli. *Petagna* inf. calab. n. 110.

Buprestis femorata. *Devillers* Ent. I. p. 338. n. 34. tab. 1. fig. 40.

In ditionibus nostris hanc Buprestid. reperiisse retulit amicus coniunctissimus
Dn. Schwarz.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta. c. Antenna aucta.



Pyralis arcuana Fabr.



PYRALIS arcuana.

Der goldgelbe Wickler mit einer schwarzen Mackel und Silber.
Der Bogenwickler.

Pyrallis arcuana: alis luteis: fasciis tribus arcuatis maculaque disci atra: punctis tribus argenteis. *Fabric.* Ent. syst. T. V. n. 72. p. 260. Syst. Ent. n. 22. p. 649. Spec. Inf. T. II. n. 31. p. 281. Mant. Inf. T. II. n. 53. p. 230.

Phal. Tort. arcuana: alis luteis: fasciis tribus arcuatis, macula nigr atripunctata lineo-
lisque duabus argenteis. *Linn.* Syst. Nat. n. 296. p. 877. ed. XIII. n. 296. p. 2504.

Syst. Verz. der W. Schm. n. 11. p. 126.

Scopoli carn. n. 658 ic. in tab. müt.

Naturforscher XXV. p. 45. tab. II. fig. 2.

Die Raupe dieses Blatwicklers ist noch unbekannt. Zufolge der Bemerkung des Hrn. Prof. *Kaspers* in dem angezeigten St. des Naturf. tritt man diesen Wickler in Junius ötters auf Grashalmen an.

a, Natürliche Größe. b, Vergrößerung.



Pyralis Schwarzana Mihi.

PYRALIS Schwarzana.

Der Schwarze Blatwickler.

Pyralis Schwarzana: alis luteis: fascia, maculis marginalibus, disci, punctoque
baseos argenteis.

Dixi in honorem *Dn. Ch. Schwarz* Entomologi indefessi, cui practer alia
insecta, et hanc Pyralidem, quam benevole meum communicavit, debeo.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

J n h a l t

des dreyfigsten Hefts.

Tab. 1. *Carabus leucophthalmus* Fabric.

— 2. *Carabus ruficornis* Fabric.

— 3. *Carabus terricola* Fabric.

— 4. *Carabus sabulicola* Panzer.

— 5. *Carabus crepitans* Fabric.

— 6. *Carabus spinibarbis* Fabric.

— 7. *Carabus cinctus* Fabric.

— 8. *Carabus Dianae* Fabric.

— 9. *Carabus atricapillus* Fabric.

— 10. *Carabus punctulatus* Fabric.

— 11. *Carabus helopioides* Fabric.

— 12. *Carabus aterrimus* Fabric.

— 13. *Carabus sexpunctatus* Fabric.

— 14. *Carabus marginatus* Fabric.

— 15. *Carabus festivus* Panzer.

— 16. *Carabus pumicatus* Panzer.

— 17. *Carabus vernalis* Panzer.

— 18. *Carabus inaequalis* Panzer.

— 19. *Carabus melanocephalus* Fabric.

— 20. *Carabus lutescens* Panzer.

— 21. *Carabus articulatus* Panzer.

— 22. *Carabus confluentus* Panzer.

— 23. Pap. Equ. Achiv, Machaon Fabric.

— 24. Pap. Equ. Achiv. Podalirius Fabric.



Carabus leucophthalmus Fabr.

CARABVS leucophthalmus.

Der weisäugichte Laufkäfer. Le Bupreste tout noir. Geoffr.

Carabus leucophthalmus: apterus ater elytris striatis, thorace lineolis baseos impressis. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 36. p. 132. *Syst. Ent.* n. 23. p. 240. *Spec. Inf.* T. I. n. 29. p. 304. *Mant. Inf.* T. I. n. 41. p. 198.

Carabus leucophthalmus. *Linn.* *Syst. Nat.* n. 4. p. 666. ed. XIII. n. 4. p. 1962. *Fn. Suec.* n. 784.

Buprestis ater, elytro singulo striis octo laevibus, pedibus nigris. *Geoffr.* *Inf.* T. I. n. 7. p. 146.

Paykull monogr. Carab. n. 16. p. 29.

Panzer Ent. germ. I. n. 23. p. 49.

Hier eine Laufkäferart, über deren richtige ganz zweifellosse Bestimmung noch nicht alle Entomologen im reinen seyn dürften. Ich habe darum auch keine andere entomologische Schrift angeführt, als von der ich nach meiner Ueberzeugung Gewähr leisten kan. Man findet diesen Laufkäfer häufig an unreinen Orten, unter Steinen, in waldichten Gegenden unter abgefallnem Laub.



Carabus, ruficornis Fabr.

CARABVS ruficornis.

Der Laufkäfer mit braunrothen Fühlhörnern. Le Eupreste noir velouté. Geoffr.

Carabus ruficornis: alatus ater, elytris sulcatis subtomentosis, antennis pedibusque rufis. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 42. p. 134. Syst. Ent. n. 27. p. 241. Spec. Inf. T. I. n. 35. p. 305. Mant. Inf. T. I. n. 48. p. 199.

Buprestis niger, elytro singulo striis octo laevibus. *Geoffr.* Inf. T. I. n. 8. p. 146. *Paykull.* monogr. Car. n. 74. p. 121.

Panzer Ent. germ. I. n. 28. p. 50.

Nicht selten unter Steinen, unter abgefallnem Laub, in waldichten Gegenden. Die Flügeldecken sind mit kurzen äusserst zarten Härchen besetzt, und schimmern daher in einer gewissen Richtung in das goldartige oder kupferglänzende.



Carabus terricola Fabr.

CARABVS terricola.

Der in der Erde wühlende Laufkäfer.

Carabus terricola: alatus ater nitidus, elytrorum striis laevibus, antennarum apice pedibusque rufis. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 49. p. 135.

Paykull. mon. Car. n. 17. p. 31.

Herbst Archiv. V. 2. n. 51. p. 140. tab. 29. fig. 14.

Panzer Ent. germ. n. 34. p. 51.

Nicht gemein. Man findet ihn um Berlin und Wien.

a. Natürliche GröÙe. b. Eine vergrößerte Flügeldecke.



Carabus sabulicola Mihi.

CARABVS fabulicola.

Der im Sande wühlende Laufkäfer.

Carabus fabulicola: alatus ater, elytris striatis violaceis, antennis pedibusque ferrugineis.

Habitat Norimbergae primo vere frequens.

Duplo minor praecedenti, cui similis est differt thorace magis quadrato antennis pedibusque omnibus ferrugineis. Caput prominens atrum nitidum punctatum, palpis antennarumque atticulis omnibus ferrugineis. Thorax planus punctatus, linea media obsoleta. Elytra violacea striata; striis omnibus purcis impressis. Pedes omnes ferruginei. Corpus subtus atrum, pectore saepius ferrugineo.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Carabus crepitans Fabr.

CARABUS crepitans.

Der Bombardierkäfer. Der Platzkäfer. Le Bombardier.

Carabé petard.

Carabus crepitans: alatus capite thorace pedibusque ferrugineis, elytris nigris.

Fabric. Ent. syst. T. I. n. 53. p. 136. Syst. Ent. n. 35. p. 242. Spec. Inf.

T. I. n. 44. p. 307. Mant. Inf. T. I. n. 61. p. 200.

Carabus crepitans. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 671. ed. XIII. n. 18. p. 1971. Fn.

Suec. n. 272.

Carabus capite thorace, pedibusque rubris, elytris caeruleo-nigris. *Geoffr.* Inf.

T. I. n. 19. p. 151.

Dégeer Inf. T. IV. n. 22. p. 103. tab. 3. fig. 18.

Paykull monogr. Car. n. 66. p. 107.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 11. fig. 13.

Harrer Besch. d. Schöff. Inf. I. Th. n. 206. p. 129.

Erythrocephalus angus. Voet Coleopt. II. n. 26. p. 78. tab. 36. fig. 26.

Bauzer Ent. germ. I. n. 35. p. 51.

Unter Steinen in waldichten Gegenden, an manchen Orten nicht selten. Seine Art, sich gegen seine Feinde, den *Carab. Sycophanta* und *Inquisitor* zu vertheidigen, ist merkwürdig. Wenn er verfolgt wird, und nicht mehr entweichen kan, legt er sich, wie todt, nieder. Sobald nun sein Verfolger den Hals aufsperrt und zuschnappen will, läßt er ihm aus dem After einen blauen unangenehmen Dunst mit einem platzenden Geräusch in den Hals fahren, welches er wohl zwanzigmahl wiederholt, und worüber solcher erschrikt und zurück fährt. Indessen gewinnt er Zeit sich aus dem Staube zu machen. Ein gleiches soll er thun, wenn man ihn mit einer Stecknadel unter den Flügeldecken kitzelt.

a Natürliche GröÙe. b Vergrößerung.



Carabus spinilabris Miki.



CARABVS spinilabris.

Der Laufkäfer mit der stachlichten Lippe.

Carabus spinilabris: alatus ferrugineus, thorace cordato, elytris crenato-friatis, antennis pedibusque testaceis.

Habitat in truncis arborum putridis, lectus d. 16. Mart.

Corpus totum ferrugineum nitidum glabrum. Antennae palpique testacea. Caput prominens laeve nitidum. Oculi protuberantes nigri. Maxilla setis hispida eodem que modo barbata ac in *C. spinibarbi*. Thorax cordatus pulvinatus dorso canaliculatus. Nucha notabilis. Elytra laevia nitida ferruginea crenato-friata. Pedes testacei. Abdomen ferrugineum. Pectus obscurum s. nigrum punctis plurimis impressum.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Carabus cinctus Fabr.

CARABVS cinctus.

Der Gürtel - Laufkäfer.

Carabus cinctus: alatus fuscus, capite thoraceque viridi aeneis, elytrorum margine pedibusque pallidis. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 61. p. 138.

Herbst Archiv. V. n. 26. p. 135. tab. 29. fig. 7.

Panzer Ent. germ. I. app. p. 366.

Das gegenwärtige Exemplar, nach welchem vorliegende Zeichnung gefertigt worden, ist aus dem Oesterreichischen, und ich finde es mit der Beschreibung des Hrn. Prof. *Fabricius* vollkommen gleichstimmig, ohngeachtet die ungewöhnliche Grösse mich beynahe irre gemacht hätte.

1871-1872

1871-1872



Carabus Dianae Fabr.

CARABVS Dianae.

Dianens Laufkäfer.

Carabus Dianae: alatus ater elytris striatis: lunula baseos pedibusque ferrugineis.

Fabric. Ent. syst. T. I. n. 64. p. 139.

Carabus sesquistriatus. *Panzer* im Naturf. XXIV. n. 48. p. 35. tab. I. fig. 49.

Um Halle auch um Nürnberg im Frühjahr unter Steinen: selten.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.



Carabus atricapillus Fabr.

CARABVS atricapillus.

Der schwarzhaarichte Laufkäfer.

Carabus atricapillus: alatus thorace rufo, elytris obtusis testaceis, capite atro. *Fabric.* Ent. Syst. T. I. n. 69. p. 140. Syst. Ent. n. 67. p. 248. Spec. Inf. T. I. n. 82. p. 313. Mant. Inf. T. I. n. 117. p. 205.

Carabus atricapillus: flavus, capite nigro, elytris obtusissimis. *Linn.* Syst. Nat. n. 42. p. 673. ed. XIII. n. 42. p. 1980

Carabus atricapillus. *Herbst* Archiv. V. n. 37. p. 137. tab. 29. fig. 10. f.

Paykull mon. Car. n. 64. p. 102. var. *C. agil.*

Panzer Ent. germ. I. n. 41. p. 52.

Häufig im Frühjahre in frischer Gartenerde, auch unter Steinen. Hr. *Herbst* *C. atricap.* gehört allerdings hieher, und seine Beobachtung an dem in die Quere gestreiften Bruststücke bestätigt sich auch. Die Flügeldecken ändern in Hinsicht ihrer Farbe sehr ab. Ob Hr. v. *Paykull*s Coniectur richtig, kan ich nicht entscheiden.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.

Dreyzigstes Heft.



Carabus punctulatus Fabr.



C A R A B V S punctulatus.

Der punctirte Laufkäfer.

Carabus punctulatus: alatus depressus ater, elytris punctato substriatis basi retusis.

Fabric. Ent. syst. T. I. n. 114. p. 150.

Carabus depressus. *Paykull* mon. Car. n. 19. p. 34.

Panzer Ent. germ I. n. 53. p. 54.

Auch in hiesigen Gegenden unter Steinen. Hr. v. *Paykulls* *Carab. depressus* ist ungeflügelt, ob er demnach wirklich hierher gehöre, ist noch die Frage.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.



Carabus helopioides Fabr.



CARABVS helopioides.

Der Schattenkäferartige Laufkäfer.

Carabus helopioides: alatus ater, elytrorum striis laevibus, antennis pedibusque nigris. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 132. p. 155.

Panzer Ent. germ. I. n. 66. p. 57.

Eine sehr schätzbare Entdeckung des Hrn. Prof. *Hellwigs* in Braunschweig.

Er findet sich auch in hiesigen Gegenden, unter Moos und Steinen in waldichten Gegenden.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.



Carabus aterrimus Fabr.

CARABVS aterrimus.

Der ganz schwarze Laufkäfer mit drey Hoblpuncten auf den Flügeldecken.

Carabus aterrimus: alatus thorace marginato, ater elytris striatis: punctis tribus impressis. *Fabric. Ent. syst. T. I. n. 141. p. 156.*

Herbst Archiv V. n. 50. p. 140. tab. 29. fig. 13.

Paykull mon. Car. n. 78. p. 127.

Panzer Ent. germ. I. n. 72. p. 58.

Unter abgefallnem Laub, und unter Steinen.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.



Carabus sexpunctatus Fabr.

CARABVS sexpunctatus.

*Der sechspunktirte Laufkäfer. Carabe à six points. Le Bupreste
à etuis cuivreux. Geoffr.*

Carabus sexpunctatus: alatus capite thoraceque viridibus, elytris cupreis. *Fabric.*
Ent. Syst. T. I. n. 145. p. 157. Syst. Ent. n. 50. p. 245. Spec. Inf. T. I.
n. 60. p. 309. Mant. Inf. T. I. n. 83. p. 202.

Carabus sexpunctatus. Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 672. ed. XIII. n. 35. p. 1977.
Faun. Suec. n. 807.

Buprestis nitens, capite thoraceque viridibus, elytris cupreis punctatis. *Geoffr.*
Inf. I. n. 14. p. 149.

Paykull mon. Car. n. 42. p. 70.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 66. fig. 7.

Harrers Besch. d. Schöff. Inf. 1. Th. n. 214. p. 133.

Buprestis nitens minor. Voet. Coleopt. II. n. 4. p. 69. tab. 33. fig. 4.

Panzer Ent. germ. I. n. 76. p. 59.

Häufig an feuchten Orten, unter Steinen.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrößerung.



Carabus marginalis Fabr:

Jac. V. r. s. f. c.



CARABVS marginalis.

Der grün - gold gerändete Laufkäfer.

Carabus marginalis: apterus laevis ater thoracis elytrorumque margine viridi - aureo. *Fabric. Ent. syst. T. VI. app. p. 440.*

Panzer Ent. germ. I. app. p. 365.

Habitat rarus Osterode sub arborum radicibus vetustis, et sub lapidibus: tempore auctumnali.



Carabus festivus Mihi.

CARABVS festivus.

Der festliche Laufkäfer.

Carabus festivus: alatus ater thorace aeneo¹, elytris viridibus, his margine antennis pedibusque flavis.

Habitat in Austria.

Caput prominens viridi aeneum nitidum, ore, palpis antennisque flavis. Thorax cupreus-nitidus, linea dorsali, punctoque baseos utrinque impressus. Elytra viridia opaca striata margine incrassata flava. Pedes flavi. Corpus subtus atrum nitidum. A *C. vestito* Fabr. f. *C. marginato* Linn. S. N. diversissimus.



Carabus pumicatus Mihi.

J. St. fer

CARABVS pumicatus.

Der geglättete Laufkäfer.

Carabus pumicatus: alatus ater nitidissimus, thorace convexo postice foveola utrinque impressus, elytris crenato-striatis, antennis pedibusque piceis. *Panzer*
Ent. germ. I. n. 82. p. 60.

Habitat Mannhemii. *Dn. I. Baader.*

Caput exsertum angustatum, atrum nitidum: ore palpis antennisque piceis. Thorax ater levissimus, convexus, canaliculatus, lineolisque duabus baseos impressus. Elytra atra nitida striata, et inter strias levissime crenata. Pedes picei. Corpus sub-
tus piceum.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Carabus vernalis Miki.

12. f.

CARABVS vernalis.

Der Frühlings - Laufkäfer.

Carabus vernalis: alatus ater nitens thorace subcanaliculato, elytris striatis striis laevibus, antennis pedibusque piceis. *Panzer* Ent. germ. I. n. 83. p. 60.

Habitat sub lapidibus et sub foliis putridis tempore verno. Caput leve atrum, nitidum; ore, palpis antennisque piceis. Thorax nitidus linea dorsali, punctisque duobus baseos impressus. Elytra nitida atra striata, punctis dorsalibus tribus. Femora atra. Tibiae piceae. Tarsi fusci. Corpus subtus atrum nitidum.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

Volume 100, Part 1, 1970
The Journal of the Royal Anthropological Institute is a quarterly journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. It is devoted to the publication of original research papers and reviews in all branches of anthropology, including physical anthropology, linguistics, and social anthropology. The journal is published by the Royal Anthropological Institute, 21, Bedford Square, London, W.C.1.

1970



Carabus inaequalis Mili.

CARABVS inaequalis

Der ungleiche Laufkäfer.

Carabus inaequalis: alatus thorace atro nitente piceus, elytris depressis obscure caerulescentibus substriatis, striis laevissimis. *Panzer* Ent. germ. I. n. 84. p. 60.

Habitat in sylvaticis sub foliis putridis.

Caput exsertum nitidum rigum, antice lineolis duabus impressum; ore palpisque piceis. Antennae piceae: Thorax ater cordatus canaliculatus transversim striatus basi lineolis duabus impressis. Elytra depressa caeruleo micantia substriata, striis laevissimis. Pedes picei. Corpus subtus piceum.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Carabus melanocephalus Fabr.



CARABVS melanocephalus.

*Der schwarzköpfigte Laufkäfer. Carabè tete noir. Le Bupreste
noir à corcelet rouge. Geoffr.*

Carabus melanocephalus: alatus niger, thorace pedibusque ferrugineis. *Fabric.*
Ent. syst. T. I. n. 153. p. 159. Syst. Ent. n. 52. p. 245. Spec. Inf. T. I.
n. 64. p. 310. Mant. Inf. T. I. n. 89. p. 202.

Carabus melanocephalus. *Linn.* Syst. Nat. n. 22. p. 671. ed. XIII. n. 22. p. 1973.
Fn. Suec. n. 795.

Buprestis niger, thorace, antennis pedibusque ferrugineis. *Geoffr.* Inf. T. I. n. 42.
p. 162.

Paykull. monogr. Car. n. 20. p. 35.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 237. fig. 5.

Harrer Besch. d. Schäff. Inf. 1. Th. n. 215. p. 341.

Buprestis dorso rubro. Voet Coleopt. II. n. 15. tab. 35. fig. 15.

Panzer Ent. germ. I. n. 86. p. 61.

Habitat in sylvaticis udis et sub foliis putridis, quandoquidem et aedes intrat.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Carabus lutescens Mihi.

B
P



CARABVS lutescens.

Der gelblichte Laufkäfer.

Carabus lutescens: alatus ater, elytris pedibusque testaceis. *Panzer* Ent. germ. I.
n. 103. p. 63.

Carabus pelidnus. *Herbst*. Archiv. V. 2. n. 48. p. 139.

Habitat sub lapidibus Berolin. et Brunsvigiae.

Caput atrum nitidum, palpis antennisque obscuris. Thorax subcordatus nitidus, linea dorsali impressus. Elytra testacea striata, striis impunctatis. Pedes testacei. Corpus subtus nigrum nitidum.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

2000/0000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000



Carabus articulatus Mili.

CARABVS articulatus.

Der gegliederte Laufkäfer.

Carabus articulatus: alatus ater, elytris subaeneis striatis, postice fascia maculaque flavis. *Panzer* Ent. germ. I. n. 104. p. 64.

Habitat sub foliis putridis et sub lapidibus primo vere.

Caput atro aeneum minime nitidum. Oculi globosi prominuli. Palpi et antennae fuscae. Thorax cordatus canaliculatus aeneo-ater, basi utrinque impressus. Elytra subaenea obscura postice fascia maculaque flavas, striata, striis laevissimis, punctisque dorsalibus tribus impressa. Pedes picei. Corpus subtus atrum nitidum.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

Die Naturgeschichte

der Thierwelt

Erster Theil. Von den Thieren, welche in der Luft leben.
Zweiter Theil. Von den Thieren, welche auf dem Lande leben.
Dritter Theil. Von den Thieren, welche im Wasser leben.
Vierter Theil. Von den Thieren, welche in der Erde leben.
Fünfter Theil. Von den Thieren, welche in der Luft, auf dem Lande, im Wasser und in der Erde leben.
Sechster Theil. Von den Thieren, welche in der Luft, auf dem Lande, im Wasser und in der Erde leben.
Siebenter Theil. Von den Thieren, welche in der Luft, auf dem Lande, im Wasser und in der Erde leben.
Achter Theil. Von den Thieren, welche in der Luft, auf dem Lande, im Wasser und in der Erde leben.
Neunter Theil. Von den Thieren, welche in der Luft, auf dem Lande, im Wasser und in der Erde leben.
Zehnter Theil. Von den Thieren, welche in der Luft, auf dem Lande, im Wasser und in der Erde leben.



Carabus confluent Mihi.

CARABVS confluens.

Der zusammenfließende Laufkäfer.

Carabus confluens: alatus ater, elytris striatis, striis laevibus, his una alterave postice coëunte. *Panzer* Ent. germ. I. n. 107. p. 64.

Habitat in arvis et sub lapidibus.

Statura et habitus *C. punctulati* aë duplo fero minor. Caput atrum nitidum, antennis palpisque nigris. Thorax canaliculatus ater nitidus, lineolisque duabus bascos impressus. Elytra nigra, nitida, striata, striis impunctatis, una alterave dorso coenutibus, punctisque dorsalibus tribus. Pedes nigri, tarsi piceis. Corpus subtus atrum nitidum.

a. Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.



Papilio E. A. Machaon Fabr.



PAPILIO EQVES ACHIVVS Machaon.

Der Schwalbenschwanz. Der Fenchelfalter. Der Königinnenpage. Le Grand Porte-queue. Papillion page de la reine. Le Grand Papillion à queue, du fenouil. Geoffr.

Pap. Equ. Achiv. Machaon: alis caudatis concoloribus flavis: limbo fusco, lunulis flavis, angulo ani fulvo. *Fabric. Ent. syst. T. III. P. I. n. 87. p. 30. Syst. Ent. n. 42. p. 452. Spec. Inf. T. II. n. 67. p. 17. Mant. Inf. T. II. n. 77. p. 9.*

Pap. Eques Achiv. Machaon. Linn. Syst. Nat. n. 33. p. 750. ed. XIII. n. 33. p. 2238. Fn. Suec. n. 1031.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 1. p. 161.

Geoffr. Inf. T. II. n. 23. p. 54.

Scopol. carn. n. 444. ic. 444.

Rösel. Inf. B. 1 Th. tab. 1.

Esper eur. Schm. 1 Th. tab. 1. fig. 1.

Bergsträsser Schm. tab. 17. fig. 3. 4.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 45. fig. 1. 2.

Borekhausen eur. Schm. 1 Th. n. 1. p. 111. et n. 1. p. 246.

Die Raupe ist grün mit schwarzen Ringen auf jedem Gelenke, in welchen zimmtfarbige Flecken stehen. Sie hat auf dem Kopfe zwey Hörner, welche sie nach Willkühr ein und ausstrecken kan. Man findet sie im Sommer und Herbst einsam auf verschiedenen Schirmtragenden Pflanzen, auf dem Fenchel, Dill, Kümmel, auf der Petersilie, Pimpinelle und Möhre. Die Puppe ist mit einem Faden über den Rücken und mit festgesponnenem After befestigt, von Farbe grünlicht. Bey gutem Wetter kommt der Falter nach drey Wochen aus seiner Hülle.



Papilio E. A. Podalirius Fabr.



PAPILIO EQVES ACHIVVS Podalirius.

Der Seegelfalter. Der Mandalfalter. Die Regina. Le Flambeau. Geoffr.

Pap. Equ. Ach. Podalirius: alis caudatis subconcoloribus flavescentibus: fasciis fuscis geminatis; posticis subtus linea sanguinea. *Fabric. Ent. syst. T. III. P. I. n. 71. p. 24. Syst. Ent. n. 38. p. 451. Spec. Inf. T. II. n. 58. p. 15. Mant. Inf. T. II. n. 64. p. 8.*

Pap. Equ. Ach. Podalirius. Linn. Syst. Nat. n. 36. p. 751. ed. XIII. n. 36. p. 2241. Mus. Lud. Vlr. p. 208.

Syst. Verz. d. W. Schm. p. 162. n. 3.

Geoffr. Inf. T. II. n. 24. p. 56.

Scopol. carn. n. 445. ic. 445.

Rösel Inf. Bel. 1 Th. tab. 2. fig. 1-4.

Esper eur. Schm. 1 Th. tab. 1. fig. 2.

Bergstr. Schm. tab. 18. fig. 3. 4.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 45. fig. 3. 4.

Borkhausen eur. Schm. 1 Th. n. 2. p. 112. et n. 2. p. 247.

Die Raupe gleicht einigermaßen den Schildraupen, kann auch eben so wie dieselben den Kopf und die Füße einziehen. Ihre Farbe ist gelblich grün, und ihre Haut fühlt sich so weich wie Sammt an. Auf derselben sind überall rothe Pünktchen zerstreut. Ueber den Rücken und in den Seiten zieht sich eine weißgelbe Linie. Von den Seitenlinien nach der Rückenlinie laufen weißgelbe schräge liegende Linien. Sie ist äußerst träge, kriecht sehr langsam und überspinnt allemal die Stelle welche sie betreten will. Wenn sie sich zur Verwandlung anschicken will, spinnt sie sich einen Faden über den Rücken, befestiget sich mit dem After, und verwandelt sich nach einiger Zeit in die Chrysalide. Sie nährt sich von dem Laube der Mandeln, Schlehen, Zwetschen, auch zuweilen von dem der Eiche. *Borkb.*

