

## Die Zucht von *Parasa mustacha* Holloway 1990 (Lep., Limacodidae)

FRANZ VETTER & GEORG BRENNER

Abstract: Details are given from a successful breeding of the small Limacodid moth *Parasa mustacha* from Thailand. This species was described from Sumatra as new to science by Holloway in 1990. Remarkably its caterpillars feed close together.

### Vorkommen

Fundort ist der Khao Yai - Nationalpark in Thailand. In ca. 1000 m Höhe wurden die Räupchen im 1. Kleid des Falters am 29.04.1998 eingesammelt. Originale Raupenfutter sind die Blätter eines Baumes, der leider nicht bestimmt werden konnte. Für den Kenner mag vielleicht der Hinweis aufschlußreich sein, daß an demselben Baum auch einige Raupen von *Actias maenas* gefunden wurden. In Thailand nahmen die Räupchen Papaia als Ersatzfutter an (in Chiang Mai und Krabi).

### Zuchtverlauf

Am 29.04.1998 zwei Raupenspiegel im 1. Kleid.

Am 01.05.1998 1. Häutung

Am 07.05.1998 2. Häutung

Am 12.05.1998 3. Häutung

Am 18.05.1998 4. Häutung

Am 24.05.1998 Verpuppung wohl am liebsten am Stamm der Futterpflanze, aber auch möglich in Papier bzw. am Deckel des Zuchtbehälters.

Der Kokon ist fest und eiförmig, ca. 1 cm im Durchmesser. Beim Schlupf nagt der Falter ein kreisförmiges Loch hinein.

Abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit schlüpfen die Falter nach ca. 3-4 Wochen. Die Männchen erreichen eine Spannweite bis 2,6 cm, die Weibchen knapp über 3 cm. Auffälligstes Merkmal sind leuchtend grasgrüne Flecken auf den Flügeln, deren Begrenzungslinien denen unserer einheimischen verwandten Art *Apoda limacodes* nahekomen.

Die Männchen fliegen am Tag und suchen aktiv nach den Weibchen. Die Paarung ist nur kurz. Sie konnte nicht beobachtet werden. Die Eiablage erfolgt problemlos an den Seiten und am Deckel des Zuchtkäfigs. Die Eier bieten den Anblick einer gelben glatten Fläche. Nach 3-4 Wochen schlüpfen die Räumchen. Ersatzfutter in Deutschland ist Felsenbirne, Weide, Apfel, Liguster usw.

## Literatur

Holloway, J.D. (1990): The Limacodidae of Sumatra. Heterocera  
Sumatrana 6: 9-62



## Verfasser:

Franz Vetter  
Hardenbergstr. 22  
90491 Nürnberg

Georg Brenner  
Schnaittacher Str. 8  
90542 Eckental

Fotos der umseitigen Farbtafel:

Franz Joseph Amon, Hardenbergstr. 31, 90491 Nürnberg



1: Jungraupe von *Parasa mustacha* 2: Gesellige Raupen 3: zwei Kokons  
4: Männchen links, Weibchen rechts. Vergrößerung für 1, 2, und 4 etwa 2-fach

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Vetter Franz, Brenner Georg

Artikel/Article: [Die Zucht von \*Parasa mustacha\* Holloway 1990 \(Lep., Limacodidae\) 2-4](#)