

Notizblatt für kryptogamische Studien,
nebst Repertorium für kryptog. Literatur.

Inhalt: B. Auerswald, *Cornicularia* (?) *umhausensis* Awd. nov. sp.
Repertorium: K. Kalchbrenner, a Szepesi Gombak Jegyzéke.
— *Sopra de Felci Denominate Struthiopteris e delle Loro piu' strette affini Memoria del Conte Vittore Trevisan.* — Louis Piré, Prof. de Botanique, *Recherches bryologiques.* — Extrait du Bulletin de la Soc. bot. de France. Tome XIV. — Aug. Le Jolis, *Mousses des Environs du Cherbourg.* — M. A. Millardet des genres *Atichia*, *Myriangium* et *Naetrocymbe.* — Casimir Roumeguère, *Cryptogamie illustrée ou histoire des familles naturelles des plantes acotylédones d'Europe.* — L. Rabenhorst, *Bryotheca europaea.* — Deichmann Branth, *Verzeichniss der Flechten der dänischen Halbinsel Jütland.* — Kleinere Mittheilungen. — Bücher-Anzeigen.

Cornicularia (?) *umhausensis* Awd. nov. sp.

Thallus cartilagineus, fruticulosus — ramosissimus, cepitosus, erectus, compresso — teretiusculus, plus minus ad ramificationes dilatatus (fere damaecornis), isabellinus, praecipue apices versus ramulis brevissimis verruciformibus simplicibus vel romulosis fasciculatis (madidis viridi — fuscis) vestitus, solidus, intus filamentoso — medullatus; apothecia ignota.

Diese seltsame und höchst zierliche Flechte brachte mir vor Jahren Herr Dr. Delitsch in Leipzig in wenigen sterilen Exemplaren aus Tirol mit, von denen einige durch meinen botanischen Tauschverein als *Cetraria odontella* (Ach.) Fr. vertauscht wurden. Später erkannte ich, dass sie nicht diese *Cetraria* sein konnte, da Fries deren Thallus *spadiceus* nennt und in der beigefügten kurzen descriptio auch noch ausserdem hinzufügt „totus concolor“, während die vorliegende Art entschieden zweifarbig ist, d. h. der Thallus isabellfarbig, die warzenförmigen Aestchen braun. Ausserdem soll die mir unbekanntere *C. odontella* oft mit zarten Formen der *C. islandica* verwechselt werden, was bei *Cornicularia umhausensis* gar nicht denkbar ist, da sie eher den Habitus eines *Stereocaulon* (*denudatum*) besitzt.

Freiherr von Hohenbühel (Heufler) schreibt mir über sie, dass auch er sie bereits im September 1839 an gleichem Orte gefunden, aber für *Sphaerophoron compressum* gehalten, auch unter diesem irrigen Namen in den „Geognostisch-botanischen Bemerkungen etc., Innsbruck 1840“, S. 107, aufgeführt habe.



Da ich dieses Jahr längere Zeit meiner Gesundheit halber in Tirol verbrachte, so unterliess ich nicht, sie an dem ersten Fundorte (am Stuibenfalle bei Umhausen im Oetzthale) aufzusuchen. Hier lebt sie in handgrossen Rasen unterhalb des Wasserfalles in den Felsblöcken der Berglehne, oft gesellig mit *Sticta silvatica* und *Nephroma laevigatum* und *tomentosum*. Leider war es mir, trotz eifrigsten Suchens, nicht vergönnt, Früchte aufzufinden, sodass der Gattungscharakter nicht festgestellt werden konnte. Ich bin so glücklich, sie in Rabenhorst's *Lichenes europaei*, wenn auch nur in kleinen Räschen, ausgeben zu können, sodass die Herren Lichenologen Gelegenheit haben, selbst zu beurtheilen, ob sie bei *Cornicularia* verbleiben kann, oder vielleicht eine eigene Gattung bilde. So lange die Früchte noch unbekannt sind, dürfte letzteres als unräthlich erscheinen.

B. Auerswald.

Repertorium.

K. Kalchbrenner, a Spepesi Gombak Jegyzéke. Mit 6 colorirten Tafeln. II. Pest, 1868. (Aus den Verhandlungen der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Pest besonders abgedruckt.)

Es ist dies ein Verzeichniss von 1334 Pilzen, von denen 1 bis 962 bereits früher mitgetheilt worden sind. Leider sind alle beigegebenen Notizen, ausser der Diagnosen der neuen Arten, in ungarischer, uns nicht zugänglicher Sprache.

Agaricus Collyb. caesiellus n. spec. Stipes curtus, cartilagineus, fistulosus, sursum attenuatus, fuscolilacinus, ad basim floccoso-farinaceus. Pileus e convexo planus, obtusus, margine inflexus 4—5'' latus, siccus, impolitus, caesius, vel cyaneo-griseus. Lamellae rotundato-adnatae latae, subdistantes, lilacino-griseae, nunquam pulverulentae et decolorantes ut in *Ag. laccato*.

Ag. Mycena elegans Pers. b hyperboreus. Stipes curtus, fistulosus, lividus, basi fibrillis flavis vestitus. Pileus vix uncialis, olivaceo-umbrinus. Lamellae fumosae, vel omnino nigricantes, acie laete cinnabarinae.

Ag. Nolan. piceus nov. sp. Stipes cartilagineus, fistulosus, aequalis, nudus glaber 1—1½'' longus, lineam crassus, purpurascens-fuscus. Pileus membranaceus, e campanulato explanatus, centro papillatus, 4—5'' latus, glaber, pellucide striatus, fuliginosus, haud expallens. Lamellae adnatae, secedentes, distantes, venoso-connexae, atropurpureae.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [8_1869](#)

Autor(en)/Author(s): Auerswald Bernhard

Artikel/Article: [Cornicularia \(?\) umhausensis Awd. nov. sp. 113-114](#)