

- BÜCKING, H. (1930–1932): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Erster Nachtrag zur 2. Auflage des Hauptverzeichnisses von Lucas von HEYDEN. – Entomol. Bl. **26** (1930), 145–163; **27** (1931), 39–42, 83–89, 122–128, 174–183, Krefeld.
- ELBERT, A. (1969): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Untermaingebiet zwischen Hanau und Würzburg (1. Nachtrag zur Gebietsfauna von Dr. Karl SINGER, 1955). – Mitt. naturwiss. Mus. Aschaffenburg, N. F. **12**, 59 S., Aschaffenburg.
- FREUDE, H., K. W. HARDE & G. A. LOHSE (1963–1981): Die Käfer Mitteleuropas, Bde. 1–10. – Krefeld (Goecke & Evers).
- HEYDEN, L. von (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – 2. Aufl., Frankfurt a. M.
- HORION, A. (1941–1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bde. 1–12, an verschiedenen Orten.
- (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Angaben. – Stuttgart (Kernen Verlag).
- LUCHT, W. (1982): *Rhopalocerus rondanii* (VILLA) nach 130 Jahren in Deutschland wiederentdeckt (Colydiidae). – Entomol. Bl. **78**, 32–33, Krefeld.
- SINGER, K. (1955): Die Käfer (Coleoptera). Beiträge zur Fauna des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts. – Mitt. naturwiss. Mus. Aschaffenburg, N. F. **7**, 272 S., Aschaffenburg.
- ZUR STRASSEN, R. & M. TÜRKAY (1976): Faunistik der hessischen Koleopteren. 3. Beitrag. – Neueinteilung und Erweiterung des Gebietes. – Mitt. internat. Entomol. Ver. **3**, 41–46, Frankfurt a. M.


## Ein Wiederfund der Zwergspinne *Baryphyma pratense* (BLACKWALL) (Araneida, Erigonidae) in Hessen

H.-G. MÜLLER und G. LÜPKES, Gießen

Von *Baryphyma pratense*, einer in Dänemark, England, Frankreich und der Tschechoslowakei nachgewiesenen Art, lagen aus Deutschland bislang lediglich zwei Funde vor. ZIMMERMANN fand im Juni 1906 ein ♀ auf Weidengebüsch am Ufer der Lahn bei Marburg (Hessen). STRAND (1908) gibt in seiner Arbeit eine detaillierte Beschreibung dieses ♀. WUNDERLICH (1971) erwähnt einen Fund mehrerer ♂♂ und ♀♀ von der Pfaueninsel in Berlin.

Es gelang uns im Juli 1982, etwa 30 km südlich des Fundortes von ZIMMERMANN, zwei ♀♀ dieser Art, ebenfalls am Lahnufer, aus *Phragmites communis* zu streifen. Die Fundstelle liegt zwischen Gießen und Wetzlar am Ortsrand von Dutenhofen in unmittelbarer Nähe der Baggerseen.

LOCKET & MILLIDGE (1953) geben als bevorzugten Biotop in England an (übersetzt): „Zwischen Gräsern und Kräutern auf feuchten Wiesen, gewöhnlich nahe bei Bächen und Flüssen.“ WIEHLE (1960) gibt eine briefliche Mitteilung von MILLER wieder: „Ziemlich häufig unter Schilf, Rohrkolben und anderen Wasserpflanzen auf schlammigen Böden.“ Somit scheint für das Vorkommen der Art eine starke Feuchtigkeit notwendig zu sein.



Bisherige Funde von  
*Baryphyma pratense* (BLACKWALL)  
 in Hessen. Halboffener Kreis: Fund  
 zwischen 1900 und 1960; gefüllter  
 Kreis: Fund nach 1960.

## Literatur

- LOCKET, G. H., & A. F. MILLIDGE (1953): British spiders II. – Ray Society, London.
- STRAND, E. (1908): Verzeichnis der bis jetzt bei Marburg von Prof. Dr. H. ZIMMERMANN aufgefundenen Spinnenarten. – Zool. Anz. **32**, 216–243, Jena.
- WIEHLE, H. (1960): Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae) XI: Micryphantidae – Zwergspinnen. In: DAHL, F. (Hrsg.): Die Tierwelt Deutschlands **47**, 620 S., Jena.
- WUNDERLICH, J. (1971): Bemerkenswerte Spinnenarten (Araneae) aus Berlin. – Sitzungsber. Ges. naturforsch. Freunde Berlin N.F. **11**, 140–147, Berlin.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Hans-Georg, Lüpkes Günther

Artikel/Article: [Ein Wiederfund der Zwergspinne \*Baryphyma pratense\* \(BLACKWALL\) \(Araneida, Erigonidae\) in Hessen 71-72](#)