

*schmidiella* Frey (3558). N. Ö., U., oriental.

*druryella* Z. (3559). G., N. Ö., O. Ö., T., St., U., Sieb., D.

### *Batrachedra* Stt.

*praeangusta* Hw. (3560). In all. Länd. außer Küst., Kro., Bos., D.

*pinicolella* Dup. (3561). B., Sch., M., Buk., N. Ö., O. Ö., S., T., St., K., Kr., Sieb.

*ledereriella* Z. (3562). ?U., D., wohl medit.

(Fortsetzung folgt.)

---

## Berichtigung

zu dem Artikel über *Catonephele orbifera* in Nr. 3 dieses Jahrg.

Das dort als *orbifera* beschriebene ♂ hat sich als *Boyi* Röber erwiesen, beschrieben in der Stett. Entom. Zeitg., Bd. 84, p. 94, 1923. — Betreffs des an gleicher Stelle als zugehöriges ♀ von mir beschriebenen und vermuteten Stückes bleiben immer noch einige Zweifel, obgleich weiteres Material verglichen werden konnte. Es besteht jedenfalls eine sehr große Aehnlichkeit mit dem ♀ von *antinoë* Godt., das sich nur in der Art der äußeren Begrenzung der postdiskalen Augenbinde der H.-Flügel in den Feldern 2—4 unterscheidet; die in diesen Feldern auswärts von den Augen stehenden gelben Flecken sind ausgebuchtet, bei *antinoë*-♀ nach außen gewölbt. Zur Klärung wäre eine Genitaluntersuchung notwendig, zu der mir leider eigenes Material fehlt, vorausgesetzt daß auch das *antinoë*-♀ mit dem richtigen ♂ verbunden wäre; am sichersten aber könnte erst die Zucht beider Arten Klarheit bringen.

Dr. Fiedler, Suhl.

---

## Erwiderung.

Im Sitzungsbericht des Berliner Entomologen-Vereins vom 21. 1. 1932 in Nr. 24 dieser Zeitschrift berichtet Herr Rangnow jun. über eine Zucht von *Mel. maturna* und betont zum Schluß, daß eine zweimalige Ueberwinterung der Raupe nicht der Wahrheit entspräche und diese Angabe auf ungenügende Beobachtung zurückzuführen sei.

Im Gegensatz dazu möchten wir betonen, daß die Zuchten und Beobachtungen unseres verstorbenen Mitgliedes Selzer sehr gründlich und eingehend waren, was durch Nachlesen der betr. Stellen und Aufsätze sich leicht feststellen läßt, außerdem die Art auch in jüngster Zeit von einigen unserer Mitglieder wieder mit demselben Erfolg einer zweimaligen Ueberwinterung eines Teiles der Raupen gezogen wurde. Int. Ent. Zeitschr. 1911/12, S. 179, S. 215, 1913/14, S. 135, 1918/19, S. 191, 1919/20, S. 102. Im Jahrgange 1911/12, S. 215 sagt S., daß die zweimal überwin-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1933

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Fiedler Carl

Artikel/Article: [Berichtigung. 289](#)