© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Literaturberichte.

Von Dr. Victor G. M. Schultz, Lage (Lippe).

Frithiof Nordström, Om några misskända *Athetis (Caradrina)* — *arter.* — So. Ent. Tidskr. 1933. — 10 S., 1 Taf., 11 Abb.

Auf Grund seines Studiums der Literatur und der Morphologie der betr. Arten kommt der Verf. zu folgender Synonymie:

grisea Ev. 1848 = *Menetriesii* Kretschm. 1863 (Warr. 1914), *montana* Brem. 1864, *petraea* Tgstr. 1869.

cinerascens Tgstr. 1869 = *leucoptera* Spbg. (nec Thnbg.) 1880, *Menetriesii* Schilde 1874 (Lampa 1885, Aur. 1888/91, Reuter 1893, Spul. 1908, Culot 1914), *grisea* Warr. 1914, *Rougemonti* Pet. 1924.

selini B. 1840 = *grisea* Aur. 1888/91.

Von diesen Arten ist *grisea* für Schweden bislang noch nicht nachgewiesen. *Selini f. obscura* Nordstr. wird eine kleinere dunklere Form mit unauffälliger oder verschwindender Zeichnung aus Stockholms Umgebung genannt. Die von Thunberg 1791 beschriebene *leucoptera* ist = *clavipalpis* Scop. 1763. Nominatform *clavipalpis*: hell ockerbraun ohne dunkles Randfeld. *f. quadripunctata* F. (=*nigrofasciata* Hoffm.): dieselbe Form mit dunklem Randfeld. *f. Thunbergi* Nordstr. (= *leucoptera* Stgr. [nec Thnbg.]): dunkler, graubraun, oft mit undeutlicher Zeichnung, mit oder ohne dunkles Randfeld. Auf der Tafel werden alle genannten Arten im Bild vorgeführt, auch werden Abbildungen der Genitalarmaturen gebracht. Die von Meves für Schweden genannte *albina* Ev. ist zu streichen.

Die Groß- und Kleinschmetterlinge des Vogtlandes, bearbeitet von Karl Schweitzer, Plauen. — So. Mitt. Vogtl. Ges. f. Nat. Nr. 7. Plauen, 1931. — 84 S.

Diese faunistische Arbeit ist, was die Großschmetterlinge anlangt, eine Neubearbeitung der in der „Iris", Bd. XXVII, 1913, S. 47 ff. veröffentlichten Zusammenstellung desselben Verfassers. Diese erschien „veraltet und nicht mehr zeitgemäß", weil im Seitz eine Neuordnung des Systems vorgenommen worden war. Außerdem wurde in der Zeit von 1913 bis 1929 eine ganze Anzahl neuer Arten Großschmetterlinge von dem Verf. und befreundeten Sammlern im Vogtland aufgefunden. Leider sind diese Neufunde nicht näher hervorgehoben und erst durch Vergleich mit der 1913 erschienenen Arbeit festzustellen. Das Hauptziel des Verf. war Anschluß der Kleinschmetterlinge; diese wurden von einem anderen Plauener Entomologen „meist des Abends und Nachts am Licht der Straßenlaternen in der Umgebung von Plauen gefangen" Daß mit dieser Sammelmethode die Kleinschmetterlinge auch nicht annähernd zu erfassen sind, liegt auf der Hand. Es werden insgesamt 788 Groß- und 437 Kleinschmetterlinge aufgeführt. Bei jeder Art finden sich kurze Angaben über Erscheinungszeit, Anzahl der Generationen und Häufigkeit, bei selteneren Arten ist der Fundort beigefügt; die hier besonders wichtigen Jahreszahlen fehlen jedoch. Die Angaben über die Futterpflanzen der Raupen sind vielfach den Handbüchern entnommen (ein Verfahren, das endlich aufgegeben werden sollte!) Nur eigene Beobachtungen sind wissenschaftlich von Wert. Als bemerkenswerte Tiere der vogtländischen Großschmetterlingsfauna seien hervorgehoben: *Parn. apollo* L. *posthumus* Fruhst., *Colias palaeno* L., *Anarta cordigera* Thnbg., *Agr. speciosa* Hb., *Hadena rubrirena v. hercyniae* Stgr., *Anaitis pal. v. imbutata* Hb. und *Lar incursata* Hb. — Möge die vorliegende Veröffentlichung den Schmetterlingssammlern im Vogtland Anregung geben, dem Beispiel des leider kürzlich verstorbenen Verfassers zu folgen und die Durchforschung der vogtländischen Lepidopteren-Fauna mit Liebe und Ausdauer fortzusetzen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1934

Band/Volume: 28

Autor(en)/Author(s): Schultz Victor G. M.

Artikel/Article: Literaturberichte 176