

# 1. Beilage zu No. 1. 6. Jahrgang.

- Amphipyra pyramidea* L. Landl 17 bis 25. VIII. a. Köder häufig (Z.)
- Taeniocampa gothica* L. Frauenberg im Mai ♂♀ (K.)
- Mesogona ovalina* Hb. Hiefiau Mitte IX a. L. (Galv.)
- \* *Hiptelia ochreago* Hb. Reichenstein b. Eisenerz ob. d. Baumgrenze 1 ♀ an Blumen 24. VII. (G.) Präbichl ♂♀ VIII. (K.)
- Calymnia pyralina* View. Landl 21. VII. 2 Stück a. Köder (Z.)
- \* *Platensis subfusa* F. Schladming (Kess.)
- \* *Orthosia nitida* F. Landl 20., 24. VIII. 2 Stück a. Köder (Z.)
- Spitzenbachgr. Ende V. Raupen an Erdbeeren u. Cyklamen (G.)
- *litura* L. Admont 1 ♂ ins Zimmer gefl. 8. V. (Str.)
- Orrhodia vaccini* L. Admont 26. III. 1 ♀ a. L. (K.)
- \* — ab. *glabroides* Fuchs. Ennspromenade a. Köder IX. ♂♀ selten (K.)
- ab. *mixta* Stgr. (siehe Verzeichnis statt „häufig“ soll es heißen „nicht häufig“)
- \* — *ligula* ab. *conspadicea* Fuchs. Ennspromenade 1 ♂ a. Köder (K.)
- Scopelosoma satellitia* L. Admont 1 ♂ a. L. IX. (K.)
- \* — ab. *brunnea* Lampa. Admont und Umgeb. VIII., IX. ♂♀, auch am Lichte (K.)
- \* — ab. *trabanta* Huene. Umgeb. v. Adm. und exl. 2 ♂ im VIII. (K.)
- \* *Xylina socia* Rott. Admont a. d. Stiftsmauer 1 ♂ 26. IX. (K.)
- \* — *ingrica* H. S. Spitzenbachgr. Ende V. 1 überwintertes Stück (G.)
- Aigen b. Adm. 23. IX. 2 ♀♀ (K.)
- Calocampa vetusta* Hb. Admont, im Stiftsgarten 1 ♂ 26. V. (K.)
- \* *Lithocampa ramosa* Esp. Mariazell VII., VIII. Raupen, selten (U.)
- Cnucullia verbasci* L. Mariazell VII., VIII. nicht selten, Raupen (U.)
- \* — *lychnilis* Rbr. Mariazell VII., VIII. Raupen, selten (U.)
- \* — *campanulae* Fr. Raupen Ende VII. an *Campanula rotundifolia* im Gsellgraben b. Eisenerz (G.)
- *lucifuga* Hb. Landl 3. VIII. 1 St., St. Gallen 18. VIII. 2 St. (Z.)
- Spitzenbachgr. Ende V. 1 frisches Stück (G.)
- Aigen, Rötelstein Anfang VI. 2 ♀♀ (K.)
- \* *Anarta cordigera* Thnbg. Im VI. im Gesäuse, selten; mittags wild am Wege schwärmend (G.)
- \* — *Anarta melanopa* v. *rupestralis* Hb. Hohenstein- gipfel (2500 m) 1 Stück am 1. VIII. (Preiß.)
- Pyrrhia umbra* Hufn. Landl 29. VII. 1 St. (Z.)
- \* *Erastria deceptor* Sc. Landl 10. VII. 1 St. (Z.)

- Rivula sericealis* Sc. Hiefiau, Landl 26. VIII. einzeln (Z.)
- Prothymnia viridaria* Cl. Gams, Landl VII., VIII. nicht selt. (Z.)
- Gstatterboden 1 ♀ 23. VII. (K.)
- Scoliopteryx libatrix* L. Landl 11. VII., 5. IX. a. Köder einzeln (Z.)
- \* *Abrostola asclepiadis* Schiff. bei Hiefiau und sonst im Gebirge im Juni (G.)
- *tripartita* Hufn. Radmer a. d. Stube 12. VIII. 1 St. (Z.)
- Plusia variabilis* Pill. Mariazell VII., VIII. nicht selt. (U.)
- Spitzenbachgr. Raupen auf gelbem Fingerhut, meist angestochen Ende Mai (G.)
- Natterriegel 10. VIII. 1 ♂ (Str.)
- *chrysitis* L. Hiefiau 2. VII. 1 St. (Z.), dortselbst Mitte VII. a. L. (Galv.)
- \* — ab. *anrea* Huene. Adm. und Umgeb. u. Hall b. Adm. a. L. viel häufiger als die Stammform (K.)
- \* — ab. *juncta* Tutt. Adm. und Umgeb. u. Hall a. L. ebenso häufig als vorige ab. (K.)
- *chryson* Esp. Mariazell VII., VIII. nicht selten (U.)
- Hiefiau 18. VII. a. L. (Galv.)

(Fortsetzung folgt.)

## Eine zweite Generation von *Apatura iris*.

Die ältesten hiesigen Sammler haben bisher noch nicht beobachtet, daß von *Ap. iris* eine zweite Generation im Freien zur Entwicklung kam.

Am 18. September 1911 fand ich im Freien eine fast erwachsene Raupe von *Ap. iris* und am 30. September ein zweites Stück. Die Raupen ergaben am 28. September bzw. 15. Oktober die Puppen, aus welchen am 13. und 27. Oktober die Falter schlüpften. — Die Falter (2 ♂) erschienen abends 10 Uhr und waren im Gegensatz zur ersten Generation von geringerer Größe. — Sonstige abweichende Merkmale waren nicht vorhanden. Das Erscheinen einer zweiten Generation bei *Ap. iris* war wohl auch eine Folge des außerordentlich heißen Sommers 1911.

Ferdinand Ochs, Mühlhausen i. Thür.

## Briefkasten.

Anfrage des Herrn v. M. in D.: Wie beseitigt man die sogenannten Wasserflecke, welche zuweilen auf Faltern entstehen, die man auf feuchtem Sande aufweicht? Es handelt sich nicht um die Reinigung ölig gewordener Tiere.

## Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

## Lucaniden

bestimmt

W. Möllenkamp, Dortmund,  
Kronprinzenstrasse 21.

## ! Aus Togo !

### *Petrognatha gigas*,

Riesenbockkäfer mit sehr langen Fühlern, extra starke Tiere, soeben frisch eingetroffen, sind das Stück mit 3,50 Mk. abzugeben. Porto und Packung besonders. Nachnahme oder Voreinsendung.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

## D. morosus-Eier

(Ind. Stabheuschrecke !)

hochinteressante Zucht (Futter: Efeu, Tradeskantia, Schlehe usw.), 100 Stück 60 Pf. Ferner:

## B. mori-Eier,

bunte Cocons ergebend, 100 Stück 30 Pf. Auch Tausch gegen anderes Zuchtmaterial oder Tütenfalter.

Entomologischer Verein Weissenfels a. S.  
I. A.: Eduard Uhlig, Neuestr. 1 II.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Ochs Ferdinand

Artikel/Article: [Eine zweite Generation von Apatara Iris. 5](#)