

**Systematisches Verzeichnis
der von mir 1900 bis 1906 in Südtirol erbeuteten
Makrolepidopteren.**

Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Südtirols.
Mit 5 Neubeschreibungen.

Von H. Stauder, Triest.

(Fortsetzung.)

370. *Acidalia strigaria* Hb. bei Terlan äußerst gemein auf Wiesen und Bahndamm im VI, VII, scheinbar nur in einer Gen.
371. „ *strigilaria* Hb. ebenda gemein zur selben Zeit.
372. „ *ornata* Sc. wohl überall gemein V und VII, VIII.
373. *Codonia orbicularia* Hb. 1 ♀ Terlan 3. VII. 05.
374. „ *punctaria* L. 1 ♂ ♀ 18. V. 03 Terlan.
375. „ *linearia* Hb. 1 ♀ Terlan 24. VI. 05.
376. *Rhodostrophia calabraria* Z. sehr gemein im VI, VII im Peterlebachbette bei Terlan.
377. *Timandra amata* L. überall in 2 Gen. V, VI und VIII, IX.
378. *Minoa murinata* Sc. Stammform gemein V, VI in der Klaus bei Terlan, darunter selten ab. *cineraria* Stgr.
379. *Anaitis plagiata* L. gemein Terlan VI.
380. *Operophtera boreata* L. 1 ♂ 2 ♀ ♀ 3. XI. 04 Andrian.
381. „ *brumata* L. vielfach im XII bei Terlan und Andrian.
382. *Eucosmia certata* Hb. mehrfach Terlan, Frühjahr.
383. *Lygris populata* L. 1 ♂ ♀. Mendelstraße. I. VII. 04.
384. *Larentia variata* Schiff. 1 ♂ 3. VI. 03 Terlan.
385. „ *firmata* Hb. 6. VI. 04 Andrian, abgeflogen.
386. „ *salicata* Hb. gemein V und VII, VIII.
387. „ *parallelolineata* Betz. (= *vespertina* Bkh.) 1 ♂ 3. IX. 05 Terlan.
388. „ *incursata* Hb. 20. VI. 09 Mendelpaß, 1 ♂.
389. „ *caesiata* Lang 26. VII. 03 Perdonig bei Andrian.
390. „ *infidaria* Lah. 1. VII. 04 Mendelpaß 1 ♂.
391. „ *scripturata* Hb. 3 ♂♂ Mendelstraße 29. VI. 04.
392. „ *riguata* Hb. mehrfach Andrian VII. 04.
393. „ *alaudaria* Frr. 22. VI. 09 Trafoi (1750 m) 1 ♂.
394. „ *abulata* Schiff. 20. VI. 09 Mendelpaß 1 ♂, bedeutend brauner gefärbt als illyrische Stücke.
395. „ *obliterata* Hufn. sehr gemein im Hochsommer in allen Etschauen.
396. „ *bilineata* L. überall; viele meiner Südtiroler Stücke sind sehr schwach gezeichnet, von hellgelber Grundfarbe.
397. *Asthena candidata* Schiff. Terlan gemein V, VI, VII.
398. *Chloroclystis rectangulata* L. Raupen im V, VI massenhaft von Apfelblüten, Falter im VI gemein Terlan.
399. *Phthalapteryx polygrammata* Bkh. 1 ♀ 6. VI. 03 Terlan.
400. „ *tersata* Hb. mehrfach Andrian V und VIII 04.
401. *Arichanna melanaria* L. 1 ♀ Etschauen, Terlan 28. VI. 04.
402. *Abraxas marginata* L. gemein, VI, VIII, IX wohl überall.
403. *Abraxas adustata* Schiff. 2. VI. 04 Terlan.
404. *Bapta bimaculata* F. 2 ♂♂ 26. V. 04 Andrian.
405. *Deilinia pusaria* L. sehr gemein Etschauen VI, VII, VIII.
406. *Metrocampa margaritata* L. Mendelpaß 1. VII. 04, mehrfach am Licht.
407. *Ennomos autumnaria* Weinb. 1 ♂ 3 X. 04 Andrian.
408. *Selenia tetralunaria* Hufn. Frühjahr Terlan mehrfach; g. a. *aestiva* Stgr. 2 ♂♂ Bozen 6. VII. 04.
409. *Therapis evonymaria* Schiff., 1 ♀ 28. VIII. 04 Terlan.
410. *Eurymene dolabraria* L. 1 ♂ 2 ♀♀ 6. VI. 04 Andrian.
411. *Epione advenaria* Hb. mehrfach Terlan VI.
412. *Venilia macularia* L., darunter nicht selten ab. *meridionalis* Hufn. Terlan, Kreith, sehr gemein schon vom April ab.
413. *Semiothisa notata* L. 1 ♂ 28. VI. 03 Terlan.
414. „ *alternaria* Hb. Terlan, IV.
415. *Hybernia rupicaprararia* Schiff. 1 ♂ Bozen 2. II. 04.
416. *Phigalia pedaria* F., im II, III, IV Terlan mehrfach.
417. *Biston pomonaria* Hb. 1 ♂ 16. III. 04 Terlan.
418. „ *hirtaria* Cl. gemein Terlan III, IV.
419. *Nychiodes lividaria* Hb. sehr gemein Bozen, Terlan, VII, VIII.
420. *Boarmia gemmaria* Brahm, überall VI, VII.
421. „ *repandata* L. ebenso.
422. „ *roboraria* Schiff. 1 ♂ 26. V. 04 Terlan.
423. „ *jubata* Thunbg. 1 ♂ ♀ Andrian 6. VII. 04
424. „ *selenaria* Schiff. mit *dianaria* Gn. sehr gemein in 2 Gen., V, VIII, Terlan, Bozen.
425. „ *crepuscularia* Schiff. gemein Terlan in 2 Gen. IV und VII, darunter ab. *defessaria* Frr.
426. „ *punctularia* Hb. zu vielen Hunderten im ersten Frühjahr in den Etschauen an Erlenstämmen sitzend. Eine zweite Gen. niemals beobachtet.
427. *Gnophos furvata* Schiff., 1 ♂ Terlan 3. VII. 03.
428. „ *myrtillata* Thunbg. 1. VII. 04 Penegalhöhe.
429. „ *zelleraria* Frr. 1 ♂ Franzeshöhe VII. 04.
430. *Psodos trepidaria* Hb. 1 ♂ ebenso.
431. *Ematurga atomaria* L. mit v. *orientaria* Stgr. sehr gemein in ganz Südtirol. ♂♂ und ♀♀ äußerst variabel bezüglich Größe, Grundfärbung und Zeichnung. ab. ♂ *unicolaria* Stgr., bei einem Stück auch die Franzen schwärzlich, nicht gescheckt.

(Schluß folgt.)

Briefkasten.

Vorläufige Antwort auf die Anfrage des Herrn Professor Dr. Rudow in Nr. 36 der Zeitschrift:

Herr Professor Dr. Standfuß teilt mit, daß in der entomologischen Sammlung der Eidgen. Technischen Hochschule Zürich sich zwei starke Bleiplatten befinden, von denen die eine von *Hylotropes bajulus* L., die andere von *Tetropium luridum* L. durchnagt worden ist. Weil Herr Professor Dr. Standfuß gegenwärtig mit dem zahlreichen lebenden Zuchtmaterial sehr viel Arbeit hat, wird er erst später Spezielleres hierüber berichten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichnis der von mir 1900 bis 1906 in Südtirol erbeuteten Makrolepidopteren. 8](#)