© Bochumer Botanischer Verein e.V.

Jahrb. Bochumer Bot. Ver.	8	156–157	2017

Exkursion: Mittelwestfalen, *Apiaceae* an verschiedenen Standorten, Teil 1

Leitung und Text; GÖTZ HEINRICH LOOS, Protokoll: CORINNE BUCH, Datum: 04.06.2016

Teilnehmer: SANDRA ADAMCZYK, HELGA ALBERT, CARMEN BERLING, THOMAS BOENIGK, CORINNE BUCH, CAROLA DE MARCO, BERNHARD DEMEL, ANJA FEIGE, PETRA FUCHS, RENE HOHMANN, JOANA JAGMANN, IRIS KABUS, MARTIN KEMLER, MICHAEL LOREK, CHRISTIAN LYMEN, BERND MARGENBURG, BARBARA PROLINGHEUER, TOBIAS SCHOLZ, CATHRIN THOMAS

Einleitung

Die Bestimmung von Doldenblütlern bereitet nicht nur Anfängern Schwierigkeiten. Zwar ist das Ruhrgebiet kein "Hotspot" dieser Gewächse, umso besser kann man sich allerdings die hier vorkommenden Arten einprägen. So sollten in einem zweiteiligen Exkursions-Workshop die Arten anhand ihrer Merkmale – sowohl blühend als auch vegetativ – vorgestellt werden, insbesondere ihre Abgrenzung gegeneinander.

Beim ersten Teil Anfang Juni standen die im Frühsommer blühenden Arten im Mittelpunkt. Im Rahmen dieser Autoexkursion wurden sechs verschiedene Standorte im Kreis Unna angefahren, an denen häufige Doldenblütler, aber auch einige Seltenheiten gezeigt werden konnten. Der zweite Teil des Workshops fand am 30.07.2016 statt (vgl. LOOS 2017).

Abb. 1: Im Bauerngarten der Ökologiestation in Bergkamen (C. BUCH).

Abb. 2: Geruchsprobe (C. BUCH).

Bauerngarten der Ökologiestation Bergkamen (Abb. 1 & 2)

Anthriscus caucalis – Hunds-Kerbel
Foeniculum vulgare – Fenchel
Levisticum officinale – Liebstöckel

Wiesen und Säume in der Umgebung der Ökologiestation

Chaerophyllum bulbosum – Knolliger Kälberkropf
Chaerophyllum temulum – Taumel-Kälberkropf
Heracleum sphondylium – Wiesen-Bärenklau

Datteln-Hamm-Kanal

Berula erecta – Aufrechter Merk, Berle
Daucus carota – Wilde Möhre
Heracleum sphondylium – Wiesen-Bärenklau
Torilis japonica – Gewöhnlicher Klettenkerbel

© Bochumer Botanischer Verein e.V.

Jahrb. Bochumer Bot. Ver.	8	156–157	2017

Siedlung in Kamen-Methler

Aegopodium podagraria – Giersch
Aethusa cynapium s. str. – Hundspetersilie i. e. S.
Anthriscus sylvestris – Wiesen-Kerbel
Chaerophyllum temulum – Taumel-Kälberkropf (Abb. 3 & 4)

Brache der ehemaligen B1 in Unna-Massen

Conium maculatum – Gefleckter Schierling (Abb. 5 & 6)

Straßenrand in Unna-Rudolf-Diesel-Straße

Pimpinella peregrina – Fremde Bibernelle

Abb. 3: *Chaerophyllum temulum*, blühend (C. Buch).

Abb. 4: *Chaerophyllum temulum,* Fruchtstand (C. Buch)

Abb. 5: *Conium maculatum*, blühend (C. Buch).

Abb. 6: *Conium maculatum*, mit Größenvergleich (C. Buch).

Literatur

Loos, G. H. 2017: Exkursion: Mittelwestfalen, *Apiaceae* an verschiedenen Standorten, Teil 2. – Jahrb. Bochumer Bot. Ver. 8: 158–159.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Loos Götz Heinrich

Artikel/Article: Exkursion: Mittelwestfalen, Apiaceae an verschiedenen Standorten, Teil 1 156-157