

statt Wonguei-Cheong, Seite 12 unter Nr. 14 Yowmati statt Yomati, Seite 15 unter Nr. 32 Kuang-dung statt Suang-dung, alles Druckfehler, auf die mich Herr B. Schmacker aufmerksam zu machen die Güte hatte. Derselbe constatirte auch die irrthümliche Angabe Seite 14 unter Nr. 23, dass *Mel. Hongkongiensis* Brot teste Moellendorff bei Hongkong vorkommen soll. Moellendorff protestirte dagegen, besitze und kenne die Art überhaupt nicht, viel weniger habe er sie daselbst gefunden. Mit der zweiten Fundortsangabe Hainan dürfte es ebenso sein.

Neue Kretenser Landschnecken.

Von

Hermann von Maltzan.

1. *Hyalinia Mülleri* m.

Testa mediocriter et pervie umbilicata, orbiculata, depressiuscula, spira plano-convexa, cornea, solidula, irregulariter striatula, sub lente superne lineis spiralibus impressis granulata, inferne pallidior, laevis. Anfractus $5\frac{1}{2}$ - 6 convexiusculi, leniter regulariterque crescentes, sutura distincta vix impressa discreti, ultimus inflatus, subdilatatus, ad peripheriam vix subangulatus, basi rotundatus et sensim in umbilicum cylindricum abiens, antice haud descendens. Apertura late ovata, valde lunata, sat obliqua, peristomate simplici, margine externo medio sat producto, columellari ad insertionem leviter dilatato, intus remote albolabiato.

Diam. maj. 12, min. 11, alt. 6,5 mm.

Hab. Lethe, Messara Cretae.

2. *Helix (Xerophila) Oertzeni* m.

Testa orbiculato-depressa, pervie umbilicata, cretaceo-alba, striatula, solidula; spira parum elata, apice nigricante.

Anfractus 5 convexiusculi, sutura impressa discreti, leniter crescentes, ultimus major, ad aperturam subdilatatus, prope suturam planatus, medio subangulatus, circa umbilicum mediocrem sed anfr. penultimum plane mostrantem subcarinatus. Apertura subcircularis, parum excisa, peristomate simplici ad insertionem marginis basalis vix dilatato. (An adulta?)

Diam. maj. 8, min. 7, alt. vix 5 mm.

Hab. Omalo, Kreta.

3. *Helix (Xerophila) Hierapetrana* m.

Testa late et perspectiviter umbilicata, depressa, ovato-rotundata, solidula, irregulariter striata et lineolis impressis notata, sordide albida, lutescenti tincta, lineolis maculisque fuscis ad peripheriam et infra suturam seriatim dispositis ornata; spira parum elevata, vertice subtili corneo. Anfractus 5 convexiusculi, sutura impressa simplici discreti, leniter crescentes, ultimus transverse dilatatus, primum angulato-carinatus, dein rotundatus, antice haud descendens. Apertura subcircularis, vix lunata, peristomate simplici intus remote labiato, marginibus conniventibus, basali vix dilatato.

Diam. maj. 10,5, min. 9, alt. vix 6 mm.

Hab. Hierapetra, Creta.

4. *Helix Sitiensis* m.

Testa late et pervie, sed haud perspectiviter umbilicata, convexo-depressa, carinata, ruditer irregulariterque striata, alba, lineolis fuscis varie cingulata; spira convexo-depressa, vertice subtili corneo. Anfractus 5 vix convexiusculi, sutura impressa discreti, superi leniter crescentes, penultimus major, ultimus carinatus, carina primum acuta, dein sensim evanescente, inferne inflatus, antice haud descendens. Apertura subcircularis,

parum obliqua, vix lunata, peristomate simplici, intus remote tenuiterque labiato, marginibus conniventibus, basali ad insertionem vix dilatato.

Diam. maj. 13, min. 11, alt. 7 mm.

Hab. To Plou, Sitia, Creta.

5. *Clausilia cretensis* var. *sphakiota* m.

Differt a typo testa plerumque majore, multo magis ventricosa, apice hebetiore, corneo, cervice distincte sulcato, gibbositate rimali distincte subtilius costulata.

Alt. 19—20, diam. $4\frac{1}{8}$ — $4\frac{1}{2}$ mm.

Hap. Nipro, Sphakia, Creta.

6. *Pomatias cretensis* m.

T. parva, ovato-turrita, costis obliquis quam interstitia angustioribus undique sculpta, griseo-cornea. Anfractus 8—9 convexiusculi, regulariter crescentes, sutura profunda discreti; apex sat magnus, laevis; ultimus vix major, basi rotundatus, angustissime perforatus, antice subascendens. Apertura vix obliqua, subcircularis, supra angulata peristomate duplici, interno super parietem aperturalem continuo, externo brevissime expanso, haud auriculato.

Alt. 7, diam. anfr. ult. 3,5, alt. apert. obl. 2 mm.

Hab. Anapolis, Sphakia, Creta.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Maltzan Hermann, Freiherr zu Wartenberg und Penzlin

Artikel/Article: [Neue Kretenser Landschnecken. 117-119](#)