

Ueber die Ursache der grossen Veränderlichkeit aller dieser Arten in dem Steinheimer Becken wage ich ebenso wenig eine Vermuthung, als über die analoger Fälle aus anderen, da mir die Zeit dazu noch nicht gekommen scheint.

Ein neuer *Cyclotus*.

Von E d. von Martens.

Cyclotus angulatus n.

Testa depressa, late umbilicata, striatula, superne liris spiralibus nonnullis subelevatis obsoletis scupta, peripheria tumido-angulata, pallide brunneoflavescens, superne fasciis interruptis vel flammulis, inferne fasciolis angustis fuscis picta; spira vix prominula, obtusa; anfr. 4, convexiusculi, sutura medioeri discreti, ultimus paullum et sensim descendens; apertura transverse ovalis, valde obliqua; peristoma duplex, albidum, internum rectum, obtusum, ad suturam leviter emarginatum, externum expansum, ad suturam in lobulum triangularem ascendentem subconvexum excurrens Operculum?

Diam maj. 17, min. $14\frac{1}{2}$ alt. 8; apert. long 6 lat. inclusio lobulo $7\frac{1}{2}$ Mill.

„New-Beland, Sulu-Sea“, mit *Cyclotus Amboinensis* von Herr Thomson erhalten, leider ohne Deckel, so dass es ungewiss bleibt, ob er zur Gattung *Pterocyclos* oder zu der im Mundsaum ähnlichen Gruppe der *Cycloti pterocyloidei* (Ostasiat. Landschneck S. 116) gehört. Die Aehnlichkeit mit *C. pruinosus* und *Batjanensis* aus demselben Faunengebiet veranlassen mich, die neue Art bis zur Kenntniss des Deckels bei *Cyclotus* zu lassen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1874

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Martens Carl Eduard von

Artikel/Article: [Ein neuer Cyclotus. 56](#)