

**Diagnosen neuer Arten aus dem Binnenlande
von China.**

Von

Dr. O. von Möllendorf in Peking.

1. Pterocyclus chinensis.

Testa late umbilicata, turbinato-depressa, solidula, subpellucida, subtilissime striata, fusca, plerumque marmorata, medio unifasciata, spira subdepressa, anfr. $4\frac{1}{2}$ perconvexi, ultimus antice descendens; umbilicus conicus, profundus; apertura diagonalis, circularis; peristoma duplex, internum breve, externum reflexiusculum, incrassatum; operculum subtestaceum, subconcavum, margine anfractuum lamelloso-elevato.

Diam. maj. 18, min. $15\frac{3}{4}$, alt. 11 Mm., aperturae diam. $7\frac{3}{4}$ Mm.

Berge bei Kiukiang in der Provinz Kiangsi am Yangtsekiang.

2. Cyclophorus Martensianus.

Testa peranguste umbilicata, turbinata, solidula, subtiliter striata, pallide fusco-cornea, fasciis multis fuseis plerumque interruptis (una latiore infra peripheriam plerumque integra), spira satis elevata, apice acutiusculo, fusco; anfractus 5 convexit, ultimus ventrosus, in adultis antice brevissime descendens; umbilicus angustus, subobtectus; apertura obliqua, subcircularis, intus albida; peristoma duplex (saepe multiplex), internum simplex, rectum, marginibus callo junctis, externum reflexiusculum, incrassatum, discontinuum; operculum corneum subconcavum.

Diam. maj. 24,5, min. 20,5, alt. 22,5 Mm., apert. diam. 14, alt. 12,5 Mm.

An lehmigen bewachsenen Abhängen, in Gärten und in den Bergen um Kiukiang.

3. *Alcyaeus Kobeltianus.*

Testa rimata, globoso-conica, pellucida, subtilissime striata, pallide-flava; spira brevis apice obtuso; anfr. 4 convexi, ultimus valde inflatus, immediate pone aperturam constrictus; pone stricturam tubulo suturae adnato 2 Mm. longo; apertura subcircularis, subobliqua; peristoma duplex; operculum terminale, tenue, corneum, subconcavum, anfractibus subdistinctis.

Long. 5, diam. maj. $4\frac{1}{2}$, min. 4 Mm., apert. $2\frac{1}{4}$ Mm.
Berge bei Kiukiang.

4. *Helix (Camena) latilabris.*

Testa sinistrorsa, umbilicata, depresso conoideo-globosa, ruguloso-striatula, tenuis, flava, fascia unica peripherica, angusta, rufa; anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus basi inflatus, antice brevissime descendens, apertura late lunaris, valde obliqua, peristoma reflexum, late expanse, album, marginibus distantibus, callo vix conspicuo junctis, supero ad insertionem arcuato, basali ad columellam dilatato.

Diam maj. 26, min. 22, alt. 16 Mm, apertura c. peristomate 14 Mm. longa, 15 lata, $11\frac{1}{2}$ alta.

In wenigen leider todten Exemplaren an bewachsenen Abhängen der Berge bei Kiukiang.

5. *Clausilia (Phaedusa) chinensis.*

Testa subrimata, subventroso-fusiformis, pellucida, nitida, subtiliter striata, cornea, spira attenuata, apice obtusiusculo nitido, flavo; anfractus $11\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura simplici conjuncti, ultimus pone aperturam callo subdistincto instructus, post callum subplanatus, rugo-

— 80 —

sostriatus; apertura rotundato-pyriformis, sinulus subobliquus, peristoma continuum, solutum, expansum, reflexiuseulum, leviter incrassatum; lamella supera brevis, a spirali recedenti disjuncta, peristoma attingens, antice furcata; infera recedens; plica principalis inconspicua, intus producta, plicae palatales 2—3 (raro 4) breves, oblique; lunella nulla; plica subcomellaris immersa; clausilium tortuosum, antice rotundatum, latum, compressum.

An alten Mauern in Kiu-kiang.

Anmerkung. Ein grösserer Aufsatz unseres Mitgliedes ist bereits eingetroffen und erscheint, sobald die Originale zu den Abbildungen eingetroffen sind.
(Die Red.)



Die Ueberfülle des vorhandenen Materiales nöthigt uns, die Besprechungen neu erschienener Werke für das nächste Heft zurückzustellen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1874

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Möllendorff Otto Franz von

Artikel/Article: [Diagnosen neuer Arten aus dem Binnenlande von China. 78-80](#)