

260. *subspinosus* A. Adams Proc. zool. Soc. 1853 p. 72.
?
261. *tetragonus* Broderip Proc. zool. Soc. 1832 p. 174. —
Reeve sp. 118. — Mart. Ch. II. t. 24 fig. 5.
var. *breviculus* Sowerby Conch. Ill. fig. 37.
?
262. *trivialis* A. Adams Proc. zool. Soc. 1853 p. 71.
?
263. *undatus* Chemnitz Conch. Cab. XI. t. 192 fig. 1851.
52. — ed. II. t. 36 fig. 7. 8.
Indischer Ocean?
-

Catalog der Gattung *Vitularia* Swainson

von

W. Kobelt.

1. *miliaris* Gmelin p. 3536 (Murex). — Wood Index t. 25
fig. 10.
(Murex purpura scabra Chemnitz Conch. Cab. vol. 10
t. 161 fig. 15).
(vitulinus Lamarck IX. p. 595 nec Gray. — Kiener
t. 47 fig. 2. — Mart. Ch. II. t. 19 fig. 5—8).
(purpura Deshayes — Lam. IX. p. 595 note. —
Reeve sp. 102).
Senegal, Guinea.
2. *salebrosa* King Zool. Journ. V. p. 347. — Sowerby
Conch. Ill. fig. 48. — Kiener t. 47 fig. 1. —
Lam. — Desh. IX. p. 613. — Reeve sp. 98. —
Adams Panama No. 142. — Carpenter Mazatlan
p. 485. — Mart. Ch. II. t. 29 fig. 4. 5.
(vitulinus Gray Zool. Beech. t. 33 fig. 4. 6, nec Lam.).
Panama — Mazatlan.

3. *crenifera* Montrouzier Journ. Conch. IX. 1861 p. 279
t. 11 fig. 9. 10.
Neu-Caledonien.
4. *candida* H. et A. Adams Proc. zool. Soc. 1864 p. 430.
Neu-Seeland.
- ?5 *foveolata* Hinds Voy. Sulph. t. 3 fig. 15. 16, nec Pease.
— Reeve sp. 154. — Carpenter Report I. p. 340
(Rhizocheilus).
Californien.

Zwei neue südeuropäische Species.

Von

S. Clessin.

1. *Clausilia Adami*. n. sp.

Claus. laminata, var. Cortonensis Adami in litt.

Gehäuse: von mittlerer Grösse, mit seichtem Nabelritze, spindelförmig, bauchig, gelbbraun, glänzend, unregelmässig fein gestreift; Gehäusespitze stumpf, schwach kegelförmig; Umgänge 12—14, langsam zunehmend, die 2 oder 3 ersten Glieder eine kurze, fast cylindrische Spitze, die folgenden nehmen anfangs sehr langsam an Weite zu und erst vom 10ten ab verbreitern sie sich so rasch, dass die letzten 3 mehr als die Hälfte der Gehäuselänge ausmachen; der letzte nimmt ca. den vierten Theil des Gehäuses ein, ist am Nacken gar nicht aufgeblasen und nur nahe am Nabelritz läuft eine schmale, wenig hervortretende, durch eine seichte Rinne begrenzte Wulst über denselben; ebenso treten gegen den Mundsaum deutliche Streifen an der Gehäuseoberfläche auf; Naht seicht, Mündung schief-birnförmig, Mundsaum weiss gelippt, verbunden, Oberlamelle kurz, scharf, sehr hoch, von der Spirallamelle getrennt, etwa

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Catalog der Gattung Vitularia Swainson. 252-253](#)