

# Systematisches Verzeichnis

der in der

Umgegend von Osnabrück

bisher beobachteten

# Grossschmetterlinge

(Macrolepidoptera).

---

Aufgestellt

von

H. Jammerath.





## Vorbemerkung.

---

Das im zweiten Jahresbericht des hiesigen Naturwissenschaftlichen Vereins im Jahre 1875 veröffentlichte, von dem verstorbenen Herrn Geh. Reg.-Rat Heydenreich aufgestellte Verzeichnis der in der Umgegend von Osnabrück heimischen Macrolepidoptera (Grossschmetterlinge) kann auf Vollständigkeit und Zuverlässigkeit keinen Anspruch mehr machen. Es sind seitdem für die Fauna der hiesigen Gegend teilweise zahlreiche neue Arten entdeckt, teilweise ist aber unzweifelhaft festgestellt, dass häufiger hier nicht vorkommende Arten aufgenommen sind. Herr Geh. Reg.-Rat Heydenreich macht auch in dieser Beziehung im vierten Jahresbericht für 1880 bereits einige berichtigende Mitteilungen, die sich noch umfangreicher gestalten in den bis zu seinem Tode, im Jahre 1897, fortgeführten Aufzeichnungen, welche mir vorliegen.

Da ausserdem die Aufstellung nach einem jetzt gänzlich veralteten System geschah, so darf es wohl gerechtfertigt erscheinen, wenn ich versuche, auf Grund der durch 23jährige rege Sammeltätigkeit in hiesiger Gegend erworbenen Erfahrungen, ein dem jetzigen Stande der hiesigen Grossschmetterlings-Fauna entsprechendes Verzeichnis neu aufzustellen. Ich benutzte dazu meine eigenen genau und gewissenhaft geführten Notizen und die vorhin erwähnten des Herrn Geheimen Regierungsrats Heydenreich. Schätzenswerte Dienste leisteten mir dabei ausserdem die Mitteilungen zweier hiesiger eifriger Sammler, der Herren Kaufmann B. Brake und Apotheker G. Möllmann. Die, hauptsächlich Arten der Umgegend von Ankum und Menslage enthaltende Sammlung des letztgenannten Herrn

weist einige Falter auf, welche im übrigen Gebiet bislang nicht aufgefunden wurden, auf welche ich teilweise noch zurückkommen werde.

Alle von mir persönlich hier gesammelten Arten erscheinen im Verzeichnis ohne weitere Angabe, die bislang ausschliesslich von den Herren Brake, Heydenreich und Möllmann erbeuteten Falterarten sind hinter den Artnamen mit (Br.) bez. (Hy.) bez. (M.) in Klammern versehen.

Die Fauna erstreckt sich auf die Gebiete von Osnabrück, Melle, Ankum, Menslage, Iburg und Lengerich (W.) mit Umgebung.

Die gegenwärtig bekannte hiesige Grossschmetterlingsfauna hesteht einschliesslich der Abarten und Varietäten aus:

86	Arten	Tagfalter (Rhopalocera)
32	„	Schwärmer (Sphingidae)
117	„	Spinner (Bombycidae)
233	„	Eulen (Noctuae)
207	„	Spanner (Geometridae)

Zusammen 675 Arten.

Dieselben sind, soweit sie schon damals entdeckt waren, von mir zusammengestellt in der im Jahre 1900 vom hiesigen Museum erworbenen Sammlung der in der Umgegend von Osnabrück heimischen Grossschmetterlinge.

Was die Tagfalter und Schwärmer der hiesigen Fauna anbetrifft, so dürften zu den bisher bekannt gewordenen Arten wohl kaum noch neue hinzutreten, oder doch höchstens noch zu den zu letzteren gehörenden Sesien (Glasflügler), welche sich durch ihr fliegenartiges Aussehen und ihre Kleinheit leicht dem Auge entziehen. Hinsichtlich der Spinner, Eulen und Spanner dagegen ist noch mancher Zuwachs zu erwarten, wie das auch schon die beiden letztvergangenen Jahre beweisen. Die zum grossen Teile sehr versteckte, nächtliche Lebensweise

sowohl der Raupen wie der Falter der genannten Familien machen dies erklärlich.

Einige Arten können, trotzdem sie hier angefundene wurden, als heimatsberechtigt nicht angesehen werden. Dieselben gehören grösstenteils der Mittelmeerfauna an, sind meistens sehr geschickte, kräftige Flieger und kommen besonders in heissen Sommern einzeln zu uns. Unter besonders günstigen Bedingungen geschieht dann auch wohl die Fortpflanzung, doch fällt ihre Nachkommenschaft schon sehr bald den für sie nicht geeigneten klimatischen Verhältnissen zum Opfer. Daher habe ich es auch nicht für angezeigt gehalten, dieselben in das nachfolgende Verzeichnis aufzunehmen, möchte sie aber der Vollständigkeit halber wenigstens hier kurz anführen.

*Deilephila celerio* L. (Grosser Weinschwärmer), ein Weltbürger, (sein Verbreitungsbezirk erstreckt sich auf Südeuropa, das wärmere und tropische Asien, Afrika und Australien). Zu uns kommt er in warmen Sommern von den Küsten des Mittelmeeres und pflanzt sich dann, wie gesagt, auch wohl fort. So wurde derselbe im Oktober 1882 von mir als Schmetterling in Melle gefangen; bei dem verstorbenen Musikalienhändler Herrn Höffert habe ich 1865 die von ihm aus hier gefundener Raupe gezogene Puppe gesehen und nach Mitteilungen des Herrn Justizrats Hugenberg hat dieser vor längeren Jahren die Raupe in grösserer Anzahl an seinem Weinstocke erbeutet. Vielleicht rührte auch die Höffert'sche Raupe daher. Die Sammlung des Herrn Apothekers Möllmann enthält ein Exemplar des nur in südlichen Gegenden heimischen hübschen Bärenspinners *Deiopeia Pulchella* welcher von ihm in Menslage auf einem Kleeacker gefangen wurde. Von diesem nicht sehr kräftigen und nicht sehr gewandt fliegenden Tierchen lässt sich nicht annehmen, dass es als fertiges Insekt an seinen Fangort gekommen, viel wahrscheinlicher ist es, dass Ei oder Raupe mit bezogenen Pflanzen oder Samen hierher eingeführt und durch günstige Verhältnisse zur Entwicklu

gelangten. Ebenso befindet sich in Herrn Möllmann's Sammlung ein in Menslage erbeutetes Exemplar von *Pleretes matronula* L., Augsburger Bär, welcher ausserdem hier bislang nicht beobachtet wurde. Ich habe keinen Anstand genommen, die Art der hiesigen Fauna einzureihen, weil deren Vorkommen, wenn auch selten, hier sehr wohl möglich ist, da dasselbe z. B. auch in Hameln und Uelzen zweifellos festgestellt ist.

Noch eines interessanten Falles möchte ich erwähnen, wovon ich durch Herrn Dr. Thörner unterrichtet wurde. Nach demselben ist von ihm in seiner Jugend der schöne Osterluzeifalter *Thais polyxena* Schiff. hier regelmässig im Frühjahr beobachtet worden und erst mit der bis dahin gleichfalls hier vorkommenden Futterpflanze jener Raupe, Osterluzei (*Aristolochia clematilis*), verschwunden. Der Falter findet sich sonst nur im südöstlichen Europa, von Oesterreich ab vor.

Das Verzeichnis ist nach dem bisher gültigen Katalog der „Lepidopteren des Europäischen Faunengebiets“ von Dr. O. Staudinger zusammengestellt. Dies System ist allerdings seit Beginn v. J. durch den von Dr. Staudinger und Dr. Rebel neu bearbeiteten „Katalog der Lepidopteren des palaearktischen Faunengebiets“ ersetzt worden. Doch ist dieser noch nicht so allgemein im Gebrauch, um mich zu veranlassen, ihn schon bei dieser Arbeit zu Grunde zu legen.

Möge dieses kleine Werk dazu anregen, der Schmetterlingskunde hier noch recht zahlreiche neue Jünger zuzuführen, welche bestrebt sind, besonders die hiesige Fauna immermehr zu vervollständigen. Kaum ein anderes Naturgebiet ist in gleichem Masse geeignet und für die Reize der herrlichen Natur empfänglicher zu machen und nach des Tages Mühe und Arbeit Herz und Gemüt in solch' hohem Grade zu erfrischen.

Osnabrück, Weihnachten 1902.

H. Jammerath.

## A.

## Rhopalocera = Tagfalter

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
I. Papilionidae.		
1. <b>Papilio</b> L.	<b>Schwanzfalter.</b>	
Podalirius L.	Segelfalter	In hügeligen Gegenden, z. B. vor dem Johannis- thore, Steinkamp pp.
Machaon L.	Schwalbenschwanz	Ueberall.
ab. <i>Bimaculatus</i> .		
ab. <i>rubromaculatus</i> .		
II. Pieridae.		
1. <b>Aporia</b> Hb.		
Crataegi L.	Heckenweissling Baumweissling	Die den Obstbäumen sehr schädliche Raupe wird in den letzten Jahren immer seltener.
2. <b>Pieris</b> Schrk.	<b>Weisslinge.</b>	
Brassicae L.	Kohlweissling	Raupe im Herbst 1902 geradezu selten, während sie sonst auf Kohlfeldern häufig verwüstend auftritt
Rapae L.	Rübenweissling	
Napi L.	Grünader	
v. <i>Napaeae</i> Esp.		Sommergeneration.
Daphidice L.	Resedenweissling	
3 <b>Anthocharis</b> B.		
Cardamines L.	Aurora	
4. <b>Leucophasia</b> Stph.		
Sinapis L. (Hy)	Senfweissling	Vorkommen hier fraglich, im Heydenreich'schen Ver- zeichnis aufgeführt.

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
<b>5. Colias F.</b>	<b>Heufalter</b>	
Hyale L.	Gelber Heufalter	
Edusa F.	Goldene Acht	Gewöhnlich selten, 1879 bei Melle sehr häufig.
<b>6. Rhodocera B.</b>		
Rhamni L.	Citronenfalter	
<b>III. Lycaenidae.</b>		
<b>1. Thekla F.</b>	<b>Zipfelfalter</b>	
Betulae L.	Nierenfleck	
Ilicis Esp.		
Pruni L.	Pflaumenzipfelfalter	
Quercus L.	Eichen-Zipfelfalter	
ab. Bellus Gerh. Br.)		Selten.
Rubi L.	Brombeerfalter	
<b>2. Polyommatus Latr.</b>	<b>Feuerfalter</b>	
Hippothoë L.	Goldfalter	
Dorilis Hufn.	Brauner Feuerfalter	
Phlaeas L.	Feuerfalter	
<b>3. Lycaena F.</b>	<b>Bläulinge</b>	
Argiades Pall.		
ab. Coretas O. (Hy.)		Frühlingsgeneration.
v. Polysperchon Bg.		
Aegon Schiff.		
Argus L.		
Icarus Rott.	Gemeiner Bläuling	
Argiolus L.		
Minima Fuessl. (Hy.)		
Semiargus Rott.		
Arion L. (Hy.) (M.)	Schwarzgefleckter Bläuling	Bei Lengerich und Mens- lage.
Alcon F.		



Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
IV. Erycinidae. 1. <b>Nemeobius</b> Stph. Lucina L.	Brauner Würfelfalter	Hauptsächlich in der Um- gebung von Sutthausen.
V. Apaturidae. 1. <b>Apatura</b> F. Iris L. ab. Jole Schiff.	<b>Schillerfalter</b> Blauschillerfalter	Zuerst von mir in diesem Sommer aus der Raupe gezogen.
VI. Nymphalidae. 1. <b>Limenitis</b> F. Populi L. ab. Tremulae Esp. Sibilla L.	<b>Eisfalter</b> Grosser Eisfalter Kleiner Eisfalter, weisser Admiral	1890 sehr häufig, sonst selten. Desgl. Ueberall in Wäldern häufig.
2. <b>Vanessa</b> F. Levana L. ab. Porima O. v. Prorsa. C album L. Polychloros L. Urticae L.	<b>Zackenfalter</b> Braune Landkarte Schwarze Landkarte C-Falter, weisses C Grosser Fuchs Kleiner Fuchs, Nessel- falter	Frühjahrgeneration. Sommergeneration.
Jo L. ab. Joides O. Antiopa L. ab. Hygiaea Hdrch. (Hy.)	Tagpfauenauge Trauermantel	1876 von Heydenreich zu erst hier aus der Raupe gezogen. Sehr selten.
Atlanta L. Cardui L. 3. <b>Melitaea</b> F. Aurinia Rott. Cinxia L.	Admiral Distelfalter <b>Scheckenfalter</b>	

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
Athalia Rott.	Gemeiner Schecken- falter	
Aurelia Nick. (Hy.) 4. <b>Argynnis</b> F.	<b>Perlmutterfalter</b>	
Selene Schiff.	Märzveilchenfalter	
Euphrosyne L.	Kleiner Perlmutter- falter	
Lathonia L.	Grosser Perlmutter- falter	
Aglaja L.	Kaisermantel, Silber- strich	
Niobe L. (Hy.)	Brettspiel, Damen- brett	
ab. Eris Meig. (Hy.)	<b>Mohrenfalter</b>	
Adippe L. (Hy.)	Kuhauge	Von mir bei Bad Essen 1866 gefangen.
Paphia L.	<b>Sammetfalter</b>	
VII. Satyridae.	Rostbinde	
1. <b>Melanargia</b> Meig.	<b>Ringaugenfalter</b>	
Galathea	Mauerfuchs	
2. <b>Erebia</b> B.	Quekengrasfalter	
Medusa F.	<b>Ochsenauge</b>	
3. <b>Salyrus</b> F.	Sandauge	
Semele L.	Weggrasfalter	
Statilinus Hufn.	Hirsengrasfalter	Hier noch nicht gefangen, bei Melle häufig.
4. <b>Pararge</b> Hb.		
Megera L.		
Aegeria v. Egerides Stgr.		
5. <b>Epinephele</b> Hb.		
Anaira L.		
Lithonus L.		
Hyperanthus L.		

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
6. <b>Coenonympha</b> Hb. Hero L.	<b>Wiesenfalter</b> Bleistreif-Wiesen- falter	Besonders im Sutthäuser Gehölz.
Pamphilus L. Tiphon Rott.	Kammgrassfalter Grosser gelber Heu- falter	Fliegt auf den Sumpf- wiesen am Heger Gehölz.
VIII. Hesperidae. 1. <b>Syrichtus</b> B.	<b>Würfeldickkopf- falter</b> Würfelfbrett	Fliegt auf kahlen Hügeln, besonders bei der Zucht- lingsburg.
Malvae L. ab. Taras Meig. Sao Hb. (Hy.) 2. <b>Nisoniades</b> Hb. Tages L. 3. <b>Hesperia</b> B.	<b>Braun.-Dickkopf- falter</b>	Fliegt auf kahlen Hügeln, besonders bei der Zucht- lingsburg.
Thaumas Hufn. Lineola O. Sylvanus Esp. Comma L. 4. <b>Carterocephalus</b> Ld. Palaemon Pall.		

## B. Heterocera = Dämmerungs- und Nachtfalter.

### A. Sphinges L.

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
I. Sphingidae B.	<b>Schwärmer</b>	
1. <b>Acherontia</b> Ochs.	<b>Totenkopf</b>	
Atropos L.	Totenkopf	Gewöhnlich selten, 1865 sehr häufig.
2. <b>Sphinx</b> O.	<b>Aechte Schwärmer</b>	
Convolvuli L.	Windig, Winden- schwärmer	Gewöhnlich selten
Ligustri L.	Ligusterschwärmer	
Pinastri L.	Fichtenschwärmer	
3. <b>Deilephila</b> O.	<b>Weinschwärmer</b>	
Galii Rott.	Labkrautschwärmer	Sehr häufig. Gewöhnlich selten; häufig 1888.
Euphorbiae L.	Wolfsmilch- schwärmer	Selten; Raupe besonders auf den Kirchhöfen, wo die Cypressen-Wolfsmilch wächst, gefunden.
Elpenor L.	Mittlerer Wein- schwärmer	Häufig.
Porcellus L.	Kleiner Wein- schwärmer	Raupe, wenn erwachsen, sehr versteckt in der Erde.
4. <b>Smerinthus</b> O.	<b>Zackenschwärmer</b>	
Tiliae L.	Lindenschwärmer	
Ocellata L.	Abendpfaunauge	
hibr. Hybridus Westw.		Bastard aus der Paarung zwischen Ocellata- Männchen und Populi- Weibchen.
Populi L.	Pappelschwärmer	

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
5. <b>Macroglossa</b> Ochs. Stellatarum L.	<b>Tagschwärmer</b> Taubenschwanz, Karpfenschwanz	Meistens häufig.
Bombyliformis O. Fuciformis L.	Hummelschwärmer Scabiosenschwärmer	Desgl. Selten.
II. <b>Sesidae</b> HS.	Glasflügler	
1. <b>Trochilium</b> Sc. Apiforme Cl.	<b>Holzglasflügler</b> Bienenschwärmer, Hornisschwärmer	Häufig, Falter hier besonders an den Stämmen der Pappelallee an der Laischaftsstrasse.
2. <b>Sciapteron</b> Stgr. Tabaniforme Rott.	Bremsenschwärmer	Seltner, Falter an jungen Schwarzpappelstämmen.
3. <b>Sesia</b> F.	<b>Glasflügler</b>	
Spheciformis Gern.	Erlenglasflügler	Falter auf Erlen oft häufiger.
Tipuliformis Cl. (Hy.)		
Asiliformis Rott. (Hy.)	Apfelbaumglasflügler	Falter an alten Apfelbäumen.
Myopaeformis Bkh.	Birkenglasflügler	Falter ab und zu an Birkenstämmen.
Culiciformis L. Formicaeformis Esp. (Hy.)		
4. <b>Bembecia</b> Hb.	Himbeerglasflügler	Raupe und Puppe in vorjährigen Himbeertrieben.
III. <b>Zygaenidae</b> B.	Zygänen, Widderchen	
1. <b>Ino</b> Leach.	<b>Grünwidderchen</b>	
Pruni Schiff.	Schlehenwidderchen	
Statice L.		
2. <b>Zygaena</b> F.	<b>Blutströpfchen,</b>	
Pilosellae Esp.	<b>Widderchen</b>	In Osnabrück zuerst 1902 von Hrn Brake gefangen, schon früher bekannt aus Lengerich (W.) u Menslage.

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
Trifolii Esp. ab. Confluens Stgr. ab. Orobi Hb.	Kleewidderchen	
Filipendulae L. ab. Cystriasi Hb.	Gemeines Bluts- tröpfchen.	

## B.

## Bombyces = Spinner.

## I. Nycteolidae H.S.

1. **Sarrothripa** Gn.

Undulana Hb.

ab. Dilutana Hb.

ab. Punctana Hb.

ab. Ramosana Hb.

2. **Earias** Hb.

Clorana L.

3. **Hylophila** H.

Prasinana L.

Bicolorana Fssl.

## II. Lithosidae HS.

1. **Nola** Leach.

Cucullatella L.

Confusalis H.S. (Hy.)

2. **Calligenia** Dup.

Miniata Forst.

3. **Setina** Schk.

Irrorella Cl.

Mesomella L.

4. **Lithosia** F.

Griseola Hb.

Depressa Esp.

**Grünspinner****Kahnspinner**

Buchen-Kahnspinner

Eichen-Kahnspinner

Rosenmotte

**Flechtenspinner**

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
Complana L. Sororcula Hufn.		
5. <b>Gnophria</b> Stph. Quadra L. Rubricollis L.	Würfelmotte, Viereck	
III. Arctiidae Stph.	Bärenspinner	
1. <b>Euchelia</b> B. Jacobaeae L.	Blutfleck	
2. <b>Nemeophila</b> Stph. Russula L. Plantaginis L.	Hainbär Kleiner Bär, Wege- richbär	
3. <b>Callimorpha</b> Latr. Dominula L.	Specht, Jungfer	Hier als Raupe noch nicht gefunden, in Melle da- gegen sehr häufig in den achtziger Jahren.
4. <b>Pleretes</b> Ld. Matronula L. (M.)	Augsburger Bär	Von Herrn Möllmann bei Menslage gefangen, sonst noch nicht hier aufge- funden.
5. <b>Arctia</b> Schck. Caja L. Purpurata L. v. Atromaculata.	Brauner Bär Purpurbär	Selten.
6. <b>Spilosoma</b> Stph. Fuliginosa L. Mendica Cl. Lubricipeda Esp. Menthastri Esp. Urticae Esp.	Zaunbär Graue Tigermotte Glitschfuss Weisse Tigermotte	Diese prächtige Abart ist besonders von Raupen aus Bramsche gezogen.

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
<b>IV. Hepialidae H.S.</b>		
1. <b>Hepialus</b> F.		
Humuli L.	<b>Wurzelspinner</b> Hopfenspinner	Hier selten.
Sylvinus L.		Desgl.
Velleda Hb. (Hy.)		Desgl.
Lupulinus L.		
Hecta L.	Silberband	
V. Cossidae H.S.		
1. <b>Cossus</b> Fabr.		
Cossus L.	<b>Holzbohrer</b> Weidenbohrer	Raupen leben 2—3 Jahre im Holze, besonders Pappeln, Weiden, aber auch Obststämmen, da- her sehr schädlich.
2. <b>Zeuzera</b> Latr.		
Pirina L.	Blausieb, Kastanien- bohrer	Besonders aus Obstgärten am Gertrudenberge. Raupe sehr schädlich in Obstbaumstämmen.
<b>VI. Cochliopodae B.</b>		
1. <b>Heterogenea.</b>		
Knoch.		
Limacodes Hufn.		
Asella Schiff.		
<b>VII. Psychidae Hb.</b>		
1. <b>Psyche</b> Schrk.		
Opacella S.H.		
2. <b>Epichnopteryx</b> Hb.		
Pulla Esp.		
<b>VIII. Liparidae B.</b>		
1. <b>Orgyia</b> O.		
Gonostigma F.	<b>Bürstenspinner</b> Eckfleck	
Antiqua L.	Lastträger, Postillon	
Ericae Germ. (Hy.)		



Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
2. <b>Dasychira</b> Stph. Fascelina L. (Hy.) Pudibunda L.	<b>Bürstenspinner</b> Büschelträger Streckfuss, Kopf- hänger	
3. <b>Laria</b> Hb. L. nigrum Mueller. (V. nigrum F.)	V. Spinner	
4. <b>Leucoma</b> Stph. Salicis L.	Pappelspinner, Ringelfuss	Oft sehr häufig und dann schädlich an Pappeln und Weiden.
5. <b>Porthesia</b> Stph. Chrysorrhoea L.	Goldafter Schwan	Tritt hier nie so häufig auf, um schädlich wir- ken zu können, wie an- derswo.
Similis Fuessl. (Auriflua) F.		Häufig und schädlich auf Obstbäumen.
6. <b>Psilura</b> Stph. Monacha L.	Nonne	Hier noch nicht so häufig aufgetreten, um merk- lich schädlich zu wer- den, wie vor einigen Jahren bei Damme.
ab Eremita O.		
7. <b>Ocneria</b> H.S. Dispar L. (Hy.)	Schwammspinner	Sonst überall häufig und schädlich, hier sehr sel- ten, im Heydenreich'- schen Verzeichnis auf- geführt.
IX. Bombycidae B.	Glucken	
1. <b>Bombyx</b> B.	<b>Spinner</b>	
Crataegi L.	Weissdornspinner	
Populi L.?	Pappelspinner	
Neustria L.	Ringelspinner	
Lanestris L. (Hy.)	Wollafter	Sehr schädlich an Obst- bäumen.

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
Trifolii Esp. ab. Medicaginis.	Kleeblumenspinner	
Quercus L.	Eichenspinner	
Rubi L.	Brombeerspinner	
2. <b>Lasiocampa</b> Latr.	<b>Echte Glucken</b>	
Potatoria L.	Trinkerin, Grasglucke	
Pruni L.	Pflaumenglucke, Feuerglucke	
Quercifolia L.	Kupferglucke, Eich- blatt	
ab Alnifolia O.		
Tremulifolia Hübn. (Betulifolia O.)	Birkenblatt	
Pini L.	Tannenglucke, Kiefernspinner	Nicht so häufig, nm hier schädlich zu werden, wie in vielen Gegenden.
X. Endromidae B.		
1. <b>Endromis</b> O.		
Versicolora L.	Scheckflügel	Oft häufig, in vielen Jah- ren selten.
XI. Saturnidae B.		
1. <b>Saturnia</b> Schrk.	<b>Nachtpfauenaugen</b>	
Pavonia L.	Kleiner Nachtpfau	Wie bei Versicolora.
2. <b>Aglia</b> O.		
Tau L.	Nagelfleck, Tau	
XII. Drepanulidae B.		
1. <b>Drepana</b> Schrk.	<b>Sichelflügler</b>	
Falcataria L.		
Curvatula Bkh.		
Lacertinaria L.		
Binaria Hufn.		
Cultraria F.		
2. <b>Cilix</b> Leach.		
Glaucata Sc.		

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
XIII. Notodontidae B.		
1. <b>Harpyia</b> O.	<b>Gabelschwanz</b>	
Bicuspis Bkh.	Birken-Gabelschwanz	Ein für Sammler sehr geschätzter Falter, welcher in den letzten Jahren sehr selten geworden ist.
Furcula L.	Buchen-Gabelschwanz	
Bifida Hb.	Kleiner Gabelschwanz	
Vinula L.	Hermelinspinner, Gr. Gabelschwanz	
2. <b>Stauropus</b> Germ.		
Fagi L.	Buchenspinner Eichhorn	
3. <b>Hybocampa</b> Ld.		
Milhauseri F.	Pergamentspinner	Wie Bicuspis
4. <b>Notodonta</b> O.	<b>Zahns spinner</b>	
Tremula Cl.	Pappel-Zahns spinner	
Dictaoides Esp.	Birken-Zahns spinner	
Ziczac L.	Zickzack-Spinner	
Tritophus F.	Zitterpappel-Zahns spinner	Selten; meines Wissens hier erst dreimal aus der Raupe gezogen.
Trepida Esp.	Eichen-Zahns spinner	
Torva Hb. (Hy.)		
Dromedarius L.	Erlen-Zahns spinner	
Chaonia Hb.		
Querna F.		
Trimacula Esp.		
v. Dodonaea Hb.		
Bicoloria Schiff.	Weisser-Zahns spinner	
5. <b>Lophopteryx</b> Stph.		
Carmelita Esp.	Karmeliternonne	Ab und zu häufig (1890) meistens selten.
Camelina L.	Kameels pinner	

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
ab. Giraffina H.		
Cuculla Esp.	Ahorn-Zahnspinner	
6. <b>Pterostoma</b> Germ.		
Palpina L.		
7. <b>Drynobia</b> Dup.		
Melagona Bkh.		
8. <b>Gluphisia</b> B.		Selten.
Crenata Esp.		
9. <b>Ptilophora</b> Stph.	Haarschuppenspinner	Rpe. an wildem Ahorn auf
Plumigera Esp.		dem Bröcker- und Schöler-
10. <b>Phalera</b> Hb.	Mondfleck, Wappen-	berge.
Bucephala L.	träger	
11. <b>Pygaera</b> O.	<b>Raubfussspinner</b>	
Anastomosis L.		Selten, von Heydenreich
		in meinem Beisein zwei-
Curtula L.	Erpelschwanz	mal als Raupe am Stein-
Anachoreta F.	Einsiedler	kamp gefunden.
Pigra Hufn.		
XIV. Cymatophoridae HS		
1. <b>Gonophora</b> Brd.		
Derasa L.	Achateule	
2. <b>Thyatira</b> O.		
Batis L.	Brombeereule, Rosen-	
3. <b>Cymatophora</b> Fr.		
Octogesima Hb.	Achtzigeule	
Or F.		
Duplaris L.		
Fluctuosa Hb.		
4. <b>Asphalia</b> Hb.		
Diluta F.		
Flavicornis L.		
Ridens F.		

C.  
Noctuae = Eulen.

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
1. <b>Diloba</b> Stph. Caerulcocephala L.	Blaukopf	
2. <b>Demas</b> Stph. Coryli L		
3. <b>Acronycta</b> O. Leporina L. v. Bradiporina Fr.	Wolleule	
Aceris L. Megacephala F. Alni L. (Hy.)	Ahorneule Grosskopf Erleneule	
Tridens Schiff. Psi. L.	Dreizack Pfeileule	Sehr selten, bisher in je einem Exempl. als Raupe von den Herren Heyden- reich u. Brake gefunden.
Cuspis, Hübn. Auricoma F. Rumicis L. Ligustri, F.	Ampfereule Ligustereule	
4. <b>Bryophila</b> Tr. Perla F.	Perleule	1901 von mir gefangen als Falter.
5. <b>Moma</b> Hb. Orion Esp.	Seladon	
6. <b>Agrotis</b> O. Strigula Thub. Signum, Fabr. (Hy.)	<b>Erdeule, Bandeule</b> Porphyreule	

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
Janthina, Esp.		Von mir als Raupe bei Melle gefunden.
Fimbria L.	Gelbe Bandeule	
Interjecta Hbn.		Geschätzter Falter, hier als Raupe nicht gerade selten, im Frühjahr zu erlangen.
Augur F.		
Pronuba L.	Hausmutter, Saum- eule	
ab. Innuba Tr.		
Orbona Hfn (Subsequa Hbn.)		
Comes Hb. (Orbona F.)		
Triangulum Hfn.		
Baja T.		
C nigrum L.		
Ditrapezium, Bkh.		
Stigmatica H (Rhom- boidea Fr.)		
Xantographa F.		
ab. Cohaesa H.S.		
Rubi View. (Bella Tr.)		
Brunnea F.		
Festiva Hb.		
Plecta L.		
Simulans, Hfn.		
Putris L.		
Exclamationis L.		
Recussa Hb.		
Tritici L.		
v. Fictilis.		
Obelisca Hb.		
Saucia Hb.		

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
Ypsilon Rott. Segetum Schiff.		Sehr schädlich an Gras- wurzeln.
Corticea Hb. Vestigialis Rott. Prasina F. Occulta L.		1900 von mir zuerst als Falter gefangen.
7. <b>Charaeas</b> Stph. Graminis L. ab. Tricuspis. Esp.	Graseule	
8. <b>Neuronia</b> Hb. Popularis F. Cespitis F.	Lolcheule	
9. <b>Mamestra</b> Fr. Leucophaea View. Advena F.		1900 von mir aus der Raupe gezogen.
Tincta Brehm. Nebulosa Hufn. Contigua Vill. Thalassina Rott. Dissimilis Knoch.		
Pisi L. Brassicae L. Persicariae L.	Erbseneule Kohlenle	
ab. Unicolor Stgr. Albicolon Hb. Oleracea L.	Gemüseseule	
Genistae Bkh. Dentina Esp. ab. Latenai Pier.	Zahneule	
Trifolii Rott. Reticulata Vill.		1902 zuerst von mir ge- fangen.

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
<p>Chrysozona Bkh. Serena 10. <b>Dianthoecia</b> B. Nana Rott. Capsincola Hb. Cucubali Fuessl. Carpophaga Bkh. 11. <b>Polia</b> Tr. Chi L. (Hy.) 12. <b>Dryobota</b> Ld. Protea Bkh. 13. <b>Dichonia</b> Hb. Aprilina L. 14. <b>Miselia</b> Stph. Oxyacanthae L. 15. <b>Apamea</b> Tr. Testacea. 16. <b>Luperina</b> B. Matura Hufn. Virens L. 17. <b>Hadena</b> Tr. Adusta Esp. Lateritia Hufn. Monoglypha Hufn. Litoxylea F. (Hy.) Sordida Bkh. (Hy.) Basilinea F. Rurea F. ab. Alopecurus Esp. Hepatica Hb. Gemina Hb. ab. Remissa Tr. Unanimis Tr.</p>	<p>Gemeine Kapseleule</p> <p>Aprileule</p> <p>Weissdorneule</p> <p>Grüne Wieseneule</p>	<p>1900 zuerst von mir gefangen.</p> <p>Falter aber nicht im April, sondern im September und Oktober.</p> <p>Falter von mir 1896 im Posthofe gefangen.</p> <p>Zuerst von mir 1902 aus der Raupe gezogen.</p>



Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
Didyma Esp.		
ab. Nictitans Esp.		
ab. Leucostigma Esp.		
Ophiogramma Esp.		
Strigilis Cl.		
ab. Latruncula Lang.		
ab. Aethiops Hw.		
18. <b>Dypterygia</b> Stph.		
Scabriuscula L.		
19. <b>Hyppa</b> Dup.		
Rectilinea Esp.		
20. <b>Cloantha</b> B.		
Polyodon Cl.		
21. <b>Trachea</b> Hb.		
Atriplicis L.	Meldeneule	
22. <b>Euplexia</b> Stph.		
Lucipara L.	Himbeereule	
23. <b>Brotolomia</b> Ld.		
Meticulosa L.	Achateule	
24. <b>Mania</b> Tr.		
Maura L. (Hy.)	Gespenstereule, Schwarzes Ordens-	Selten; bislang hier nur als Falter gefangen.
	band	
25 <b>Naenia</b> Stph.		
Typica L.	Adereule	
26. <b>Helothropha</b> Ld.		
Leucostigma Hb. (Hy.)		
ab. Fibrosa Hb. (Hy.)		
27. <b>Hydroecia</b> Gn.		
Nictitans Bkh.		
ab. Erythrostigma		
Hw.		
v. Lucens Frr.		

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
Micacea Esp.		
28. <b>Gortyna</b> O.	Markeule	
Ochracea Hb. (Br.)		Von Herrn Brake 1900 aus der Raupe gezogen.
29. <b>Nonagria</b> O.		
Arundinis F. (Hy.)	Rohrkolbeneule	
30. <b>Senta</b> Stph.		
Maritima Tausch (Hy.)		
31. <b>Leucania</b> O.		
Impura Hb.		
Pallens L.		
Obsoleta Hb. (Hy.)		
Comma L.		
Conigera F.		
Albipuncta F. (Hy.)		
Lythargyria Esp.		
v. Agyritis Rbr.		
Turca L.		
32. <b>Grammesia</b> Stph.		
Trigrammica Hfn.		
v. Bilinea Hb.		1900 zuerst von mir ge- fangen.
33. <b>Caradrina</b> O.	<b>Staubeuule</b>	
Morpheus Hfn.		
Quadripunctata F.		
Alsines Brahm.		
Ambigua F.		
Arcuosa Hw. (Hy.)		
34. <b>Rusina</b> B.		
Tenebrosa Hb.		
35. <b>Amphipyra</b> O.	<b>Glanzeule</b>	
Tragopoginis L.	Bockbartseule	
Pyramidea L.	Pyramideneule	
36. <b>Taeniocampa</b> Gn.		
Gothica L.		

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
<p>Miniosa F.</p> <p>Pulverulenta Esp. Stabilis View. Gracilis F. Incerta Hufn. ab. Fuscata Hw. Munda Esp. ab. Immaculata Stgr.</p> <p>37. <b>Panolis</b> Hb. Piniperda Panz.</p> <p>38. <b>Pachnobia</b> Gn. Leucographa Hb. Rubricosa F.</p> <p>39. <b>Dicycla</b> Gn. Oo L.</p> <p>40. <b>Calymnia</b> Hb. Pyralina View. Affinis L. Trapezina L.</p> <p>41. <b>Cosmia</b> O. Paleacea Esp.</p> <p>42. <b>Dyschorista</b> Ld. Fissipuncta Hw.</p> <p>43. <b>Plastensis</b> B. Retusa L. Subtusa F.</p> <p>44. <b>Orthosia</b> O. Lota Cl. Macilenta Hb. Circellaris Hufn. Helvola L.</p>	<p><b>Wollschenkelleule</b></p>	<p>Früher als Raupe häufig, in den letzten Jahren selten.</p> <p>Selten.</p>

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
<p>45. <b>Xanthia</b> Tr. Citrago L. Aurago T. Flavago F. (Togata Esp.) Eulvago L. (Ceraga F.) ab. Flavescens Esp. Gilvago Esp. Ocellaris Bkh.</p>	<p><b>Goldgelbeule</b> Citroneneule Bucheneule  Weidenkätzcheneule</p>	
<p>46. <b>Hoporina</b> B. Croceago F.</p>		Bei Melle häufig, hier selten.
<p>47. <b>Orrhodia</b> Hb. Vau punctatum Esp. Vaccinii L. ab. Spadicea Hb. ab. Mixta Stgr. Rubiginea F.</p>		
<p>48. <b>Scopelosoma</b> Curt. Satellititia L.</p>	Mordraupeneule	
<p>49. <b>Scoliopteryx</b> Germ. Libatrix L.</p>	Zackeneule	
<p>50. <b>Xylina</b> O. Socia Rott. Furcifera Hufn. Zinckenii Tr.</p>		Von mir einmal im Schützenhofe als Falter gefangen.
<p>Ornitopus Rott. (Hy.) 51. <b>Calocampa</b> Stph. Vetusta Hb. Exoleta L. Solidaginis Hb.</p>	Moderholz	Raupe auf Heidelbeeren bei Melle, sehr schwer zu erziehen.

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
52. <b>Xylomiges</b> Gn. Conspicillaris L. ab. Melaleuca View.		
53. <b>Asteroscopus</b> B. Sphinx Hufn.		
54. <b>Xylocampa</b> Gn. Areola Esp.		
55. <b>Cucullia</b> Schk. Verbasci L. (Hy.) Scrophulariae Capieux.	<b>Mönchseulen</b> Brauner Mönch	
Umbratica L.	Grauer Mönch	
56. <b>Plusia</b> O. Triplasia L.	<b>Metalleulen</b> Nesseleule	
Tripartita Hufn.		Bei Melle als Raupe häufig gefunden, hier selten.
Moneta F.	Eisenhuteule	
Chrysitis L.	Messingeule	
Festucaea L. (M.)		Bei Menslage gefangen.
Jota L.		
ab. Percontationis Tr.		
ab. Inscripta Esp.		
Pulchrina Hw.		
Gamma L.	Ypsiloneule, Pistolen- vogel	Die Raupe trat 1890 bei Essen in Flachsfeldern verwüstend auf.
57. <b>Anarta</b> Tr.		
Myrtilli L.		
58. <b>Heliaca</b> H.S.		
Tenebrata Sc.		
59. <b>Chariclea</b> Stph.		
Umbra Hufn.		
60. <b>Erastria</b> O.		
Uncula Cl.		

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
Venustula Hb.		
Fasciana L.		
61. <b>Prothymia</b> Hb.		
Viridaria Cl. (Hy.)		
62. <b>Euclidia</b> O.		
Mi Cl.		
Glyphiea L.		
63. <b>Pseudophia</b> Gn.		
Lunaris Schiff.	Mondeule, Braunes Ordensband	Raupe an jungen Eichen- trieben.
64. <b>Cathephia</b> O.		
Alchymista Schiff.		Wie Lunaris, aber weit seltner.
65. <b>Catocala</b> Schrk.	<b>Ordensbänder</b>	
Fraxini L.	Blaues Ordensband	Ziemlich selten.
Elocata Esp.	Pappel-Ordensband	Desgl.
Nupta L.	Roths Ordensband	Früher überall häufig, in den letzten Jahren selten.
Sponsa L.	Eichenkarmin	Früher häufiger, jetzt selten.
Promissa Esp.	Kl. Eichenkarmin	Desgl.
66. <b>Toxocampa</b> Gn.		
Viciae Hb.		
Craccae F.		
67. <b>Aventia</b> Dup.		
Flexula Schiff.		
68. <b>Zanclognatha</b> Ld.		
Grisealis Hb.		
Tarsipennalis Tr.		
Tarsicrinalis Kuch.		
Emortualis Schiff.		
69. <b>Herminia</b> Latr.		
Derivalis Hb.		
70. <b>Pechipogon</b> Hb.		
Barbalis Cl.		

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
<p>71. <b>Bomolocha</b> Hb. Fontis Thnb.</p> <p>72. <b>Hypena</b> Tr. Rostralis L. Proboscidalis L.</p> <p>73. <b>Rivula</b> Gn. Sericealis Sc. Brephides H.S.</p> <p>74. <b>Brephos</b> O. Parthenias L. Nothum Hb.</p>	<p>Jungfernkind</p>	

**D.**  
**Geometrae = Spanner.**

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
<p>1. <b>Pseudoterpna</b> H.S. Pruinata Hufn.</p> <p>2. <b>Geometra</b> B. Papilionaria L.</p> <p>3. <b>Phorodesma</b> B. Pustulata Hufn.</p> <p>4. <b>Nemoria</b> Hb. Porrinata Z. Strigata Muell.</p> <p>5. <b>Thalera</b> Hb. Fimbrialis Sc.</p> <p>6. <b>Jodis</b> Hb. Putata L. Lacteria L.</p> <p>7. <b>Acidalia</b> Tr. Perochraria F.R. Dimidiata Hufn. Virgularia Hb. Straminata Tr. (Hy.) Pallidata Bkh. (Hy.) Bisetata Hufn. Trigeminata Hw. Hy.)</p>	<p>Grüner Birken- spanner</p>	<p>Früher häufiger, jetzt selten.</p>



Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
Humiliata Hufn. (Hy.)		
Holosericata Dup.		
(Hy.)		
Inornata Hw. (Hy.)		
Aversata L.		
ab. Spoliata Stgr.		
Emarginata L.		
Mariginepunctata		
Göze.		
Incanata L. (Hy.)		
Fumata Stph. (Hy.)		
Remutaria Hb.		
Immutata L.		
Strigaria Hb. (Hy.)		
Ornata Sc.		
Decorata Bkh.		
8. <b>Zonsoma</b> Ld.		
Pendularia Cl.		
Orbicularia Hb.		Selten, von mir hier ein-
		mal aus der Raupe ge-
		zogen.
Annulata Schultze.		
Porata F.		
Punctaria L.		
v. Suppunctaria Z.		
Linearia Hb.		
9. <b>Timandra</b> Dup.		
Amata L.		
10. <b>Pellonia</b> Dup.		
Vibicaria Cl.		
11. <b>Rhyparia</b> Hb.		
Melanaria L. (Hy.)		Von Heydenreich erst ein-
		mal als Falter hier ge-
		fangen; ständiges Vor-
		kommen deshalb nicht
		ganz zweifellos.

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
12. <b>Abraxas</b> Leach. Grossulariata L.	Stachelbeerspanner, Harlekin	
Sylvata Sc.		Falter von mir im vorigen Jahre am Lichte gefangen.
Adustata Schiff.		
Marginata L.		
13. <b>Bapta</b> Stph.		
Bimaculta F.		
Temerata Hb.		
14. <b>Cabera</b> Tr.		
Pusaria L.		
Exanthemata Sc.		
15. <b>Numeria</b> Dup.		
Pulveraria L.		
16. <b>Ellopia</b> Tr.		
Prosapiaria L.		
ab Prasinaria		
17. <b>Metrocampa</b> Ltr.		
Margaritaria L.	Hier selten, bei Melle häufiger.	
Honoraria Schiff.		
18. <b>Eugonia</b> Hb.		
Quercinaria Hufn.		
ab. Carpinaria Hb.		
Autumnaria Wern.		
Alniaria L.		
Fuscantaria Hw.		
Erosaria Bkh.		
ab. Quercinaria	Selten, Raupe zweimal in Melle erhalten.	
19. <b>Selenia</b> Hb.		
Bilunaria Esp.		
v. Juliaria Hw.		
Lunaria Schiff.	Ziemlich selten.	

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
<p>Tetralunaria Hufn. v. Aestiva Stgr.</p> <p>20. <b>Pericallia</b> Stph. Syringaria L.</p> <p>21. <b>Odontopera</b> Stph. Bidentata Cl.</p> <p>22. <b>Himera</b> Dup. Pennaria L.</p> <p>23. <b>Crocallis</b> Tr. Elinguaria L.</p> <p>24. <b>Eurymene</b> Dup. Dolabraria L.</p> <p>25. <b>Angerona</b> Dup. Prunaria L. ab. Sordiata Tuessl.</p> <p>26. <b>Urapteryx</b> Leach. Sambucaria L.</p> <p>27. <b>Rumia</b> Dup. Luteolata L.</p> <p>29. <b>Epione</b> Dup. Apiciaria Schiff. Paralellaria Schiff. Advenaria Hb.</p> <p>29. <b>Venilia</b> Dup. Macularia L.</p> <p>30. <b>Macaria</b> Curt. Notata L. Alternaria Hb. Liturata Cl.</p>	Hollunderspanner	

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
31. <b>Hybernia</b> Latr. Rupicaprararia Hb.		Falter oft schon an mil- den Januartagen.
Leucophaearia Schiff. ab. Marmorinaria Esp. ab. Merularia Weymer.		} Desgl oft im Februar.
Aurantiaria Esp. Marginaria Bnh. Defoliaria Cl.		
ab. Obscurata Stgr.		
32. <b>Anisopteryx</b> Stph. Aceraria Schiff. Aescularia Schiff. Pedaria F.		Wie Leucophaearia.
33. <b>Biston</b> Leach. Hispidarius F. Hirtarius Cl. Stratarius Hufn.		
34. <b>Amphidasis</b> Tr. Betularius L. ab. Doubledayaria Mill		
35. <b>Boarmia</b> Tr. Cinctaria Schiff. Gemmaria Brhm. (Hy.) Secundaria Esp. Abietaria Hb. Repandata L. Roboraria Schiff. ab. Infuscata Stgr. Consortaria F.		

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
Angularia Thnb.(Hy.)		
Lichenaria Hufn.		
Crespuscularia Hb.		
Consonaria Hb.		
Luridata Bkh.		
Punctularia Hb.		
36. <b>Pachycnemia</b> Stph.		
Hippocastanaria Hb.		
37. <b>Gnophos</b> Tr.		
Obscuraria Hb. (Hy.)		
38. <b>Fidonia</b> Tr.		
Limbaria F.		
39. <b>Ematurga</b> Ld.		
Atomaria L.		
40. <b>Bupalus</b> Leach.		
Pinarius L.		
41. <b>Halia</b> Dup.		
Wauaria L.		
Brunneata Thnb.		
42. <b>Phasiane</b> Dup.		
Clathrata L.		
43. <b>Aspilates</b> Tr.		
Strigillaria Hb.		
44. <b>Ortholitha</b> Hb.		
Plumbaria F.		
Limitata Sc.		
Bipunctaria Schiff.		
(Hy.)		
45. <b>Anaitis</b> Dnp.		
Plagiata L.		
46. <b>Chesias</b> T.		
Spartiata Fuesl.		
Rufata F.		

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
47. <b>Lobophora</b> Curt. Carpinata Bkh. Halterata Hufn. ab. Zonata Thnb 48. <b>Cheimatobia</b> Stph. Brumata L.	Frostspanner	Sehr schädlich; letzter Falter des Jahres. Männchen im November und noch Anfang Dezember fliegend. Weibchen flügellos.
49. <b>Triphosa</b> Stph. Dubitata L. 50. <b>Eucosmia</b> Stph. Undulata L. 51. <b>Scotosia</b> Stph. Vetulata Schiff. Rhamnata Schiff. Badiata Hb. 52. <b>Lygris</b> Hb. Prunata L. Testata L. Populata L. 53. <b>Cidaria</b> Tr. Dotata L. Fulvata Forst. Ocellata L. Bicolorata Hufn. Variata Schiff. v. Obeliscata Hb. Juniperata L. Siterata Hufn. Truncata Hufn. ab. Perfuscata		

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
<p>Olivata Bkh. (Hy.)  Viridaria F.  Fluctuata L.  Montanata Bkh.  Quadrifasciaria Cl.  Ferrugata Cl.      ab. Spadicearia Cl.  Suffumata Hb.  Pomoeriaria Ev.  Designata Rott.  Dilutata Bkh.  Picata Hb. (Hy)  Cuculata Hufn.  Galiata Hb.  Rivata Hb.  Albicillata L.  Procellata F.  Lugubrata Stgr.  Hastata L.  Affinitata Stph.  Albulata Schiff.  Candidata Schiff.  Decolorata Hb.  Luteata Schiff  Obliterata Hufn.  Bilineata L.  Sordidata F.  Trifasciata Bkh.  Capitata H.S.  Silacea Hb (Hy.)  Corylata Thnb.  Nigrofasciaria Gze.</p>		

Familien, Gattungen und Arten.	Volkstümlicher deutscher Name.	Bemerkungen.
Rubidata F.		Zuerst von mir 1895 als Falter am Licht gefangen.
Comitata L.		
54. <b>Eupithecia</b> Curt.		
Oblonga Thnb.		
Venosata F.		
Pusillata F.		
Abietaria Göze. (Hy.)		
Debiliata Hb.		
Rectangulata L.		
Succenturiata L.		
Subfulvata Hw.		
Nanata Hb. (Hy.)		
Tenuiata Hb.		
Valerianata Hb.		
Satyrata Hb.		
Veratraria H.S. (Hy.)		
Helveticaria B. v.		
Arceuthata Frr.		
(Hy.)		
Castigata Hb.		
Vulgata Hw.		
Albipunctata Hw.		
(Hy.)		
Assimilata Gn.		
Minutata Gn. (Hy.)		
Pimpinellata Hb. (Hy.)		
Indigata Hb.		
Lariciata Frr. (Hy.)		
Abbreviata Stph.		
Lanceata Hb. (Hy.)		
Sobrinata Hb.		
Pumilata Hb.		



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Jammerath Heinrich

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichnis der in der Umgegend von Osnabrück bisher beobachteten Grossschmetterlinge 41-100](#)