

Die Fauna von Württemberg.

Die Käfer.

Von A. von der Trappen, Stuttgart.

(Fortsetzung.)

Metacantharis Bourg.

1. *discoidea* AHR. Ulm (O.-A.). Beuron (PB.). Urlau (M.). Kiflegg. E 6.
a. *liturata* REDT. Beuron (PB.).
2. *haemorrhoidalis* F. Stuttgart. Münchingen. Rotenacker. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Gutenberg. Beuron (PB.). M 5. bis A 7.

Rhagonycha Eschsch.

1. *signata* GERM. R. F. G. III. 260. K. S. 262. Die neueren Sammler haben die Art nicht wieder gefunden.
2. *translucida* KRYN. Stuttgart. Schönbuch. Münchingen. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Mittlere Alb. M 5. bis A 8.
3. *nigriceps* WALTL, Buchau M 7.
4. *lutea* MÜLL. Stuttgart. Schönbuch. Murrhardt. Unt. Remstal. Ulm (O.-A.). A 6. bis M 7.
5. *fulva* SCOP. Im ganzen Gebiet, überall s. g. Erscheint etwas später als die anderen „Schneider“. A 7. bis E 8.
6. *testacea* L. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). Buchau. M 6. bis M 7.
7. *limbata* THOMS. Stuttgart. Cannstatt. Schönbuch. Schurwald. Kniebis. Bopfingen. Geislingen a. St. Gutenberg. M 5. bis M 6.
8. *nigripes* REDT. (C. C. E. 1906: *femoralis* BRULL. v. *nigripes* W. REDT.). Ulm (O.-A.). Die Angabe bei K. S. 262: *barbara* F. bezieht sich wohl auch auf diese Art.
9. *lignosa* MÜLL. Stuttgart. Schönbuch. Münchingen. Rotenacker. Illingen. Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). M 5. bis E 6:
a. *pallipes* F. Ulm (O.-A.).
Schon am 8. 4. entwickelte sich ein Stück bei mir aus einer Fliegenzucht.
10. *elongata* FALL. Schönbuch. Unt. Remstal. Ulm (O.-A.). Teck und Beuron (PB.). A 6. bis A 7.
11. *atra* L. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Bopfingen. Zwiefalten. E 5. bis M 7.

Pygidia Muls.

1. *denticollis* SCHUMM. Auf der Alb beim Randecker Maar. Ulm (O.-A.). E 6.
2. *laeta* F. Giengen a. Brenz (PB.).

Silis Latr.

1. *nitidula* F. Am Uracher Wasserfall (PB.).
2. *ruficollis* F. Aalkistensee (PB.).

Podistra Motsch. (Absidia Muls.)

1. *rufotestacea* LETZN. Murrhardt. Randecker Maar. M und E 6.
2. *pilosa* PAYK. Kniebis, mehrfach. Gutenberg (Dö.). Kißlegg. E 5. bis E 6.

Malthinus Latr.

1. *biguttulus* PAYK. Ulm (O.-A.). Urach (Dö.). A 7.
2. *flaveolus* PAYK. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Buchau. 6. und E 8.

Weitaus die häufigste Art.

3. *seriepunctatus* KIES. Stuttgart. M 7.
4. *fasciatus* OL. Stuttgart. Ulm (O.-A.). E 7.

Malthodes Kies.

1. *marginatus* LATR. Münster a. N. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). 5.
2. *mysticus* KIES. Eberstal (M.).
3. *spretus* KIES. Kniebis, 3 Stück. M 6.
 - a. *affinis* Muls. Kniebis, 1 Stück. M 6.
4. *minimus* L. Stuttgart. Rotenacker. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). M 5. bis A 7.
 - a. *marginicollis* SCHILZKY, Münchingen.
5. *fuscus* WATTL, Rottweil (PB.). Reutlingen, s. (K.).
6. *flavoguttatus* KIES. Stuttgart. A 7.
7. *dispar* GERM. Stuttgart. Murrhardt. Maulbronn (PB.). Ulm (O.-A.). Kißlegg. 6.
8. *maurus* CAST. Münster a. N. Schönbuch. Fildern. Unt. Remstal. Ulm (O.-A.). A 5. bis M 6.
 - a. *misellus* KIES. Stuttgart. Rottweil (PB.). Ulm (O.-A.). Buchau.

Drilidae.**Drilus Ol.**

1. *concolor* AHR. Stuttgart, s. Auf der Alb häufiger: Wanne, Linsenbühl. Großes Lautertal. Reichenbach im Täle (M.). Hohenneuffen (Dö.). E 5. bis E 6. Nur Männchen.
- flavescens* ROSSI. Reichenbach im Täle (M.).

Malachiidae.**Troglops Er.**

1. *albicans* L. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). Reichenbach im Täle (M.). Ulm (O.-A.). M 6.

Colotes Er.

1. *maculatus* CAST. (LAP.). Eberstal (M.).

Hypebaeus Kies.

1. *flavipes* F. Ulm (O.-A.).

Charopus Er.

1. *flavipes* PAYK. Stuttgart. Cannstatt. Schönbuch. Unt. Remstal. Murrhardt. Heilbronn (N. S. Sc.). Illingen. Kniebis. Ulm. Randecker Maar. Gutenberg. Reichenbach im Täle (M.). Buchau. Manchmal s. h. E 5. bis A 8.
2. *pallipes* OL. Gerstetten (Pb.). Ulm (O.-A.).
3. *concolor* F. Eberstal (M.).

Ebaeus Er.

1. *thoracicus* FOURC. (OL.). Stuttgart. Cannstatt. Unt. Remstal. Heilbronn, 1 St. (N. S. Sc.). 6., 7. Ich sammelte die Art in Menge auf *Isatis tinctoria* bei Cannstatt. REITTER gibt in F. G. an: auf Kiefern. Solche sind von der Fundstelle auf mehrere Kilometer Entfernung nicht zu finden.
2. *pedicularis* F. (SCHRANK). Schönbuch (Pb.). Ulm (O.-A.).
3. *flavicornis* ER. Ulm (O.-A.).

Axinotarsus Motsch.

1. *ruficollis* OL. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). M 6. bis A 7.
2. *pulicarius* F. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). 6., A 7., M 8.
3. *marginalis* CAST. (LAP.). Stuttgart. Cannstatt. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Wanne. Randecker Maar. Eberstal (M.). Schussenried. 6., 7., A 8.

Malachus F.

1. *scutellaris* ER. Gegenüber von Münster a. N., im Gewand Heidenschloß und im unteren Remstal am rechtsuferigen Widerlager des Viadukts von Neustadt. An beiden Plätzen jedes Jahr stets nur auf einem sehr kleinen Gebiet vorkommend. In der Nachbarschaft ist kein Stück zu finden. Diese Edelart hat ein ganz anderes Benehmen, als die übrigen Arten der Gattung. Gewöhnlich erscheint sie Ende Mai und verschwindet schon nach wenigen Tagen wieder. Wenn der Frühling warm und trocken ist, kann sie schon Anfang Mai auftreten, um ebenso schnell wieder zu verschwinden. Die Tiere fliegen lebhaft umher und fliegen aus dem Streifsack so schnell ab, wie manche Buprestiden. Ulm (O.-A.).
2. *rubidus* ER. Heilbronn, 1 St. (N. S. Sc.).
3. *aeneus* L. Ulm (O.-A.). Beuron (Pb.). Laubach (M.). Diese Art soll anderwärts gemein sein. Bei uns, wenigstens in der Umgebung von Stuttgart, trifft dies keinesfalls zu, denn die hiesigen Sammler haben sie nie gefunden.
4. *marginellus* OL. Stuttgart. Unt. Remstal. Buoch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). Buchau. Kiblegg. E 5. bis M 8. Ich habe einige schöne Aberrationen mit kupferrotem bis violettrottem, statt grünem, Hsch., von Stuttgart, Rotenacker und vom Burren bei Gingen a. F.
5. *dilaticornis* GERM. Stuttgart, s. 5.

6. *bipustulatus* L. Stuttgart. Cannstatt. Schönbuch. Unt. Remstal. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Bopfingen. Wanne bei Pfullingen. Kißlegg. 5., 6.
 a. *immaculatus* REY ist bei uns weitaus häufiger als die Stf.
7. *viridis* F. Unt. Remstal. Tübingen. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). E 5. A 6. Durchaus n. h.
8. *affinis* MÉN. Laubach (M.). Östliche Art.
9. *spinipennis* GERM. Früher in den Steinbrüchen beim Weißenhof, Stuttgart. Nach deren Zerstörung fand ich die Art lange Jahre nicht mehr. Neuerdings habe ich sie in der Steinhalde bei Cannstatt und auf dem Steppenheideplatz im unteren Remstal wieder aufgefunden. A u. M 6.
10. *elegans* OL. Schon bei K. S. 263 genannt. Cannstatt, auf *Isatis tinctoria* (PB.).
11. *geniculatus* GERM. Stuttgart. Münster a. N. Unt. Remstal. Kornatal (Dö.). Illingen. Geislingen a. St. Wielandstein (Dö.). Eberstal (M.). E 5. bis M 6. und nochmal E 7.

Anthocomus Er.

1. *coccineus* SCHALL. (*rufus* HERBST) Oggelshausen (M.).
2. *bipunctatus* HARR. Stuttgart. Cannstatt. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Urlau (M.). A 5. bis M 6. Im Winter 22 auf 23 fand ich ihn zahlreich in einem neubezogenen Hause überwintert. Ende März erschien er dann in Menge an den Fenstern.
3. *fasciatus* L. Stuttgart. Schönbuch. Unt. Remstal. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Urlau (M.). Kißlegg. E 5. bis M 6.

Dasytidae.

Henicopus Steph.

1. *pilosus* SCOP. Eberstal (M.).

Haplocnemus Steph.

1. *pini* REDT. Heilbronn, n. h. (N. S. Sc.). Schönbuch (Dö.). Reutlingen, s. (K.). E 8.
2. *nigricornis* F. Schönbuch. Schurwald (Dö.). Heilbronn (N. S. Sc.). Illingen. Ulm (O.-A.).

Trichocele Thoms.

1. *floralis* OL. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).

Dasytes Payk.

1. *niger* L. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). A 7.
2. *obscurus* GYLL. Heilbronn (N. S. Sc.). Kniebis. Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). M 6.
3. *coeruleus* DEG. Stuttgart. Schönbuch, h. Lorch. Rotenacker. Illingen. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Zwiefalten. Hohentengen (M.). Kißlegg. M 3. bis E 6.
4. *nigrocyanus* MULS. Kniebis, einmal, M 6.

5. *aerosus* KIES. Münchingen. Heilbronn (N. S. Sc.). M 5.
6. *nigroaeneus* KÜST. Ludwigsburg und Rottweil, REITTER det. (Pb.).
7. *flavipes* OL. Ganz gemeine, überall vertretene Art. M 5. bis E 6.
8. *plumbeus* MÜLL. Wie der vorige. E 5. bis M 8.
9. *subaeneus* SCHÖNH. Stuttgart. Unt. Remstal. Eberstal (M.). Nur sehr eng begrenzt, da aber in Menge vorkommend. E 7.
10. *fuscus* ILL. Stuttgart. Unt. Remstal. Illingen. Ulm (O.-A.). Zwiefalten. Laubach (M.). Buchau. 6., 7.

Psilotrix Redt.

1. *cyaneus* OL. Laubach (M.). Südliche Art, welche aber in Nordwestdeutschland mehrfach festgestellt wurde.

Dolichosoma Steph.

1. *lineare* ROSSI. Schönbuch, im ehemal. Rotwildpark mehrmals und i. A. von mir gefunden. Ulm (O.-A.). E 6. bis A 8.

Danacaea Cast. (Lap.)

1. *pallipes* PANZ. Stuttgart. Cannstatt. Öffingen. Unt. Remstal. Rotenacker. Ulm (O.-A.). Großes Lautertal. Leinstetten (M.). M 4. bis E 7., aber auch i. W.
2. *nigritarsis* KÜST. Stuttgart. Cannstatt. Unt. Remstal. Zahlreich, aber eng begrenzt auf *Isatis tinctoria* und *Echium vulgare*. M 5. bis E 7.

Cleridae.

Tillus Ol.

1. *elongatus* L. Heilbronn, eine schöne Reihe (N. S. Sc.). Reichenbach im Täle (M.). Bei K. heißt es: „Wohl überall selten, an alten Buchen und Weiden herumjagend.“ Um Stuttgart haben wir die Art nie gefunden.
2. *unifasciatus* F. Reichenbach im Täle (M.).

Opilo Latr.

1. *mollis* L. Stuttgart. Ulm (O.-A.). Laubach, Treherz, Hohentengen und Beuren im Allgäu (M.).

Ich zog die Art mehrfach und i. A. aus Weidenkörben, welche mit den Larven von *Gracilia minuta* stark besetzt waren. Die Verpuppung ging in besonderen kurzen Gängen vor sich, die in einer etwas erweiterten Puppenwiege endigten.

2. *domesticus* STURM. Heilbronn (N. S. Sc.). Stuttgart. Ulm (O.-A.). Scheint überall s. E 6. bis M 8.

Thanasimus Latr.

1. *formicarius* L. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). Buchau. M 3., E. 5., M 6. Überall, wo die größeren Borkenkäfer in Menge auftreten. Ich fand einmal ein Stück auf Holzscheitern laufend, welches von 2 Pseudoskorpionen mit den Scheren gepackt war und sich vergeblich bemühte, diesen zu entgehen. Vermutlich wollten die Chelifer ihn von Käfermilben befreien.

Pseudoclerops Duv. (Clerus auct.)

1. *mutillarius* F. Reutlingen (K.).

Allonyx Duv.

1. *quadrifasciatus* SCHALL. Reutlingen (K.).

Trichodes Herbst.

1. *apiarius* L. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). Dürfte nirgends fehlen. E 5. bis M 7.
2. *favarius* ILL. Hohentengen (M.).
3. *alvearius* F. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). M 5. bis M 6. Viel seltener als *apiarius*.

Corynetidae.**Enoplium Latr.**

1. *serraticorne* VILLERS ist nur bei K. S. 264 genannt. Hierauf bezieht sich auch wohl die Angabe bei R. F. G. III. 296, wie überhaupt REITTER die Fauna von KELLER benützt hat, ohne allerdings die Quelle anzugeben.

Corynetes Herbst.

1. *coeruleus* DEG. Heilbronn (N. S. Sc.). Kniebis. Gutenberg. Ulm (O.-A.). E 5. bis M 6.
 - a. *ruficornis* STURM. K. 264: samt den Larven in Leimmagazinen.

Necrobia Ol.

1. *ruficollis* F. Ulm (O.-A.).
2. *violacea* L. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). Ich fand die Art bisher nur i. W.
3. *rufipes* DEG. Heilbronn (N. S. Sc.). Laubach (M.).
 - v. *pilifera* RTT. Heilbronn (N. S. Sc.).

Lymexylidae.**Hylecoetus Latr.**

1. *dermestoides* L. Stuttgart. Schönbuch. Laubach (M.). Eisenbach am schw. Grat. Nördl. S. 2: In Weißtannenstöcken (Schwarzwald), auch an Birke und Schwarzerle. Von PH. mit Erfolg gezogen. Die ♂♂ kamen schon M 4. heraus. Alle vorkommenden Färbungen waren darunter vertreten. M 4. bis M 5. Dann wieder 9. Im Freien findet man nur ♀♀.
2. *flabellicornis* SCHNEIDER ist in R. F. G. III. 299 für Württemberg angeführt, aber dies ist kein Zitat aus KELLER.

Lymexylon F.

1. *navale* L. K. S. 265, aber auch nur zitiert aus dem v. ROSE'schen Verzeichnis vom Jahre 1838. Die Art dürfte aber wohl kaum ausgestorben sein. Neuerdings, im Jahre 1931, fand DÖ. die Art wieder u. z. 7 ♀♀ an faulem eichenem Klafterholz beim Schatten, am ehem. Rotwildpark.

Elateridae.**Adelocera Latr.**

1. *fasciata* L. Reutlingen (K.) in faulem Eichenholz.
2. *quercea* HERBST. Reutlingen (K.).

Lacon Cast. (Brachylacon Motsch.)

1. *murinus* L. Überall u. h., doch sah ich ihn nie i. A. 5., 6.

Drasterius Eschz.

1. *bimaculatus* ROSSI. Laimnau (M.).

Elater L.

1. *cinnabarinus* ESCHZ. Schurwald. Reutlingen, s. (K.). Im Winter in morschen Baumstumpen. Recht selten.
 - a. *dimorphus* RTT. Cannstatt (PB.).
2. *sanguineus* L. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Laimnau (M.). E 4. bis E 5. Im Winter kann man ihn in morschen Baumstumpen, meist Birken in den Puppenwiegen finden. Nicht selten.
3. *pomonae* STEPH. Stuttgart. Schönbuch. Buchau. 6. u. i. W.
4. *sanguinolentus* SCHRANK. Zuffenhausen (PB.). Schönbuch (Dö.). Ulm (O.-A.).
5. *nigroflavus* GOEZE. Cannstatt, Hofen a. N. und Zuffenhausen (PB.). Schönbuch. Alb, s. und Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). 4. u. i. W.
6. *pomorum* HERBST (*ferrugatus* LAC.). Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Reutlingen, s. (K.). Ulm (O.-A.). 11. bis A. 4.
 - a. *ferrugatulus* RTT. ist bei uns fast ausschließlich vorhanden.
7. *elongatulus* F. Stuttgart und Schurwald, s. Feuerbach und Schönbuch (PB.). Rotenacker, an Hasel. Großes Lautertal. Ulm (O.-A.). M 5. bis M 6. u. i. W.
 - a. *balteatulus* REITT. Tübingen A 6.
8. *elegantulus* SCHÖNH. Heilbronn (O.-A.).
9. *balteatus* L. Stuttgart, s. Schönbuch (PB.). Ulm (O.-A.). Kießlegg, s. E 6., M 7.
10. *praeustus* F. Stuttgart und Schönbuch (PB.). Laubach (M.). Buchau, im Banngebiet z. h. M 6.
11. *erythrogonus* MÜLL. Am schwarzen Grat (PB.). A 7.
12. *aethiops* LAC. Reutlingen (K.).
13. *nigrinus* HERBST (PAYK.). Erbach (M.). Eisenbach am schwarzen Grat, s. A 9.
14. *Megerlei* LAC. Heilbronn (O.-A.).

Ich habe den Eindruck, daß die *Elater*-Arten mit Ausnahme von *sanguineus* und *pomorum* in den letzten 20 Jahren sehr viel seltener geworden sind. Die Ursache ist leicht zu sehen: Beseitigung aller anbrüchigen Bäume und Rodung der Stöcke.

Ischnodes Eschz.

1. *sanguinicollis* PANZ. Heilbronn (O.-A.).

Procrærus Rtt.

1. *tibialis* LAC. Heilbronn, eine schöne Reihe (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).

Anchastus Lec.

1. *acuticornis* GERM. Reutlingen, s., am Eichensaft (K.). Ulm (O.-A.).

Hypnoidus Steph.

1. *riparius* F. (*Cryptohypnus* ESCHZ.) Teinach. Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). Eisenbach am schwarzen Grat (PB.). Ich fand ihn nur i. W.
2. *tenuicornis* GERM. Ulm (O.-A.).
3. *quadripustulatus* F. Am Neckar bei Cannstatt und Köngen (Dö.). Murgtal (PB.). Ulm (O.-A.). Im W.
4. *pulchellus* L. Stuttgart, h. beim N-H-W. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). E 4., A 5.
5. *dermestoides* HERBST. Ulm (O.-A.). Federsee (M.).
 - a. *tetragraphus* GERM. Stuttgart. Besigheim. Unt. Remstal. Ulm (O.-A.). KiBlegg. A 9. bis M 5. Bei uns sehr viel häufiger als die Stf.
6. *meridionalis* CAST. (LAP.). Tübingen (PB.). Ulm (O.-A.).

Quasimus Goz.

1. *minutissimus* GERM. Cannstatt (PB.). Ulm (O.-A.). Federsee (M.).

Cardiophorus Eschz.

1. *gramineus* SCOP. Laimnau (M.).
2. *discicollis* HERBST. Reutlingen (K.).
3. *ruficollis* L. Schönbuch (Dö.). Ulm (O.-A.). Laimnau (M.).
4. *rufipes* GOEZE. Zwicfalten. Ulm (O.-A.). A 6.
5. *nigerrimus* ER. Ulm (O.-A.).
6. *asellus* ER. Stuttgart (PB.).
7. *cinereus* HERBST. Ulm (O.-A.).
8. *equiseti* HERBST. Nur bei K. S. 259 genannt.
9. *rubripes* GERM. Ulm (O.-A.).

Alle Arten sind bei uns recht selten.

Melanotus Eschz.

1. *rufipes* HERBST. Stuttgart, auch am Licht. Hall. Einkorn. Wanne bei Pfullingen. Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). E 3. bis E 6.
2. *crassicollis* ER. Reutlingen, einmal (K.). Ulm (O.-A.).
3. *punctolineatus* PELERIN. Stuttgart (PB.). Ulm (O.-A.). Buchau. M 7.
4. *brunnipes* GERM. Stuttgart (PB.). Ulm (O.-A.). Großes Lautertal. Buchau. M 6., M 7.

Limonius Eschz.

1. *pilosus* LESKE. Stuttgart. Cannstatt. Schönbuch. Münchingen. Besigheim. Rotenacker. Unt. Remstal. Ölbronn. Mergentheim. Ursulaberg. Gutenberg. Lochen (PB.). Ulm (O.-A.). Langenargen (M.). E 10. bis M 7.
2. *aeruginosus* OL. Ulm (O.-A.).

3. *minutus* L. Heilbronn (N. S. Sc.). Stuttgart. Cannstatt (Pb.). Ulm (O.-A.). Randecker Maar. Wanne bei Pfullingen. Buchau. E 4. bis E 6.
4. *parvulus* PANZ. Stuttgart. Cannstatt. Schönbuch. Ölbronn. Tübingen (Pb.). Gutenberg. Ulm (O.-A.). Laimnau (M.). Kißlegg. E 4. bis A 7.

Pheletes Kies.

1. *aeneoniger* DEG. Stuttgart. Schönbuch. Illingen. Buoch. Kniebis. Teck. Wanne. Ulm (O.-A.). E 10. bis A 7.
2. *quercus* OL. Stuttgart. Münster a. N. Schurwald.
 - a. *nigricollis* SCHILSKY. Schönbuch. Rotenacker. Unt. Glemstal. Unt. Remstal. Großes Lautertal. Wanne bei Pfullingen. M 5. bis M 6.

Athous Eschz.

1. *rufus* DEG. Teinach, einmal in Fichtenstumpen (K.). Hirsau (Pb.).
2. *hirtus* HERBST. Stuttgart. Münster a. N. (Dö.). Murrhardt. Urach. Laubach (M.). M 6. bis M 7. Kißlegg.
3. *niger* L. Kniebis. Ulm (O.-A.). Tübingen. Kißlegg. Randecker Maar. A 6. bis M 7.
 - a. *scrutator* HERBST. Reutlingen (K.).
4. *vittatus* F. Überall. A 5. bis A 7.
 - a. *inopinatus* BUYSS.
 - a. *filicti* BUYSS.
 Beide Formen ebenfalls überall h.
5. *haemorrhoidalis* F. Ebenfalls überall, mit
 - a. *ruficauda* GYLL. A 5. bis A 7.
6. *subfuscus* MÜLL. Stuttgart. Schönbuch. Tübingen. Kniebis. Wildbader Wildsee. Ulm (O.-A.). Buchau. A 5. bis M 7. Kißlegg.
 - a. *polonicus* RTT. Kniebis.
 - a. *kafkanus* RTT. Schönbuch. Illingen.
7. *bicolor* GOEZE (*longicollis* OL.). Stuttgart. Unt. Glemstal. Ulm (O.-A.). Wanne bei Pfullingen. 6. u. 7.
 - a. *unicolor* MARSH. (FOURC.), manchmal unter der Stf.

Corymbites Latr.

1. *virens* SCHRK. Besonders auf der Alb. Urach (Dö.). Ursulaberg (Pb.). Rosenstein (BUBECK). Hohenstadt (M.). Laimnau (M.). Ulm (O.-A.).
2. *pectinicornis* L. Überall, M 5. bis E 6. Die ♀♀ erscheinen wesentlich später, als die ♂♂.
3. *Heyeri* SAX. Ulm (O.-A.).
4. *cupreus* F. Wildbad (Pb.). Ulm (O.-A.). Laimnau (M.). Ich selbst fand nur:
 - v. *aeruginosus* F. und schwache Übergänge zur Stammform am Kniebis, s. h. Ulm (O.-A.). Oberlenningen und Hohenneuffen (Dö.). M 5. bis M 6.
5. *purpureus* PODA. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Laimnau (M.). Ursulaberg. Ich besitze 1 Stück mit dunklem, braun behaartem Hsch. Sonst wie die Stf. E 5. bis M 7.
6. *castaneus* L. Vaihingen a. F. (3 St. Dö.). Saulgau (M.). An der Alb, s. (K.).
7. *sjaelandicus* MÜLL. (*tessellatus* F.). Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn. Kniebis. Bopfingen. Ulm (O.-A.). Laimnau (M.). Buchau. A 5. bis M 6.
 - a. *assimilis* GYLL. Überall ebenso h., wie die Stf.

8. *impressus* F. Reutlingen (K.).
9. *nigricornis* PANZ. Reutlingen (K.).
10. *aeneus* L. Stuttgart. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). 5. u. i. W. Kiblegg M 7.
 a. *coeruleus* HERBST. Ruhstein (Dö.).
 a. *germanus* L. Hohenneuffen (Dö.).
 Diese Art ist bei uns durchaus nicht h.
11. *latus* F. Schurwald. Fellbach und Eßlingen (Dö.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). 6. Hier haben wir ausnahmsweise eine Art, die im Schurwald vorhanden ist, aber im Schönbuchgebiet bis jetzt fehlt. Sonst ist es meist umgekehrt.
12. *cruciatulus* L. Laimnau (M.).
13. *incanus* GYLL. (ER.). Stuttgart. Schönbuch. Tübingen. Unt. Remstal. Kniebis. Ulm. Glastal. A 5. bis E 7. Manchmal h.
14. *angustulus* KIES. R. F. G. III. 216.
15. *bipustulatus* L. Fildern, am Ramsbach, unter Pappelrinde. Winnenden, in einem Waldgesiebe. Beidemal im ersten Frühjahr. Beuron (PB.). Die Art wurde auch von v. ROSER und von KELLER schon gefunden, ist aber offenbar bei uns recht selten.

Prosternon Latr.

1. *tessellatum* L. (*holosericeum* OL.). Schönbuch. Winnenden. Kniebis. Bopfingen. Treherz (M.). Buchau. A 4. im Gesiebe. Im Freien E 5. bis M 6.

Orithales Kies.

1. *serraticornis* PAYK. Tübingen und Reutlingen, s. (K.).

Hypoganus Kies.

1. *cinctus* PAYK. Schönbuch. Ich fand nur einmal 1 St. (det. Dr. FL.). M 9.

Ludius Latr.

1. *ferrugineus* L. Cannstatter Wasen. Münster a. N. (Dö.) Kornwestheim (PB.). Rotenacker. Heilbronn (O.-A.). Kochendorf (K.). Reutlingen in alten Trauerweiden (K.). Ulm (O.-A.). Zur Heuernte. Mit allen Farbenabänderungen (K.). A 6. bis A 8.

Agriotus Eschz.

1. *aterrimus* PAYK. (L.). Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.).
2. *gallicus* LAC. Stuttgart. Münchingen. Unt. Remstal. Ulm (O.-A.). Beuron (PB.). Burren. M 8.
3. *acuminatus* STEPH. Stuttgart und Rottweil (PB.).
4. *pallidulus* ILL. Stuttgart. Schönbuch (PB.). Illingen. Ulm. Söflingen.
5. *ustulatus* SCHALL. Stuttgart. Unt. Glemstal. Unt. Remstal. Münchingen. Fildern (Dö.). Buoch. Kniebis. Neuffen (Dö.). Wanne. Kiblegg. Laubach (M.). E 5. bis E 7.
 a. *flavicornis* PANZ. u. a. *inustus* BUYSS. h. u. d. Stf.
6. *elongatus* MARSH. (*pilosus* Pz.). Stuttgart. Zuffenhausen (PB.). Schönbuch. Ulm. Beuron (PB.). Laimnau (M.). A bis A 6.

7. *sputator* L. Stuttgart. Schönbuch (PB.). Horb. Bësigheim. Mergentheim. Ulm. Laubach (M.). Buchau. Gemein. A 4. bis A 6. u. i. W.
a. *rufulus* LAC. z. h. u. d. Stf.
8. *lineatus* L. Überall einer der gemeinsten Käfer. Er fehlt auch im Winter in keinem Gesiebe. Im Freien A 4. bis E 7.
9. *obscurus* L. Ebenfalls überall und fast so gemein, wie der vorige. A 4. bis M 6. u. W.

Dolopius Eschz.

1. *marginatus* L. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Buchau. Kißlegg. Laubach (M.). A 4. bis A 7.

Sericus Eschz.

1. *brunneus* L. Schönbuch. Vaihingen a. F. (Dö.). Kniebis. Ulm (O.-A.). Wielandstein (Dö.). Buchau. Kißlegg. A 5. bis E 6. u. i. W.
a. *tibialis* REDT. Calw, 1 St. in einem Gesiebe im Winter.
2. *subaeneus* REDT. Schönbuch, 1 St. det. Dr. FL. Ulm (O.-A.). E 5.

Synaptus Eschz.

1. *filiformis* F. Cannstatt (Dö.). Schönbuch. Ulm. Laimnau (M.). A 6.
Bei uns ist er nicht s. h.

Adrastus Eschz.

1. *limbatus* F. Stuttgart. Ulm (O.-A.). Urach. Reichenbach im Täle. Eisenbach (PB.).
a. *axillaris* ER. ist bei uns weit häufiger, als die Stf. E 6. A 7.
2. *lacertosus* ER. Stuttgart. Schönbuch. Rotenacker. Kißlegg. A 5. bis E 6.
3. *nitidulus* MARSH. Stuttgart. Ulm (O.-A.). Reichenbach im Täle (M.). 5. 6.
a. *pallens* ER. u. d. Stf. Kißlegg M 7.
4. *rachifer* FOURCR. (GEOFFR.). Stuttgart. Schönbuch. Münchingen. Unt. Remstal. Buoch. Schussenried. Buchau. Kißlegg. E 6. bis M 8.
Bei K. findet sich: An Schilf manchmal an der Altlach.
Meine Stücke von Buoch sind sehr groß und stark, so daß sie den Eindruck einer ganz anderen Art machen. Dr. FL. hält sie trotzdem für *rachifer*.
5. *montanus* SCOP. Unt. Remstal, beim Neustadter Bahnviadukt an einem Platz von kaum 20 qm i. A. Schönbuch. Zuffenhausen und Mühlhausen a. N. (PB.). Er tritt nur sehr lokal auf, da er an *Marrubium vulgare* gebunden ist. E 5. u. E 7.

Denticollis Pill.

1. *rubens* PILL. Schönbuch. Obertal (PB.). Ulm (O.-A.). Laimnau und Treherz (M.). E 5.
2. *linearis* L. Stuttgart. Unt. Remstal. Ulm. Bopfingen. Zwiefalten. Buchau. Laimnau (M.). Mit allen möglichen Farbenabänderungen. E 5. bis M 6.

Cerophytidae.**Cerophytum Latr.**

1. *elateroides* LATR. Eberstal (M.).

Eucnemidae.**Melasis Ol.**

1. *buprestoides* L. Von NÖRDLINGER in Schwarzerle gefunden und erzogen. Ohne näheren Fundort. (NÖRDL. S. 1.)

Isorhipis Lac.

1. *melasoides* CAST. (LAP.). Reutlingen (K.). In abständigen Buchen (NÖRDL. S. 1.).

Eucnemis Ahr.

1. *capucina* AHR. Heilbronn (O.-A.). Eberstal (M.).

Dirrhagus Latr.

1. *pygmaeus* F. Reutlingen (K.).
2. *Sahlbergi* MANNH. K. S. 258: Einmal durch Herrn Staatsanwalt STEUDEL bei Tübingen auf Gesträuchen.

Hylochaeres Latr.

1. *testaceus* HERBST (*dubius* PILL.). Heilbronn, 2 St. (N. S. Sc.).

Hypocoelus Lac.

1. *procerulus* MANNH. Heilbronn, 1 St. (N. S. Sc.). Alle Eucnemidae sind bei uns außerordentliche Seltenheiten.

Throscidae.**Throscus Latr. (Trixagus Gyll.).**

1. *dermestoides* L. Stuttgart. Schönbuch. Schurwald. Münster a. N. Heilbronn. Ulm. Treherz (M.). E 4. bis E 5. u. M 8. Nur diese Art ist bei uns h., alle andern sehr s.
2. *carinifrons* BONV. Ulm (O.-A.). Reichenbach im Täle (M.).
3. *obtusus* CURT. Eberstal (M.).
4. *brevicollis* BONV. Heilbronn, 1 St. (N. S. Sc.).

Drapetes Redt.

1. *biguttatus* PILL. Von PH. und mir im Schönbuch ganz vereinzelt gefunden. E 6.

Buprestidae.**Chalcophora Sol.**

1. *mariana* L. K. S. 254: In Föhrenwäldungen. Ich selbst fand einmal auf der Hohen Warte bei Stuttgart einen Föhrendürrständer mit großen, quer-ovalen, aber verlassenen Fluglöchern, die nur von dieser Art herrühren können.

Perotis Spin.

1. *lugubris* F. K. S. 254: Ich sah ein Exemplar aus Mergentheim. Auch REITTER führt die Art, offenbar auf Grund obiger Angabe, in R. F. G. III. S. 181 für Württemberg an. Bestätigung fehlt leider.

Dicerca Eschz.

1. *berolinensis* HERBST. Stuttgart, Feuerbacher Heide, nur einmal (BARTH). K. gibt an: Auf der Alb und bei Bebenhausen, in anbrüchigen Buchen, im Sonnenschein, doch z. s.; ich sah sie schon in Buchenritzen Eier legen.

Poecilonota Eschz.

1. *variolosa* PAYK. K.: Im Burgholz einmal in Espen, nahe der Wurzel, Larven und Käfer; auch in Öhringen.

Lampra Lac.

1. *rutilans* F. In den Alleen in Ludwigsburg viele Lindenbäume mit zahlreichen Fluglöchern dieser Art. Auch bei K.: In Linden n. s.

Buprestis L.

1. *rustica* L. Nach Angabe der Pforzheimer Sammler im Wildseemoor n. s. Laimnau (M.). Schwarzer Grat (PB.), hier auch mit
a. *signaticeps* FLEISCH.
2. *haemorrhoidalis* HERBST, Schwarzer Grat (PB.). Auch bei K. genannt.
3. *novemmaculata* L. Nur bei K. genannt.
4. *octoguttata* L. Stuttgart, flog mehrfach in meiner Wohnung an, etwa 1 km Luftlinie vom Kiefernwald. Spitzberg bei Tübingen, an Weinlaub (PB.).

Melanophila Eschz.

1. *picta* PALL. a. *decastigma* F. K. S. 256: An Wurzelstöcken der Silberpappel.
2. *cyanea* F. Ulm (K.).

Anthaxia Eschz.

1. *millefolii* F. Ulm (O.-A.).
2. *cichorii* OL. Besigheimer Galgenberg, Markgröningen, mehrfach (Dö.). Reutlingen, am St. Georgsberg auf Schafgarbenblüten n. s., oft i. c. (K.).
3. *candens* PANZ. Ulm (O.-A.). Einmal an Kirschbäumen, Reutlingen (K.). Auch bei Kirchheim u. T. (K.).
4. *salicis* F. Stuttgart, Zuffenhausen. Schönbuch. Rotenacker. Eselsburg. Ölbronn. Gern im Frühjahr in den Blüten des Löwenzahns. K. bemerkt: Einmal im Wald an dürrern Reisig n. s. A 5. bis E 6.
5. *fulgurans* SCHRANK. Gerlinger Heide und Glemstal, auf Wacholder. E 5., A 6. s.
6. *nitidula* L. Überall, nur vom Schwarzwald fehlen Angaben. Meist z. h. E 4. bis E 7.
7. *funerula* ILL. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).
8. *morio* F. Stuttgart. Schönbuch. Illingen. Ulm (O.-A.). Überall z. s. E 4. bis A 6.
9. *sepulchralis* F. Eisenbach am schw. Grat (PB.).
10. *nigritula* RATZ. Reutlingen (K.).
11. *quadripunctata* L. Überall h. E 5. bis A 7.
v. *Godeti* CAST. (LAP.). Stuttgart. Schönbuch. A 6. u. E 7. z. s.

Chrysobothris Eschz.

1. *chryso stigma* L. K. S. 256: Auf gefällten Föhrenstämmen.
2. *affinis* F. Im Schönbuch, manchmal z. An Buchen auf der Alb n. s. (K.). E 5., A 6.
3. *Solieri* CAST. (LAP.). Beuron und Schwarzer Grat (PB.). A 8.

Coraeus Cast.

1. *undatus* F. NÖRDL. S. 7: Lebt an vielen Orten Schwabens. Reutlingen: In Eichenrinde (K.).
2. *rubi* L. Reutlingen (K.).

Meliboeus Deyr.

1. *amethystinus* OL. Reutlingen (K.).

Agrilus Curt.

1. *ater* L. (*sexguttatus* BRAHM). Reutlingen (K.).
2. *biguttatus* F. Zuffenhausen und Korntal (PB.). Eselsburg bei Illingen. Ulm (O.-A.) E 6. n. h.
3. *subauratus* GEBL. Reutlingen und Tübingen, je einmal (K.).
4. *convexicollis* REDT. Stuttgart. Schönbuch. Münchingen. Beuron (PB.). 8.
5. *coeruleus* ROSSI. Schönbuch, Guttenberg (Donautal), Eisenbach, Isny (PB.). Ulm (O.-A.). Stetten b. Ulm. Unterstadion (M.). E 7., A 8.
6. *laticornis* ILL. Korntal. Fildern. Buoch. Rottweil (PB.). Heilbronn (N. S. Sc.). E 6.
7. *angustulus* ILL. Stuttgart. Schönbuch. Buoch. Ulm (O.-A.). Giengen a. Brenz (PB.). A 6. bis M 7.
 - a. *rugicollis* RATZ. Heilbronn, s. (N. S. Sc.). Echterdingen (PB.).
8. *sulcicollis* LAC. (*elongatus* HERBST). Schönbuch. Auch von K. als nicht so s. angegeben. E 7.
9. *sinuatus* OL. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). K. schreibt: 1863 auf meinem Speicher an Fenstern n. s., ohne Zweifel aus Eichen- oder Pflaumenrinde.
10. *Roberti* CHEVR. Heilbronn (N. S. Sc.). Ludwigsburg (PB.). Kappelesberg bei Fellbach. Unt. Glemstal. Ulm (O.-A.). Im allgemeinen s., aber einmal fand ich ihn i. A. auf jungen Espenbüschen. M 6.
11. *integerrimus* RATZ. Stuttgart und Giengen a. Brenz (PB.). Kniebis. Ulm (O.-A.).
12. *betuleti* RATZ. Ich fand ihn früher einmal bei Stuttgart im Streifsack.
13. *viridis* L. Stuttgart. Schönbuch. Unt. Glemstal. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). Schussenried. Buchau. Kißlegg. E 5. bis E 6. Ich zog ihn einmal in Menge und allen Farben aus einem Eichenprügel.
14. *chryso deres* AB. Bei Stuttgart von PB. und von mir gefunden. Kißlegg. An beiden Plätzen s. s. E 6., A 7., M 7.
15. *aurichalceus* REDT. Zwiefalten, s. Reutlingen, s. s. (K.). A 6.
16. *hastulifer* RATZ. Giengen a. Brenz (PB.). A 8.
17. *derasofasciatus* LAC. Schönbuch. Beuron und Giengen a. Brenz (PB.). E 7., A 8.

18. *olivicolor* KIES. Zuffenhausen. Münchingen. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). E 6., A 7. u. M 8. z. s.
19. *elatus* F. (*hyperici* CREUTZ). Reutlingen (K.).

Aphanisticus Latr.

1. *emarginatus* OL. Teck. Auch von K. schon auf jungen Eichentrieben gefunden.
2. *pusillus* OL. Buchau, einmal 1 Stück. Laimnau (M.). A 5.

Trachys F.

1. *nana* PAYK. (HERBST). Ulm (O.-A.). Ich fand die Art nur einmal, aber i. A. bei der Gerberhöhle im großen Lautertal auf *Geranium sanguineum*. A 6.
2. *minuta* L. Überall. A 6. bis A 9. Ich fand einige Stücke, welche sich durch schöne dunkelblaue Farbe auszeichnen.
3. *pygmaea* F. Ich siebte 1 Stück am 6. 3. 27 auf dem Besigheimer Galgenberg. Die Art überwintert also als Imago, wie *pumila*. Auch K. führt sie schon an. Sie muß aber s. s. sein.
4. *pumila* ILL. v. *scrobiculata* KIES. Stuttgart. Vaihingen a. E. Mergentheim. An allen 3 Plätzen fand ich die Art nur im winterlichen Hochwassergesiebe.

Die beiden letzten Arten sind die einzigen Buprestiden, von denen mir bekannt ist, daß sie als Imagines überwintern, womit das Liegenbleiben frisch entwickelter Tiere in der Puppenwiege, das auch vorkommen kann, nicht als „Überwinterung“ angesehen ist.

Fossipedes.**Dascillidae.****Dascillus Latr.**

1. *cervinus* L. Auf der Alb wohl überall. Meine Stücke sind vom Randecker Maar und der Wanne. Reichenbach im Täle (M.). Ulm (O.-A.). Buchau. Kißlegg. E 5. bis A 7. Manchmal h.

Eubria Latr.

1. *palustris* GERM. Laubach (M.). Kißlegg, s. E 6.

Helodidae.**Helodes Latr.**

1. *minuta* L. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Zwiefalten. Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). 5. 6.
 - a. *laeta* PANZ. Schönbuch.
2. *marginata* F. Stuttgart. Schönbuch, n. h. Laubach (M.). 5., aber einmal auch schon E 3.
 - a. *nimbata* PANZ. Stuttgart. Schönbuch.

Microcara Thoms.

1. *testacea* L. Heilbronn (N. S. Sc.). Seekirch (M.). Von den Stuttgarter Sammlern hat sie keiner gefunden.

Cyphon Payk.

1. *variabilis* THUNBG. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). Buchau. M 5. bis M 10.
a. *pubescens* F. Aalkistensee. Großes Lautertal.
2. *ochraceus* STEPH. Stuttgart.
3. *padi* L. Heilbronn (N. S. Sc.). Aalkistensee. Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). Buchau. Kißlegg. M 4. bis A 9.
a. *discolor* PANZ. und a. *gratiosus* KOL. h. u. d. Stf.
4. *coarctatus* PAYK. Stuttgart. Ulm (O.-A.). Buchau. 6., 7.
a. *palustris* THOMS. Stuttgart.

Prionocyphon Redt.

1. *serricornis* MÜLL. Heilbronn, s. (N. S. Sc.).

Scirtes Ill.

1. *hemisphaericus* L. Stuttgart. Kirchentellinsfurt (K.). Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). Kißlegg. M 6.

Eucinetidae.**Eucinetus Germ.**

1. *haemorrhous* DUFT. Heilbronn (N. S. Sc.). Stuttgart. Ich fand ihn nur W. mehrfach mit dem Sieb.

Macroductylia.**Dryopidae.****Dryops Ol.**

1. *striatopunctatus* HEER. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
2. *viennensis* CAST. (HEER.). Stuttgart, s. Schönbuch. Kniebis. Heilbronn, s. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). A 4., M 6., M 7.
3. *nitidulus* HEER. Ulm (O.-A.).
4. *Ernesti* GOZ. Stuttgart. Schönbuch. Horb. Teinach. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). Im Winter und im Frühjahr bis E 4. Bei uns weitaus die häufigste Art.
5. *luridus* ER. Teinach. Schussenried. Buchau. Im Herbst und Winter. Etwas weniger h. als *Ernesti*.
6. *auriculatus* GEOFFR. Ulm (O.-A.). Laubach (M.).
7. *lutulentus* ER. Kißlegg, einmal 1 Stück, det. Dr. FL. M 9.

Helichus Er.

1. *substriatus* MÜLL. Seekirch (M.).

Helmis Latr.

1. *Latreillei* BED. Stuttgart. Eberstal (M.).
2. *Maugei* BED. s. *Megerlei* DUFT.
a. *aenea* MÜLL. Ulm (O.-A.). Altshausen. Kißlegg, in steinigen, rasch fließenden Bächen s. h. Eberstal (M.). Herbst.

Esolus Muls.

1. *parallelopipedus* MÜLL. Kiblegg. Laubach (M.). A 9.

Limnius Er.

1. *tuberculatus* MÜLL. Ulm (O.-A.). Kiblegg. A 9.

Riolus Muls.

1. *cupreus* MÜLL. Heilbronn, s. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
2. *subviolaceus* MÜLL. Ich fand ihn vor langen Jahren einmal bei Stuttgart i. A.
3. *nitens* MÜLL. Ulm (O.-A.).

Lathelmis Reitt.

1. *Perrisi* DUF. (*Germari* ER.). Heilbronn, n. h. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
2. *Volkhari* PANZ. Heilbronn (N. S. Sc.). Kiblegg. Laubach (M.). A 9.
3. *Mülleri* ER. Eberstal (M.).

Georyssidae.**Georyssus Latr.**

1. *crenulatus* ROSSI. Stuttgart, einmal 1 Stück am Schattensee. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). A 5.
2. *substriatus* HEER. Ulm (O.-A.).

Heteroceridae.**Heterocerus F.**

1. *flexuosus* STEPH. Schönbuch, am Bärensee, s. E 7.
2. *marginatus* F. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Federsee (M.). 4., A 5., E 7., A 8. u. i. W.
3. *fenestratus* THUNBG. Heilbronn, z. h. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Federsee (M.).
4. *fuscus* KIES. Stuttgart, ziemlich regelmäßig beim Neckarhochwasser i. W. Heilbronn (N. S. Sc.).
5. *hispidulus* KIES. Reutlingen, einmal (K.).
6. *pruinus* KIES. Heilbronn, z. s. (N. S. Sc.).
7. *sericans* KIES. Schönbuch, am Bärensee, i. A. E 7. Ulm (O.-A.).

Brachymera.**Dermestidae.****Dermestes L.**

1. *vulpinus* F. Heilbronn, h. (N. S. Sc.).
2. *Frischi* KUG. Stuttgart. Ulm (O.-A.).

In einer Kiste mit brasilianischem Bienenwachs fand sich in einem der Bretter eine ausgenagte Höhlung, von der aus 21 kurze Gänge, offenbar Puppenwiegen, meist in der Längsrichtung der Fasern, in das Holz gingen. In diesen saßen noch 7 Käfer, welche mir von dem Finder (L.) nebst dem Puppenlager übergeben wurden. M 9.

3. *murinus* L. Heilbronn, n. h. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Leinstetten (M.).
4. *lanarius* L. Stuttgart, einmal i. W.
5. *undulatus* BRAHM. Winnenden, einmal 1 Stück im Moos eines Waldbaums. A 4. Reutlingen, s. (K.).
6. *atomarius* ER. (F.). Reutlingen (K.).
7. *bicolor* F. Stuttgart. M 4. Reutlingen, einmal (K.).
8. *lardarius* L. Überall gemein.

Attagenus Latr.

1. *Schaefferi* HERBST. Leinstetten (M.).
2. *piceus* OL. Heilbronn, h. (N. S. Sc.). Laubach (M.).
3. *pellio* L. Überall gemein.
4. *punctatus* SCOP. Ulm (O.-A.). Laimnau (M.).
5. *trifasciatus* F. Die Angabe Württemberg in R. F. G. III. S. 152 ist wohl ein Zitat aus der Fauna von K. Neuere Angaben fehlen.

Megatoma Herbst.

1. *undata* L. Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). NÖRDL. S. 8. Im Mulm von Insekten-
gängen zu Kirchheim und Hohenheim. Stuttgart, im anbrüchigen Splint
eines Zwetschgenbaumes.

Globicornis Latr.

1. *marginata* PAYK. Heilbronn, n. h. (N. S. Sc.).
2. *nigripes* F. Heilbronn, h. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).

Tragoderma Latr.

1. *versicolor* CREUTZ. Hohentengen (M.).
2. *nigrum* HERBST. Öhringen, s. (K.).

Ctesias Steph.

1. *serra* F. Ulm (O.-A.).

Anthrenus F.

1. *pimpinellae* F. Stuttgart. Cannstatt. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
Laimnau (M.). E 5. A 6., n. h.
2. *festivus* ROSENH. Heilbronn (N. S. Sc.).
3. *scrophulariae* L. Stuttgart. Cannstatt. Obertürkheim. Heilbronn.
Ulm (O.-A.). Laimnau (M.). Auch sonst weit verbreitet und s. h. 5., 6.,
aber auch i. W.
4. *verbasci* L. Überall gemein, und zwar nur
a. *nebulosus* REITT.
5. *museorum* L. Ulm (O.-A.). Laimnau (M.). Ich habe die Stücke nicht
gesehen, vermute aber, daß auch diese zu *verbasci* gehören.
6. *fuscus* OL. Ulm (O.-A.). Laimnau (M.). Buchau. M 7. KiBlegg.

Trinodes Latr.

1. *hirtus* F. Ulm (O.-A.). Reichenbach im Täle und Eberstal (M.). K.: Nicht
s. an faulen Weiden, namentlich in Spinnweben.

Orphilus Motsch.

1. *niger* ROSSI. Hohentengen (M.).

Nosodendridae.**Nosodendron Latr.**

1. *fasciculare* OL. Stuttgart, an einem Baum im Schloßgarten, einmal A. (PB.). Leinstetten (M.).

Byrrhidae.**Pelochares Latr.**

1. *versicolor* WALTZ. Heilbronn, n. h. (N. S. Sc.). Öhringen (K.). Leinstetten (M.).

Limnichus Latr.

1. *pygmaeus* STURM. Ulm (O.-A.). Ich fand ihn einigemal auf der Alb.: Baßgeige und Burren. E 4.

Simplocaria Steph.

1. *semistriata* F. Stuttgart. Cannstatt. Eltingen. Unt. Remstal. Heilbronn (N. S. Sc.). Urlau (M.).

Morychus Er.

1. *aeneus* F. Ulm (O.-A.).

Lamprobyrrhulus Gglb.

1. *nitidus* SCHALL. Am Neckar von Tübingen bis Heilbronn h. gefunden. Ulm (O.-A.). Seckirch und Urlau (M.). E 3. bis A 5.

Cytilus Er.

1. *sericeus* FORST. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Kniebis. Ulm (O.-A.). Buchau. Laubach (M.). Das ganze Jahr.

Byrrhus L.

1. *fasciatus* FORST. Kniebis. Gutenberg. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). E 5., A 6.
2. *arietinus* STEPH. Stuttgart. Kniebis. Buchau. M 6.
3. *pustulatus* FORST. Stuttgart. Schönbuch. Kniebis. Ulm (O.-A.). Geislingen a. St. Laubach (M.). E 5. bis M 6.
4. *pilula* L. Überall. E 3. bis M 8.
5. *glabratus* HEER. Kniebis. Ulm (O.-A.). Leinstetten (M.). E 5. bis M 6.
6. *luniger* GERM. Kniebis. Hirsau. A 6. im Waldmoos, E 5 in Menge auf Wegen laufend.
7. *gigas* F. K. zitiert diese alpine Art aus dem v. ROSENER'schen Verzeichnis. Ihr Vorkommen im „alpinen Winkel“ Württembergs ist wohl möglich. Neuere Angaben fehlen.

Syncalypta Steph.

1. *paleata* ER. Am Neckar und der Rems, n. s. A 9. bis A 5.
2. *setigera* ILL. Stuttgart, im W. s. gesiebt.
3. *spinosa* ROSSI. Heilbronn, z. h. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).

Ostomidae.**Nemosoma Latr.**

1. *elongatum* L. Ich fand die Art um Stuttgart i. W. häufig in Gängen der Borkenkäfer. Cannstatt (PB.). Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.).

Tenebrioides Pill. et Mitt.

1. *mauritanicus* L. Stuttgart, im Mehl (Dö.), in frischen, hier gewachsenen Mandeln (PB.). Tübingen (NÖRDL.). Laubach (M.). An alten Weiden (K.). Bis jetzt nur i. W. gefunden.

Ostoma Laich.

1. *ferruginea* L. Ulm (O.-A.). Urlau (M.). Scheint um Stuttgart zu fehlen. Reutlingen (K.).

Grynocharis Thoms.

1. *oblonga* L. Reutlingen (K.).

Byturidae.**Byturus Latr.**

1. *aestivus* L. (*fumatus* F.). Überall. A 5. bis A 7.
 - a. *bicolor* REITT. Nicht selten unter der Stf.
2. *tomentosus* F. Überall. Noch viel häufiger als der vorige. M 4. bis M 7.
 - a. *ochraceus* SCRIBA (*flavescens* MARSH.), s. h. unter der Stf.

Nitidulidae.**Cateretes Herbst.**

1. *pedicularius* L. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn. Murrhardt. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). Buchau. Schussenried. A 5. bis M 7., oft in unzählbaren Scharen.
2. *bipustulatus* PAYK. Schönbuch (PB.).
3. *rufilabris* LATR. Schönbuch, M 5. (Dö.).

Heterhelus Duv.

1. *scutellaris* HEER. Buchau, zu vielen Tausenden in den Blüten des Traubenholunders, A 5.
2. *solani* HEER. Heilbronn (N. S. Sc.). Rottweil (PB.). Kießlegg, s. Laubach (M.). E 6.

Brachypterus Kug.

1. *glaber* STEPH. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.).
2. *urticae* F. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Gutenberg. Laubach (M.). Buchau. Kießlegg. E 5. bis E 8. Viel häufiger als der vorige, aber keineswegs gemein.

Brachypterolus Grouv. (Heterostomus Duv.).

1. *pulicarius* L. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.).
 - a. *linariae* STEPH. Unt. Remstal, E 7.
2. *villiger* REITT. Buchau, s., M 6. Reutlingen (K.).

Pria Steph.

1. *dulcamarae* SCOP. Stuttgart. Fildern. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). Nicht gerade h. M 7. bis M 8.

Meligethes Steph.

Die Stücke meiner Sammlung sind fast durchweg von Pfarrer HUBENTHAL, BUFLEBEN oder HEYMES, Gotha bestimmt.

1. *hebes* ER. Stuttgart. Schönbuch. Lorch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Gutenberg. Buchau. Eisenbach. M 4. bis A 6. u. A 9.
2. *atratus* OL. (*rufipes* MARSH. GYLL.). Überall g. M 5. bis M 8.
3. *lumbaris* STURM. Fildern. Unt. Remstal. Heilbronn (N. S. Sc.). Hohenneuffen (Pb.). Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). E 4., A 6. Ziemlich s.
4. *Foersteri* REITT. Heilbronn, s. s. (N. S. Sc.).
5. *subrugosus* GYLL. Heilbronn (N. S. Sc.). Reutlingen, s. (K.). Buchau, s. M 6.
6. *corvinus* ER. Heilbronn (N. S. Sc.).
7. *coracinus* STURM. Überall h., das ganze Jahr.
a. *pumilus* ER. und a. *decoloratus* FÖRST. kommen ebenfalls u. d. Stf. vor.
8. *anthracinus* BRIS. Cannstatt, Steinhalde. Hier findet sich diese als Seltenheit geltende Art in ziemlicher Anzahl auf *Isatis tinctoria*. Sonst wurde sie bei uns noch nie gefunden. M 4. bis A 7.
9. *subaeneus* STURM. Stuttgart, M 4.
10. *coeruleovirens* FÖRST. Heilbronn (N. S. Sc.).
11. *aeneus* F. Überall, das ganze Jahr, s. g.
12. *viridescens* F. Ebenso verbreitet und fast ebenso g. wie der vorige.
a. *azureus* HEER habe ich in ausgesprochenen Stücken nur vom Oberland, Buchau und Kißlegg.
13. *serripes* GYLL. Heilbronn (N. S. Sc.).
14. *haemorrhoidalis* FÖRST. Heilbronn (N. S. Sc.).
15. *bidens* BRIS. Auf der Wanne bei Pfullingen, einmal, E 6.
16. *difficilis* HEER. Stuttgart. Illingen. Heilbronn (N. S. Sc.). M 4., A 5. und A 6.
17. *Kunzei* ER. Lorch. Unt. Remstal. M 5., A 6., s.
18. *ochropus* STURM. Heilbronn (N. S. Sc.). Buchau. A 5.
19. *morosus* ER. Stuttgart. Schönbuch. Unt. Remstal. Rotenacker. Heilbronn (N. S. Sc.). M 5. bis A 8. Eine der häufigeren Arten.
20. *brunnicornis* STURM. Stuttgart, n. h. Heilbronn (N. S. Sc.). Schussenried. M 4., M 7.
21. *viduatus* HEER (STURM). Stuttgart. Fildern. Horb. Illingen. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Gutenberg. Buchau. Kißlegg. E 5. bis M 6. M 9. u. i. W., z. h.
22. *pedicularius* GYLL. Stuttgart. Cannstatt. Unt. Remstal. Ulm (O.-A.). M 5. bis A 6.
23. *symphiti* HEER. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). E 7., A 8.
24. *ovatus* STURM. Stuttgart, s. Heilbronn (N. S. Sc.). M 4.
25. *umbrosus* STURM. Unt. Remstal. Heilbronn (N. S. Sc.). Hohenneuffen (Pb.). Leinstetten (M.). Kißlegg. A bis E 6.

26. *maurus* STURM. Stuttgart. Cannstatt. Schönbuch. Fildern. Unt. Glems- und Remstal. Illingen. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Baßgeige. Kißlegg. Überall h. E 3. bis A 9.
27. *picipes* STURM. Um Stuttgart s. Cannstatt. Schönbuch (PB.). Unt. Remstal. Illingen. Mergentheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Gutenberg. A 4. bis E 7. u. i. W.
28. *brachialis* ER. Heilbronn (N. S. Sc.).
29. *flavipes* STURM. Stuttgart. Unt. Remstal. Rotenacker. Heilbronn (N. S. Sc.). Buchau. M 4., A 5., E 7., A 9.
30. *villosus* BRIS. Heilbronn, 2 Stück (N. S. Sc.).
31. *tristis* STURM. Stuttgart, 1 Stück. Heilbronn, s. (N. S. Sc.). M 5.
32. *planiusculus* HEER. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). M 5., A 7., n. h.
33. *assimilis* STURM. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Besigheim. Illingen. A 4. bis A 6.
34. *lepidii* MILL. Stuttgart, s. E 4.
35. *obscurus* ER. Heilbronn (N. S. Sc.). Leinstetten (M.).
36. *distinctus* STURM. Stuttgart, s. E 4.
37. *erythropus* GYLL. Stuttgart. Schönbuch. Unt. Remstal. Illingen. Heilbronn (N. S. Sc.). E 5. bis M 6. u. A 8.
38. *bidentatus* BRIS. Stuttgart, nur 1 Stück. E 5.
39. *egenus* ER. Cannstatt, Steinhalde, 1 Stück. Ulm (O.-A.).
40. *solidus* STURM. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).
41. *brevis* STURM. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.). Unt. Remstal. Gutenberg. E 5., A 6. u. E 7.

Die *Meligethes*-Arten werden von fast allen Sammlern leider vernachlässigt, so daß ich beinahe ausschließlich auf die Scriba-Sammlung und meine eigene angewiesen war.

Carpophilus Steph.

1. *hemipterus* L. Stuttgart. Laubach (M.). Ich finde ihn manchmal an den Fenstern meiner Wohnung. A 6. bis A 8.
a. *quadrisignatus* ER. Stuttgart. Fast alle Stücke gehören zu dieser Form.
2. *sempustulatus* F. Stuttgart, s. Schönbuch (Dö.). Heilbronn, h. (N. S. Sc.). Hohentengen (M.). Unter Baumrinden (K.). M 3.

Nitidula F.

1. *bipunctata* L. Ludwigsburg (PB.). Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.).
2. *flavomaculata* ROSSI. R. F. G. III. S. 35. Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.).
3. *rufipes* L. Stuttgart. Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.). M 5.
4. *carnaria* SCHALL. Laubach (M.).

Omosita Er.

1. *depressa* L. Heilbronn, z. h. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.).
2. *discoidea* F. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). Laubach (M.). A 4. bis M 5. u. i. W.
3. *colon* L. Stuttgart. Besigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Teinach. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). Zur selben Zeit wie *discoidea* und oft miteinander.

Epuraea Er.

1. *limbata* F. (OL.). Stuttgart. Cannstatt (Dö.). Horb. Bietigheim. Besigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). 4., 5. u. i. W. (*Omosiphora* REITT.).
2. *guttata* OL. (*decemguttata* F.). Cannstatt und Schönbuch (PB.). Heilbronn (N. S. Sc.).
3. *fuscicollis* STEPH. Schönbuch (Dö.). Heilbronn 2 Stück (N. S. Sc.).
4. *silacea* HERBST. Ulm (O.-A.).
5. *depressa* ILL. Im ganzen Gebiet überall sehr h., besonders gern im Frühjahr in den Blüten von *Anemone nemorosa*.
a. *bisignata* STURM h. u. d. Stf.
6. *melina* STURM (ER.). Stuttgart. Schönbuch. Besigheim. Unt. Glemstal. Teinach. Ulm (O.-A.). Gutenberg. Baßgeige. Söflingen. A 10. bis E 7.
7. *deleta* STURM (ER.). Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). 4 u. i. W. s.
8. *terminalis* MANNH. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Eisenbach (PB.). A 8. mit
a. *Seidlitzii* SCHILSKY.
9. *binotata* REITT. (*nana* REITT.). Stuttgart, s. s. M 4. bis A 5.
10. *neglecta* HEER. Heilbronn (N. S. Sc.) mit
a. *convergens* REITT.
11. *rufomarginata* STEPH. Cannstatt (PB.). Schurwald. Laubach (M.). E 6.
12. *variegata* HERBST. Stuttgart. Rottweil (PB.). Ulm (O.-A.). 6.
13. *unicolor* OL. (*obsoleta* F.). Stuttgart. Cannstatt und Zuffenhausen (PB.). Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Laubach (M.). Nur vom 6. liegen keine Angaben vor.
14. *excisicollis* REITT. Schönbuch, s. Heilbronn (N. S. Sc.).
15. *longula* ER. Stuttgart. Schönbuch. Zuffenhausen (PB.). Kniebis. Eisenbach. A 5. bis A 9. Einmal i. A. an einer halbwelken Fichte.
16. *distincta* GRIMMER. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).
17. *pygmaea* GYLL. Stuttgart, s. „Schwarzwald“ (N. S. Sc.).
18. *pusilla* ILL. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Reutlingen, einmal (K.). Ulm (O.-A.). E 4., A 5. Einmal i. A. an Kiefernreisig.
19. *thoracica* TOURN. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).
20. *floreana* ER. Stuttgart. Cannstatt (PB.). Schönbuch (Dö.). Seekirch (M.). E 4., A 9. u. i. W. Einmal fand ich sie unter Weidenrinde.
21. *melanocephala* MARSH. Stuttgart (PB.). Münchingen, ein fast ganz schwarzes Stück. Lorch. Teinach. Söflingen b. Ulm. Gutenberg. M 5. bis A. 6., 9. u. i. W.

Ipidia Er.

1. *quadrifasciata* QUENS. Laubach (M.).

Soronia Er.

1. *punctatissima* ILL. Rottweil (PB.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.).
2. *grisea* L. Stuttgart. Schurwald. Horb. Köngen (Dö.). Neuffen (Dö.). Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.). M 3., A 5., A 6., E 8. u. i. W. Kommt auch an den Schmetterlingsköder.

Amphotis Er.

1. *marginata* F. Stuttgart. Zuffenhausen und Rottweil (Pb.). Laubach (M.). I. W.

Cycharmus Kug.

1. *quadripunctatus* HERBST. Schönbuch (Pb.). Sulz, s. s. (K.). Eberstal (M.). Kißlegg, s. A 9. So gemein die nächste Art ist, so selten ist diese. Ich selbst fand nur einmal 2 Stücke.
2. *luteus* F. Überall im Frühjahr und Herbst, oft in ungeheurer Menge.
a. *fungicola* HEER. Ulm (O.-A.). Wohl auch sonst, aber nicht beachtet.

Pocadius Er.

1. *ferrugineus* F. Stuttgart. Schönbuch. Münchingen. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). E 5., M 8., A 10. In Staupilzen manchmal A. Im Freien findet man ihn selten.

Thaliera Er.

1. *fervida* OL. Schönbuch, s. s. Sulz, einmal (K.). Ulm (O.-A.). E 5.

Cryptarcha Shuck.

1. *strigata* F. Stuttgart. Cannstatt und Schönbuch (Pb.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). A 5. e. l. Nicht so selten im Moos an Eichen im ersten Frühjahr (K.).
2. *imperialis* F. Schönbuch (Pb.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.).

Librodor Reitt.

1. *quadriguttatus* F. (OL.). Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Erbach (M.). 4., 5.
a. *decemguttatus* OL. Feuerbachtal (Pb.). Die Art ist lange nicht so h. wie die nächste.
2. *hortensis* FOURCR. (Olivieri BED.). Stuttgart. Schönbuch. Fildern. Münchingen. Bietigheim. Urlau (M.). Im Frühjahr an saftenden Baumstumpfen sehr h. M 8. bis E 5.

Glischrochilus Reitt.

1. *quadripunctatus* L. (*quadripustulatus* L.). Stuttgart, s. Schönbuch (Dö.). Heilbronn (N. S. Sc.). M 3. Hohentengen (M.).

Pityophagus Shuck.

1. *ferrugineus* L. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Gingen a. F. Ulm (O.-A.). Eberhardzell (M.). Buchau. A 5. bis M 7.
2. *laevior* AB. Stuttgart, det. REITT. (Pb.).

Rhizophagidae.**Rhizophagus Herbst.**

1. *depressus* F. Stuttgart und Schönbuch (Dö.). Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.).

2. *ferrugineus* PAYK. Stuttgart. Schönbuch (Dö.). Heilbronn (N. S. Sc.). E 5.
3. *parallelocollis* GYLL. Cannstatt (Dö.). Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Laubach (M.). E 5. A 7.
4. *perforatus* ER. Stuttgart. Cannstatt. Schönbuch (Dö.). Heilbronn (N. S. Sc.). A 5. u. i. W.
5. *picipes* OL. (*politus* HELLW.). Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
6. *parvulus* PAYK. Schönbuch (Dö.). M 5.
7. *bipustulatus* F. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). A 4. bis A 6. Gern an Birke.
8. *dispar* PAYK. Stuttgart. Schönbuch. Degerloch (Dö.). Heilbronn (N. S. Sc.). 5. u. i. W.
9. *nitidulus* F. Schönbuch (Dö.). Heilbronn, n. h. (N. S. Sc.). A 5.
10. *cribratus* GYLL. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). An Eiche.

Cucujidae.

Monotoma Herbst.

1. *quadrifoveolata* AUBÉ. Heilbronn (N. S. Sc.).
2. *conicicollis* AUBÉ. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). Eberstal (M.). E 7. Bei *Formica rufa*.
3. *angusticollis* GYLL. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). E 3. Bei *Formica rufa*.
4. *spinicollis* AUBÉ. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
5. *picipes* HERBST. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). Unter Ameisen, auch im trockenen Mist (K.).
6. *brevicollis* AUBÉ (*quadridentata* THOMS.). Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). A 10.
7. *bicolor* VILLA. Stuttgart, in einem Rattennest. Heilbronn (N. S. Sc.). I. W.
8. *testacea* MOTSCH. Heilbronn (N. S. Sc. als *ferruginea* BRIS.).
9. *longicollis* GYLL. Heilbronn (N. S. Sc.).

Airaphilus Redt.

1. *geminus* KR. a. *ruthenus* SOLSKY. Schönbuch, s. E 10. u. i. W.

Ahasverus Gozis (Cathartus Reiche).

1. *advena* WALTL. Heilbronn, z. h. (N. S. Sc.).

Orizaephilus Gglb.

1. *surinamensis* L. Stuttgart. Obertürkheim (Dö.). Im Haus. M 10.
a. *mercator* FAUR. Stuttgart (PB.).

Silvanus Latr.

1. *bidentatus* F. Reutlingen, einmal unter Buchenrinde.
2. *unidentatus* F. Stuttgart, unter Pappelrinde. Cannstatt (Dö.). Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). M 9.

Uleiota Latr.

1. *planata* L. Stuttgart und Nürtingen (PB.). Ulm (O.-A.). Reinstetten (M.).

Pediacus Shuck.

1. *depressus* HERBST. Heilbronn, in Menge (N. S. Sc.).
2. *dermestoides* F. Reutlingen (K.).

Laemphloeus Cast.

1. *monilis* F. Reutlingen, einmal unter Rinde (K.).
2. *testaceus* F. Heilbronn, h. (N. S. Sc.).
3. *duplicatus* WALT. Heilbronn, s. (N. S. Sc.).
4. *ferrugineus* STEPH. Stuttgart, einmal im Haus. Schurwald (PB.). Heilbronn, s. (N. S. Sc.).
5. *clematidis* ER. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). Im Winter oft i. A. als Räuber in den Gängen des *Xylocleptes bispinus*.

Prostomis Latr.

1. *mandibularis* F. Hürbel (M.).

Erotilidae.**Tritoma F.**

1. *bipustulata* F. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). E 4., M 5., A 8.
 - a. *incerta* ROSSI (*binotata* REITT.). Stuttgart. Fildern.
 - a. *dimidiata* REDT. Rottweil (PB.).

Triplax Herbst.

1. *russica* L. Im unteren Körschtal, Fildern. E 5.

Dacne Latr.

1. *rufifrons* F. Cannstatt (PB.).
2. *bipustulata* THUNBG. Schönbuch und Korntal, s. A 7., E 10.

Combocerus Bed.

1. *glaber* SCHALL. Heilbronn, s. s. (N. S. Sc.). Vaihingen a. Enz, einmal 1 Stück beim H.-W. i. W.

Diphyllus Steph.

1. *lunatus* F. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).

Cryptophagidae.**Telmatophilus Heer.**

1. *sparгани* AHR. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).
2. *caricis* OL. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Bietigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). M 5., 7. u. i. W.
3. *typhae* FALL. Stuttgart, s. A 3.
4. *Schönherri* GYLL. Stuttgart. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.). A 5.

Paramecosoma Curt.

1. *melanocephalum* HERBST. Am Neckar von Horb bis Heilbronn. Ein typisches und häufiges Tier bei den winterlichen Hochwassern des Neckars. Doch fand ich die Art auch auf Steppenheideplätzen, z. B. Besigheimer Galgenberg und Baßgeige. Ulm (O.-A.). I. W. und im Frühjahr bis A 5.

Henoticus Thoms.

1. *serratus* GYLL. Schönbuch, 1 Stück (Dö.). Auch schon bei K. genannt. E 5.

Pteryngium Reitt.

1. *crenatum* F. (GYLL.). Stuttgart (PH.).

Micrambe Thoms.

1. *vini* PANZ. Stuttgart (Dö.). Schönbuch. Ulm (O.-A.). Reichenbach im Täle (M.). Kießlegg. 9., 10. u. i. W.
2. *abietis* PAYK. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Buchau. Kießlegg. A 9. bis M 5.
3. *bimaculata* PANZ. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).

Cryptophagus Herbst.

1. *pubescens* STURM. Stuttgart, i. W. Heilbronn (N. S. Sc.).
2. *subdepressus* GYLL. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.).
3. *scanicus* L. Überall, h., das ganze Jahr zu finden. Ab und zu kommt auch *a. patruelis* u. d. Stf. vor. Die Art gehört zur Kellerfauna, ist aber auch im Freien h.
4. *hirtulus* KR. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.).
5. *Thomsoni* REITT. Stuttgart und Schönbuch, s. Heilbronn, s. (N. S. Sc.). E 6. u. i. W.
6. *saginatulus* STURM. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Baßgeige. Reichenbach im Täle (M.). E 3.
7. *subfumatus* KR. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). Die Art flog in einem Jahr an mehreren warmen Maiabenden bei mir zahlreich am Licht an. Auch im Keller. E 4. bis M 5.
8. *dentatus* HERBST. Stuttgart, im Keller, am Mostfaß und an Äpfeln. Heilbronn, h. (N. S. Sc.). Laubach (M.). M 4. bis E 5.
9. *pallidus* STURM. Stuttgart, im Keller (PB.). Heilbronn, h. (N. S. Sc.).
10. *labilis* ER. Heilbronn (N. S. Sc.).
11. *scutellatus* NEWM. Stuttgart. Unt. Remstal. Heilbronn (N. S. Sc.). A 3., A 9.
12. *umbratus* ER. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).
13. *distinguendus* STURM. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). I. W.
14. *fumatus* MARSH. Heilbronn (N. S. Sc.).
15. *quercinus* KR. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).
16. *fuscicornis* STURM. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.).
17. *badius* STURM. Heilbronn, s. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
18. *acutangulus* GYLL. Heilbronn (N. S. Sc.). Urlau (M.).
19. *cellaris* SCOP. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Ehingen (M.).

20. *Skalitzkyi* REITT. Stuttgart und Horb, s., i. W. und M 3.
21. *Milleri* REITT. Stuttgart, im Keller, s. Heilbronn, s. (N. S. Sc.). E 4.
22. *pilosus* GYLL. Stuttgart, i. W. manchmal im Waldgesiebe. Heilbronn (N. S. Sc.).
23. *punctipennis* BRIS. Stuttgart, einmal i. M. in einem Rattennest, sonst s. E 6. u. i. W. (det. HUB.).
24. *lycoepardi* HERBST. Stuttgart, s. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). M 6.
25. *setulosus* STURM. Heilbronn (N. S. Sc.). Laubach (M.).
26. *Schmidti* STURM. Stuttgart, n. h. i. W. Heilbronn (N. S. Sc.).
27. *croaticus* REITT. Stuttgart, s. s. (det. HUB.). Heilbronn (O.-A.).

Emphilus Er.

1. *glaber* GYLL. Stuttgart, einmal 2 Stück bei *Formica rufa*.

Antherophagus Latr.

1. *nigricornis* F. Stuttgart. Fildern. Blaubeurener Alb. Kißlegg. E 6., A 7., A 9.
2. *silaceus* HERBST. Ulm (O.-A.).
3. *pallens* F. Stuttgart. Schönbuch. Murrhardt. Kniebis (Dö.). Geislingen a. St. Gutenberg. Riedlingen. E 5. bis A 7. u. M 8. Kißlegg.

Atomaria Steph.

1. *munda* ER. Stuttgart, einmal i. A. in einem Rattennest, i. W. Heilbronn (N. S. Sc.).
2. *scutellaris* MOTSCH. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.).
3. *mesomelaena* HERBST. Stuttgart. Öffingen. Köngen (Dö.). Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). M 3., E 4. u. W.
4. *gutta* STEPH. Heilbronn (N. S. Sc.).
5. *atra* HERBST. Laubach (M.).
6. *gravidula* ER. Cannstatt (Dö.). Ulm (O.-A.).
7. *nitidula* HEER (ER.). Heilbronn, nur 2 Stück (N. S. Sc.).
8. *fuscata* SCHÖNH. Am Neckar von Horb bis Heilbronn. Münchingen. Mergentheim. Ulm (O.-A.). Wiblingen bei Ulm. Buchau. Kißlegg. Attenweiler (M.). E 8. bis E 6. Art der Flußauen.
9. *atricapilla* STEPH. Stuttgart. Fildern. Münchingen. Unt. Remstal. Bösigheimer Galgenberg. Rotenacker. E 9. bis M 7. Art der Steppenheide.
10. *Zetterstedti* ZETT. Reichenbach im Täle (M.).
11. *fuscipes* GYLL. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
12. *pusilla* PAYK. Stuttgart. Cannstatt (Dö.). Fildern. Schönbuch. Köngen. Unt. Remstal. Rotenacker. Heilbronn (N. S. Sc.). Baßgeige. A 3. bis A 7. Verbreitet, aber nicht häufig.
13. *nigripennis* PAYK. Reutlingen (K.).
14. *morio* KOL. Stuttgart, i. W.
15. *turgida* ER. Stuttgart. Münchingen. Heilbronn, h. (N. S. Sc.). Laubach (M.). M 3., E 9.
16. *apicalis* ER. Die Art hat die gleiche Verbreitung wie *pusilla*. M 9. bis A 7. Ulm (O.-A.).

17. *ruficornis* MARSH. Stuttgart. Heilbronn, z. h. (N. S. Sc.). Buchau. Kiblegg. M 3., A 5., M 7., A 9.
18. *analís* ER. Stuttgart. Unt. Remstal. Horb. Bietigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Teinach. Burren. Reichenbach im Täle (M.). M 4., E 5. bis E 6., M 8., A 9. u. i. W.
19. *cognata* ER. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.). Rottweil (Pb.).
20. *gibbula* ER. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Baßgeige. 3., M 5., A 7., A 10.
21. *umbrina* GYLL. Cannstatt (Dö.). Schönbuch. Rotenacker. Baßgeige (Dö.). Heilbronn (N. S. Sc.). E 3., M 5., M 10.
22. *nigriventris* STEPH. Im Neckartal von Köngen bis Heilbronn. Fildern. Unt. Remstal. Rotenacker. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). Das ganze Jahr. Weit verbreitet, aber nie zahlreich.
23. *linearis* STEPH. Stuttgart. Fildern. Rotenacker. Heilbronn (N. S. Sc.). Mergentheim. Teinach. Reichenbach im Täle (M.). A 5. bis M 7., A 9. u. i. W. Tritt manchmal in ziemlicher Anzahl auf.
24. *alpina* HEER. Einmal 1 Stück im Schönbuch E 5. Die sehr ähnliche *linearis* fehlt bis jetzt vom Schönbuch.
25. *procerula* ER. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.).
26. *prolixa* ER. Heilbronn, s. s. (N. S. Sc.).
27. *fuscicollis* MANNH. Stuttgart. Cannstatt (Dö.). Schönbuch. Heilbronn, h. (N. S. Sc.). E 4. bis E 5.
28. *fiometarii* HERBST. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm. A 6., A 8.

Ootypus Ggbl.

1. *globosus* WALT. Heilbronn (N. S. Sc.).

Ephistemus Steph.

1. *exiguus* ER. Kiblegg, A 9.
2. *globulus* PAYK. Stuttgart. Cannstatt (Dö.). Schönbuch. Münchingen. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). A 7., M 9., A 10. u. i. W. Ich fand die Art auch einmal in einem Rattennest.

Phalacridae.

Phalacrus Payk.

1. *coruscus* PANZ. (*fiometarius* PAYK.). Stuttgart. Unt. Glemstal. Besigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Rottweil (Pb.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). A 4. bis M 6., mit
a. *Humberti* RYE.
2. *grossus* ER. Auf dem Burren (Alb) einmal 2 Stück, M 8.
3. *substriatus* GYLL. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).
4. *caricis* STURM. Stuttgart, A 5.

Olibrus Er.

1. *aeneus* F. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Einkorn. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). M 4., A 5. u. i. W.
2. *Baudueri* FLACH. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.).

3. *millefolii* PAYK. Horb. Unt. Remstal. Mergentheim. Heilbronn, nur 1 Stück (N. S. Sc.). Gutenberg. Eberstal (M.). E 5., A 6. u. i. W.
4. *corticalis* PANZ. Stuttgart. Cannstatt. Buoch. Heilbronn (N. S. Sc.). Rottweil (PB.). Laubach (M.). M 5. bis E 6.
5. *pygmaeus* STURM. Nur bei K. S. 244 genannt.
6. *affinis* STURM. Stuttgart. Cannstatt. Heilbronn (N. S. Sc.). Tübingen (PB.). Ulm (O.-A.). M 4. bis A 7.
7. *liquidus* ER. Cannstatt, 1 Stück, det. Dr. FL. Heilbronn, s. (N. S. Sc.). Eberstal (M.). E 5.
8. *bicolor* F. Stuttgart. Schönbuch. Münchingen. Unt. Glemstal. Besigheim. Heilbronn. Mergentheim. Tübingen (PB.). Ulm. Eberstal (M.). Kießlegg. A 4. bis A 9. u. i. W. Die gewöhnliche Art.
9. *bimaculatus* KÜST. Mergentheim, beim Hochwasser der Tauber, i. W.

Stilbus Seidl.

1. *testaceus* PANZ. Im ganzen Unterland und auf der Alb sehr gemein. Ulm (O.-A.). Eberstal und Laubach (M.). M 8. bis A 6.
2. *atomarius* L. Vom ganzen Neckartal h. gemeldet. Mergentheim. Baßgeige. Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). 3., 4., M 8. u. i. W. Ebenfalls h.
3. *oblongus* ER. Stuttgart. Köngen. Unt. Remstal. Mergentheim. Buchau. Heilbronn, n. h. (N. S. Sc.). 3., A 4. u. i. W.

Lathridiidae.

Dasycerus Brongn.

1. *sulcatus* BRONGN. Stuttgart. Schönbuch. Unt. Remstal. Reutlingen (K.). Baßgeige. Reichenbach im Täle (M.). Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). M 10. bis A 4. u. M 6. Manchmal h. im Waldgesiebe, doch fand ich ihn auch einigemal unter der Steppenheide-Gemeinschaft.

Lathridius Herbst.

1. *lardarius* DEG. Cannstatt (Dö.). Unt. Remstal. Teinach. Buchau. Laubach (M.). A 5. u. i. W.
2. *angusticollis* GYLL. Stuttgart (PB.). Cannstatt und Schönbuch (Dö.). Unt. Remstal. Reichenbach im Täle und Unterstadion (M.). A 6.
3. *Pandellei* BRIS. Heilbronn, h. (N. S. Sc.).
4. *alternans* MANNH. Ulm (O.-A.).
5. *nodifer* WESTW. Stuttgart. Schönbuch. Baßgeige. Treherz (M.). 3., A 5., A 7., E 9. u. i. W. Manchmal h.
6. *constrictus* GYLL. Stuttgart, s. Schönbuch (Dö.). Reutlingen (K.). A 4. u. i. W.

Enicmus Thoms.

1. *minutus* L. Stuttgart. Schönbuch. Gutenberg. Ulm (O.-A.). Treherz (M.). A 6., A 7. u. i. W., h. Auch im Rattennest.
v. *anthracinus* MANNH. Stuttgart.
2. *transversus* OL. Überall h., das ganze Jahr.
a. *alutaceus* REITT. h. u. d. Stf.
3. *rugosus* HERBST. Stuttgart.

Cartodere Thoms.

1. *elongata* CURT. Eltinger Kammerforst. E 3.
2. *ruficollis* MARSH. Reichenbach im Täle (M.).
3. *filiiformis* GYLL. Stuttgart, im Haus (Pb.).

Corticaria Marsh.

1. *pubescens* GYLL. Cannstatt (Dö.). Horb. Teinach. Seekirch (M.). I. W.
v. *piligera* MANNH. Ulm (O.-A.).
2. *fulva* COM. Stuttgart, s. Cannstatt (Dö.). Reichenbach im Täle (M.).
Buchau. A 5.
3. *umbilicata* BECK. Schönbuch. Besigheimer Galgenberg und Einkorn,
je 1 Stück, alle von Dr. FL. det. E 3., M 9. u. i. W.
4. *longicornis* HERBST. Ulm (O.-A.).
5. *impressa* OL. Stuttgart. Cannstatt und Schönbuch (Dö.). Münster a. N.
Horb. Heilbronn (N. S. Sc.). Mergentheim. 4. u. i. W.
6. *saginata* MANNH. Heilbronn, nur ganz wenige Stücke (N. S. Sc.).
7. *serrata* PAYK. Stuttgart. Cannstatt und Schönbuch (Dö.). Heilbronn, h.
(N. S. Sc.).
8. *obscura* BRIS. Stuttgart. Ich zog sie vor langen Jahren einmal i. M. aus
abgeblühten Wollblumenstengeln, in deren Mark die Larven Gänge machten.
Die Art ist aber selten, denn im Freien fand ich sie nur einmal auf der Wanne
bei Pfullingen. E 6.
9. *foveola* BECK. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).
10. *linearis* PAYK. An der Baßgeige im Winterlager. E 3. gesiebt.
11. *longicollis* LETT. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).
12. *elongata* GYLL. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Unt. Remstal. Bietig-
heim. Besigheim. Reichenbach im Täle (M.). Baßgeige. Kiblegg. Das
ganze Jahr s. h. Einmal fand sie sich einige Zeit i. A. in meiner Wohnung.
13. *ferruginea* MARSH. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).

Auch die Arten dieser Gattung werden von den Sammlern leider kaum beachtet.

Corticarina Reitt.

1. *gibbosa* HERBST. Stuttgart. Fildern. Unt. Remstal. Rotenacker. Illingen.
Einkorn. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Reichenbach im Täle (M.).
Buchau. A 3. bis M 7. u. i. W.
2. *similata* GYLL. Stuttgart. Schönbuch. Bietigheim. Heilbronn (N. S. Sc.).
E 3. bis A 5. u. i. W.
3. *fuscula* GYLL. Stuttgart. Schönbuch. Besigheim. Rotenacker. Einkorn.
Heilbronn (N. S. Sc.). Mergentheim. Reichenbach im Täle (M.). A 9. bis
A 5.
4. *truncatella* MANNH. Stuttgart. Besigheim. Unterstadion (M.). Buchau.
Kiblegg. A 9. bis A 5.

Melanophthalma Motsch.

1. *transversalis* GYLL. Stuttgart. Schönbuch. Unt. Remstal. Mergentheim.
Ulm. Söflingen. Gemein. A 9. bis M 5.
a. *sericea* MANNH. e. u. d. Stf.

2. *distinguenda* COM. Stuttgart. Schönbuch. Bietigheim. Mergentheim. Baßgeige. Ulm (O.-A.). A 7., A 10. u. i. W. Sehr viel seltener als die vorige.
3. *fuscipennis* MANNH. Bisher nur 1 Stück vom Besigheimer Galgenberg, det. Dr. FL. M 4.

Mycetophagidae.

Triphyllus Latr.

1. *bicolor* F. Schönbuch (Dö.). Rottweil (Pb.). Urlau (M.).

Litargus Er.

1. *connexus* GEOFFR. Stuttgart und Ludwigsburg (Pb. u. Ph.). Ulm (O.-A.). A 3.

Mycetophagus Hellw.

1. *quadripustulatus* L. Cannstatt (Pb.). Heilbronn (N. S. Sc.). Eberstal (M.). A 7.
2. *piceus* F. Schönbuch, i. A. (Dö.). Heilbronn i. M. (N. S. Sc.). Erbach (M.).
3. *decempunctatus* F. Heilbronn, nur 3 Stück (N. S. Sc.). Auch K. bezeichnet ihn, ohne nähere Fundortangabe, als s. s.
4. *atomarius* F. Schönbuch. Heilbronn i. M. (N. S. Sc.). Rottweil (Pb.). Laubach (M.). E 7.
5. *quadriguttatus* MÜLL. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.). Reutlingen, einmal (K.).
6. *multipunctatus* F. Heilbronn, i. M. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
7. *populi* F. Cannstatt. Heilbronn i. M. (N. S. Sc.). Reutlingen und Öhringen (K.). Ulm (O.-A.).

Typhaea Curt.

1. *stercorea* L. Stuttgart. Ulm (O.-A.). Laimnau (M.). Buchau. Kießlegg. Eisenbach. E 6. bis E 8.

Colydiidae.

Aglenus Er.

1. *brunneus* GYLL. Laubach (M.).

Pycnomerus Er.

1. *terebrans* OL. Reutlingen (K.).

Orthocerus Latr.

1. *clavicornis* L. Reutlingen, einmal unter einem Stein (K.). Friedberg (M.).

Diodesma Latr.

1. *subterranea* GUÉR. (DUP.). Einmal im Dürrbachtal bei Stuttgart gesiebt.

Langelandia Aubé.

1. *anophthalma* AUBÉ. Heilbronn (O.-A.).

Synchita Hellw.

1. *humeralis* F. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [88](#)

Autor(en)/Author(s): Trappen Arthur von der

Artikel/Article: [Die Fauna von Württemberg. Die Käfer 143-174](#)