

Beitrag zur Kenntnis der palaearktischen Staphyliniden.

Von Dr. Edoardo Gridelli. Trieste.

Dinarda dentata subsp. Ravasinii nov.

Kopf und Halsschild schwarz, seitlich breit rotbraun gefärbt. Flügeldecken rotbraun, Abdomen glänzend schwarz mit rotbrauner Spitze, Fühler dunkelbraun, an der Basis und Spitze heller, Beine und Mundteile rotbraun.

Mit *pygmaea* Wasm. wegen der kleinen Körperform, des schmalen Halsschildes, welcher schmaler ist als die Flügeldecken, und wegen der rauhkörnigen Punktierung verwandt, aber durch folgende Merkmale sofort zu unterscheiden:

Der Vorderkörper ist viel düsterer gefärbt und viel matter, die Punktierung desselben und besonders der Flügeldecken ist viel dichter, gröber und stärker rauhkörnig, der Halsschild ist etwas länger und deswegen weniger quer, an den Seiten viel weniger eingedrückt; infolge der viel weniger tiefen, beiderseitigen Ausbuchtung des Basalrandes sind die Hinterecken fast rechtwinkelig und kaum zurückgezogen, der Apikalrand der Flügeldecken ist an den Seiten stärker ausgebuchtet, die vorletzten Fühlerglieder etwas weniger quer.

Von allen anderen *Dinarda*-Formen durch die geringe Größe, die Punktierung des Körpers und die Form des Halsschildes hinreichend verschieden.

Länge: 2,5—3 mm. Von Dr. Carlo Ravasini bei Berje (Triester Karst) in drei vollkommen übereinstimmenden Exemplaren im April 1921 aus einem Nest von *Formica sanguinea* und *gagates* erbeutet und ihm freundschaftlich gewidmet.

Zyras fulgidus var. maculipennis nov.

Äußere Basalecken der Flügeldecken wie bei *Haworthi* und *Kawalli* mit einer dreieckigen schwarzen Makel. In allen sonstigen Merkmalen mit *fulgidus* übereinstimmend. Kaukasus, Gotschi, Mai 1900. Von Herrn Ingenieur Neumann aus Graz erhalten.

Schatzmayria Gridelli (Kol. Rundsch. 1914 p. 69) = *Scimbalium* Er. **Subgen. *Schatzmayria*** Grid.

Schatzm. meridionalis Grid. (l. c. p. 70) = *Scimb.* (Subgen. *Schatzmayria*) *testaceum* Er.; *Schatzm. tergestina* Grid. (l. c. p. 71) = *Scimb.* (Subgen. *Schatzmayria*) *pubipenne* Fairm.

Nach brieflicher Mitteilung Herrn Dodero in Genua haben auch *Scimb. pallidum* Reitt., *hypogaeum* Peyerimh. und *subterraneum* Raffray einfache Vordertarsen und deswegen wären sie unter Subgen. *Schatzmayria* zu stellen, was wahrscheinlich von vielen anderen *Scimbalium*-Arten der Fall sein wird. Leider kann ich wegen Mangel an Material dies nicht feststellen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [9_1921](#)

Autor(en)/Author(s): Gridelli Edoardo

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntnis der palaearktischen Staphyliniden.
87](#)