

Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der Kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg.

Von J. Bauer, Wien.

(Fortsetzung.)

381. *Emmelia trabealis* Sc. im ganzen Gebiete häufig.
382. *Scoliopteryx libatrix* L. im ganzen Gebiete ziemlich häufig.
383. *Calpe capucina* Esp. Thebner Kogel, Gernsberg und bei Modern vereinzelt.
384. *Telesilla amethystina* Hb. Braunsberg, Hundsheimberg, Rohrbach, Bösing, St. Georgen vereinzelt.
385. *Abrostola triplasia* L. im ganzen Gebiete stellenweise häufig.
386. *Abrostola tripartita* Hufn. im ganzen Gebiete nicht häufig.
387. *Plusia deaurata* Esp. Braunsberg bei Hainburg nur 2 Exemplare.
388. *Plusia moneta* F. Wetterling und Ahornberg vereinzelt.
389. *Plusia cheiranthi* Tausch. Rachsthurn und Ahornberg vereinzelt.
390. *Plusia modesta* Hb. bei Bösing und St. Georgen nicht häufig.
391. *Plusia consona* F. Gernsberg bei Preßburg wenige Stücke.
392. *Plusia chrysitis* L. im ganzen Gebiete stellenweise häufig.
393. *Plusia chryson* Esp. bei Rohrbach und Bösing vereinzelt.
394. *Plusia bractea* F. Galgenberg bei Theben und Rohrbach vereinzelt.
395. *Plusia festucae* L. Thebner Kogel ziemlich häufig.
396. *Plusia gutta* Gn. bei Bösing und St. Georgen nicht häufig.
397. *Plusia pulchrina* Hw. bei Theben, Rohrbach, Szeleskut, Modern nicht häufig.
398. *Plusia jota* L. im ganzen Gebiete nicht häufig.
399. *Plusia gamma* L. im ganzen Gebiete stellenweise sehr häufig.
400. *Plusia ni* Hb. Braunsberg und Hundsheimberg je ein Exemplar.
401. *Plusia ain* Hochenw. Rachsthurn und Wetterling vereinzelt.
402. *Euclidia mi* Cl. im ganzen Gebiete, jedoch nicht häufig.

403. *Euclidia glyphica* L. wie vorige, etwas häufiger.
404. *Euclidia triquetra* F. Braunsberg und Thebner Kogel vereinzelt.
405. *Grammodes algira* L. Ahornberg nur ein Exemplar.
406. *Pseudophia lunaris* Schiff. bei Modern und St. Georgen vereinzelt.
407. *Aedia funesta* Esp. Thebner Kogel, Galgenberg bei Theben und bei Bösing vereinzelt.
408. *Catocala fraxini* L. bei Bösing und St. Georgen vereinzelt
409. *Catocala electa* Bkh. bei Preßburg, Theben, Hainburg, Modern, Bösing nicht häufig.
410. *Catocala elocata* Esp. im ganzen Gebiete nicht häufig.
411. *Catocala nupta* L. im ganzen Gebiete ziemlich häufig.
412. *Catocala dilecta* Hb. Rohrbach und Szeleskut vereinzelt.
413. *Catocala sponsa* L. im ganzen Gebiete nicht häufig.
414. *Catocala promissa* Esp. wie vorige, etwas häufiger.
415. *Catocala fulminea* Scop. im ganzen Gebiete nur vereinzelt.
416. *Catocala nymphagoga* Esp. Braunsberg und Thebner Kogel vereinzelt.
417. *Eccrita ludicra* Hb. Thebner Kogel, bei Preßburg und Bösing vereinzelt.
418. *Toxocampa lusoria* L. bei Modern, Bösing und St. Georgen vereinzelt.
419. *Toxocampa craccae* F. Hundsheimberg bei Hainburg vereinzelt.
420. *Laspeyria flexula* Schiff. Pfaffenberg bei Hainburg nicht häufig.
421. *Parascotia fuliginaria* L. bei Szeleskut an den Wänden einer aufgelassenen Köhlerhütte häufig.
422. *Simplicia rectalis* Ev. bei Preßburg, Bösing und St. Georgen vereinzelt.
423. *Zanclognatha tarsipennalis* Tr. Szeleskut und Modern nicht häufig.
424. *Zanclognatha tarsicrinalis* Knoch. bei Rohrbach und St. Georgen vereinzelt.
425. *Madopa salicalis* Schiff. Hundsheimberg, Pfaffenberg, Thebner Kogel, bei Rohrbach, Bösing und St. Georgen nicht häufig.
426. *Herminia cribrumalis* Hb. bei Theben-Neudorf an Schilfstengeln sitzend, selten.
427. *Herminia derivalis* Hb. bei Preßburg und Rohrbach vereinzelt.

428. *Herminia tentacularia* L. im ganzen Gebiete vereinzelt.
429. *Pedipogon barbalis* Cl. Rohrbach, Bösing und Szeleskut nicht häufig.
430. *Bomolocha fontis* Thnbg. Gernsberg bei Preßburg und Modern vereinzelt.
431. *Hypena proboscidalis* L. im ganzen Gebiete, stellenweise häufig.
432. *Hypena rostralis* L. im ganzen Gebiete häufig, ab. *unicolor* Tutt. bei Bösing, ab. *variegata* Tutt. bei Rohrbach und Bösing vereinzelt mit der Stammform.
433. *Hypenodes costaestrigalis* Stph. Gernsberg und Batzenhäusel bei Preßburg, nur wenige Stücke.
434. *Tholomiges turfosalis* Wck. in Theben-Neudorf an den Straßenlaternen anfliegend, in einiger Anzahl gefangen.
435. *Habrosyne derasa* L. bei Bösing, Modern und St. Georgen nicht häufig.
436. *Thyatira batis* L. im ganzen Gebiete ziemlich häufig, in den buschreichen Waldlichtungen des Hundsheimberges gemein.
437. *Cymatophora or* F. bei Preßburg, Theben, Rohrbach und Bösing nicht häufig.
438. *Cymatophora fluctuosa* Hb. nur bei Szeleskut wenige Stücke.
439. *Cymatophora duplaris* L. Wetterling und Klokocava vereinzelt.
440. *Polyploca flavicornis* L. im ganzen Gebiete vereinzelt.
441. *Polyploca ridens* F. bei Rohrbach und Modern ziemlich häufig.
442. *Brephos parthenias* L. Rhachsthurn wenige Exemplare.
443. *Aplasta ononaria* Fuessl. Braunsberg bei Hainburg häufig.
444. *Pseudoterpna pruinata* Hufn. bei Theben, Rohrbach, Bösing nicht häufig.

(Fortsetzung folgt.)

Literaturschau.

Beuret, Remarques sur la variation des ocelles du revers chez les Lyceus. Lambillionea XXVI, 96. — **Derenne**, Espece nouvelle pour la faune belge. Lambillionea XXVII, 1. — **Derenne**, Formes nouvelles pour la faune belge. Lambillionea XXVII, 2. — **Barger**, Über *Deilephila hybr. epilobii* B., ein im Freien beobachteter Hybride. Z. d. Ver. d. Naturbeobacht. und Samm-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lepidopterologische Rundschau, Wien](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Bauer J.

Artikel/Article: [Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der Kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg. 165-167](#)