

Beiträge zur Kenntniss der Lepidopterenfauna des böhmischen Erzgebirges.

Von

Dr. GUSTAV C. LAUBE.

II. In Eichwald beobachtete Geometriden.

Als Fortsetzung des in Nr. 3 der Sitzungsberichte des „Lotos“ erschienenen Noctuidenverzeichnisses theile ich auf den folgenden Seiten das Verzeichnis der Geometriden mit, welche mir innerhalb einer zehnjährigen Beobachtungsdauer in Eichwald bekannt geworden sind. Die Bemerkungen, welche ich dem ersteren vorausgeschickt habe, gelten auch von diesem; es hat aber wohl etwas mehr Anspruch auf Vollständigkeit, da der Fang der Geometriden nicht vorwiegend auf die Nachtzeit beschränkt und mit weniger Schwierigkeiten verbunden ist, als der der Noctuiden; aber es sind unzweifelhaft — wiewohl nahezu die Hälfte der mitteleuropäischen Arten verzeichnet werden konnte — noch immer Lücken vorhanden, namentlich kleinere Formen wie die schwer bestimmbareren Eupitheciiden u. a. m. werden manche Ergänzung zulassen.

I. Dendrometridae.

Pseudoterpna H. S.

1. *pruinata* Hufn. F. auf trockenen Plätzen in den Vorbergen, VII., n. h.

Geometra Bd.

2. *papilionaria* L. F. im unteren Theile von Tuppelburg geklopft, VII., n. h.

Phorodesma Bd.

3. smaragdaria F. F. auf trockenen Plätzen in den Vorbergen, f. a. L.,¹⁾ VII., s.

Thalera Hb.

4. fimbrialis Scop. F. auf trockenen sonnigen Lehnen in den Vorbergen, VII., n. s.

Jodis Hb.

5. putata L. F. im Herrnbusch gegen Jügendorf, V., n. h.
6. lactearia L. F. einzeln manchmal noch VII., sonst V. an der Gebirgslehne in Laubgehölzen, n. h.

Acidalia Tr.

7. perochraria F. R. F. auf Wiesen in Tuppelburg, VII., h.
8. ochrata Scop. F. auf trockenen Wiesen und Berglehnen, VII./VIII., h.
9. rufaria Hb. F. auf Wiesen in Tuppelburg, VII., n. h.
10. moniliata F. F. auf trockenen Berglehnen bei Pyhanken, VII., s.
11. dimidiata Hufn. F. an Sträuchern im Garten, VII., s.
12. straminata Tr. F. einzeln an Baumstämmen, VII., n. h.
13. virgularia Hb. F. an trockenen Steinmauern, VII./IX., h.
14. contiguaria Hb. F. auf trockenen Berglehnen, VII., s.
15. humiliata Hufn. F. auf trockenen Berglehnen, VII., n. h.
16. dilutaria Hb. F. auf trockenen Berglehnen VII., n. h.
17. herbariata F. im Hause an Möbeln und Zimmerwänden, VII., n. h.
18. a) aversata L. b) var. spoliata Stgr. F. an Baumstämmen und Felsblöcken, VII./VIII., h. h.
19. inornata Hb. F. an Baumstämmen, VII., s.
20. emarginata L. F. an Baumstämmen am Gebirgsfuss bei Tuppelburg und Probstau, VII., s.
21. marginepunctata, Göze. F. an trockenen Mauern, VII./VIII., n. s.
22. strigaria Hb. F. in lichten Laubgehölzen am Gebirgsfuss, VII., n. s.
23. strigillaria Hb. F. mit der vorigen, VII., n. s.
24. ornata Scop. F. an trockenen Wiesen und Berglehnen, f. a. L., VII./IX., h.

¹⁾ F. a. L. = fliegt ans Licht.

Zonasoma Led.

- 25. *pendularia* Cl. F. im Herrnbusch von Eichen geklopft, VII., n. h.
- 26. *punctaria* L. R. u. F. auf Eichen im Herrnbusch, VII., h.
- 27. *linearia* Hb. F. an Baumstämmen einzeln, VII., n. h.

Timandra Dup.

- 28. *amataria* L. F. überall, h. h., VII./VIII., f. a. L.

Abraxas Leach.

- 29. *grossulariata* L. F. an Stachelbeersträuchern in Pyhanken, VII., n. h.
- 30. *sylvata* Scop. F. an Fichtenstämmen in der Malst, VII./VIII., n. h.
- 31. *adustata* V. F. an Sträuchern, f. a. L., VII. n. h.

Capera Fr.

- 32. *pusaria* L. F. in Birkenschlägen bis gegen den Gebirgskamm, VII., h.
- 33. *exanthemata* Scop. F. in Laubgehölzen, Tuppelburg, Herrnbusch, Wisterschitze, VI./VII., h.

Numeria Dup.

- 34. *capreolaria* V. F. in Fichtenwäldern bis auf d. Gebirgskamm, VII., n. s.

Ellopia Tr.

- 35. *prosapiaria* L. var. *prasinaria* Hb. F. in den Fichtenwäldern bis auf dem Gebirgskamm, VII., h. h.

Metrocampa Letr.

- 36. *margaritaria* L. F. in Hainbuchenbeständen geklopft, VII., n. h.

Eugonia Hb.

- 37. a) *quercinaria* Hufn. R. auf Hainbuchen, F. in Laubholzbeständen bis auf 600 m Seehöhe, VII./VIII., h. h.
b) var. *equestraria* Stgr. (*carpinata* Hb.) c) var. *infuscata* Stgr. vereinzelt s. s.
- 38. *autumnaria* Wrbn. R. auf Hainbuchen, Rosskastanien, VII. F. VIII./IX., in lichten Laubgehölzen am Gebirgssusse, f. a. L., h.
- 39. *fuscantaria* Hw. F. einzeln in Hainbuchenbeständen, f. a. L., VII./VIII., s. s.

40. *erosaria* Bkh. F. in lichten Laubgehölzen am Gebirgsfusse, VII., n. h.

Selenia Hb.

41. *bilunaria* Esp. F. an Laubgehölzen, f. a. L., VII./VIII., h. h.
42. *tetralunaria* Hufn. F. an Rosskastanienstämmen in Tuppelburg, VII., s.

Pericallia Steph.

43. *synnigaria* L. F. f. a. L., VII., s.

Therapis Hb.

44. *evonymaria* V. F. f. a. L., VII., s.

Himera Dup.

45. *pennaria* L. F. in Tuppelburg auf Laubgebüsch, IX., s.

Crocallis Tr.

46. *elinguaria* L. F. in Laubgehölzen, auch in Gärten, VII./VIII., n. s.

Eurymene Dup.

47. *dolobrararia* L. F. an Laubgebüsch in der Wisterschitze, VI., s.

Urapteryx Leach.

48. *sambucaria* L. F. in Laubgehölzen und Gärten, an Epheu und wildem Wein, f. a. L., VII., h.

Rumia Dup.

49. *luteolata* L. R. auf Obstbäumen, IX. F. IV./V., n. h.

Epione Dup.

50. *parallelaria* Schff. am Pyhankner Hügel im Birkengehölz, f. a. L., VII., n. h.
51. *advenaria* Hb. F. auf trockenen Wiesen bis auf dem Gebirgskamm, VII., n. h.

Venilia Dup.

52. *macularia* L. F. auf Wiesen, beim Schweissjäger, Tuppelburg, V., VI., n. s.

Macaria Curt.

53. *alternaria* Hb. F. an Birken am Pyhankner Hügel, VIII., s.
54. *signaria* Hb. F. in lichten Holzschlägen, Tuppelburg, VII., n. s.

55. *liturata* Cl. F. in Nadelholzbeständen, Tuppelburg, VII., n. s.

Hybernia Latr.

56. *aurantiaria* Esp. F. an Steinblöcken, Baumstämmen, f. a. L., IX./X., n. s.
57. *marginaria* Bkh. F. im dürren Laub, Weg zum Schweissjäger, Tuppelburg, IV., n. h.

Amphidasis Fr.

58. *betularia* L. F. in Laubgehölz bis gegen den Schweissjäger, VII., n. h.

Boarmia Tr.

59. *cinctaria* V. F. an Laubholzstämmen, IV./V., n. s.
60. *secundaria* Esp. F. in Fichtenbeständen, VII., h.
61. *abietaria* Hb. F. ♀ an Baumstämmen, ♂ fliegen in Fichtenbeständen, Tuppelburg, Seegrund, Malst, VII., n. h.
62. a) *repandata* L. F. an Baumstämmen überall VII./VIII., h. h. b) var. *conversaria* Hb., 1× auf dem Hau beim Mordstein.
63. *crepuscularia* Hb. F. an Rosskastanienstämmen in Tuppelburg, IV./V., n. s.
64. *punctularia* Hb. F. an Baumstämmen, IV./V., n. s.

Gnophos Tr.

65. *obscuraria* Hb. F. auf trockenen Grasplätzen in den Vorbergen, VII., n. s.
66. *pullata* Tr. F. auf einer Bergwiese oberhalb Graupen, VII., 1×, s. s.
67. *dilucidaria* Hb. F. an Baumstämmen, Rainsteinen u. s. w. auf und nahe dem Gebirgskamm, VII./VIII., h.

Ematurga Led.

65. *atomaria* L. F. auf Hauen und Waldblößen bis auf den Kamm hinauf, V./VI., h. h.

Selidosema Hb.

66. *ericetaria* Vill. F. auf trockenen grasigen Lehnen in den Vorbergen, VII., n. h.

Halia Dup.

67. *wawaria* L. F. an Laubsträuchern, f. a. L., VII./VIII., h.

Phasiane Dup.

68. *clathrata* L. F. auf feuchten Wiesen, in Tuppelburg, VII./VIII., h.

Aspilates Tr.

69. *gilvaria* F. F. auf trockenen Lehnen an den Vorbergen, VII./VIII., n. s.

Phytometridae.

Lythria Hb.

70. *purpuraria* Cl. F. auf trockenen Grasplätzen in den Vorbergen, auf Hauen, VII., h.
71. *sanguinaria* Hw. F. auf dem Pyhankner Hügel an Besenginster, 1X, s. s.

Ortholitha L.

72. *plumbaria* F. F. auf Waldwiesen, V., h.
73. *cervinata* V. F. f. a. L., IX. n. h.
74. *limitata* Scop. F. auf Waldwiesen an Laubsträuchern, VII./VIII., h. h.
75. *moeniata* Scop. F. auf trockenen Lehnen in den Vorbergen, VII./VIII., n. s.
76. *bipunctaria* V. F. auf trockenen Lehnen in den Vorbergen, auf Hauen VII./VIII., h. h.

Minoa B.

77. *murinata* Scop. F. auf trockenen Berglehnen und Hauen, VIII., n. s.

Odezia Bd.

78. *atra* L. F. auf Wiesen und Getreidefeldern (Hafer) auf dem Gebirgskamm, VII./VIII., h.

Anaitis Dup.

79. *praeformata* Hb. F. auf Hauen, VII., n. h.
80. *plagiata* L. F. auf trockenen Lehnen in den Vorbergen, auch weiter hinauf an Baumstämmen, VII./VIII., h. h.

Lobophora Curt.

81. *sertata* Hb. F. an Baumstämmen, vorwiegend Ahorn, am Gebirgssfuß bis zum Schweissjäger, VIII., n. s.
82. *carpinata* Bkh. F. in Laubgehölzen, V., manchmal verspätet, VII., n. h.

Cheimatobia Stph.

- 83. *brumata* L. F. an Laubbäumen, X., h. h.
- 84. *boreata* Hb. F. an Buchenstämmen, X., h.

Scotosia Stph.

- 85. *rhamnata* V. F. in Gärten, VII., n. h.

Triplosia Stph.

- 86. *dubitata* L. F. in Gärten, f. a. L., VII./VIII., n. s.

Lygris Hb.

- 87. *reticulata* V. F. an Fichtenstämmen in feuchten Waldthälern, Malst, Wisterschitze, VII., n. h.
- 88. *prunata* L. F. in Gärten, an Baumstämmen, f. a. L., lässt sich ködern, VII./VII., h. h.
- 89. *testata* L. F. in Laub- (Weiden-) Gebüsch, VII./IX., n. h.
- 90. *populata* L. F. am Gebirgskamm in Heidelbeeren und lichten Waldstrecken, VII./VIII., h. h.

Cidaria Tr.

- 91. *dotata* L. F. an Laubsträuchern am Gebirgsfuss bei Pyhanken und Rosenthal, VIII., n. h.
- 92. *fulvata* Frst. F. an Sträuchern im Tuppelburger Thiergarten, f. a. L., VII., n. h.
- 93. *ocellata* L. F. an Baumstämmen, f. a. L., VII./VIII., h. h.
- 94. *variata* L. F. in Fichtenbeständen überall, VII., h. h.
- 95. *siterata* Hufn. F. einzeln an Baumstämmen, IX., s.
- 96. *a) truncata* Hufn. F. bis an dem Kamm in den Wäldern, VII., h. *b) var. perfuscata* Hw., VII., n. h.
- 97. *immanata* Hb. F. in Tuppelburg, Seegrund, VII./IX., n. h.
- 98. *viridaria* F. F. an lichten Fichtenwaldstrecken, VII., n. s.
- 99. *olivata* Bkh. F. an Baumstämmen, auf Waldwiesen, VII., n. s.
- 100. *salicata* Hb. F. im Seegrund, VII., n. h.
- 101. *didymata* L. F. an Fichtenstämmen, VII./VIII., h.
- 102. *vespertina* Bkh. F. an Fichtenstämmen, VIII., h.
- 103. *fluctuata* L. F. an Baumstämmen, Zäunen etc. überall, VII./IX., h. h.
- 104. *montanata* Bkh. F. an Laubbäumen, Tuppelburg, Wisterschitze, VI./VII., h.
- 105. *quadrifasciaria* Cl. F. in Laubgehölzen am Gebirgsfusse, VI./VII., n. s.

106. *ferrugata* Cl. F. an Baumstämmen, f. a. L. überall, VII./VIII., h.
107. *unidentaria* Hw. F. in Laubgehölzen, f. a. L., VI./VIII., h.
108. *poemeraria* Ev. F. in Laubgehölzen, f. a. L., VIII., n. s.
103. *designata* Rtb. in lichten Fichtenwaldstrecken, f. a. L., VII., n. s.
110. a) *dilutata* Bkh. F. an Baumstämmen, sehr veränderlich in der Färbung und Zeichnung, überall, IX./X., h. h.
b) *var. autumnata* Stgr. in höheren Gebirgslagen, IX./X., n. h.
111. *caesiata* V. F. in Fichtenbeständen in höheren Gebirgslagen, VI./VII., h.
112. *picata* Hb. F. in Laubgehölz beim Kostner Teich, 1×, VII., s. s.
113. *galiata* Hb. F. an Stämmen und Felsblöcken, VII./VIII., n. h.
114. *albicillata* L. F. an Waldrändern, Tuppelburg, VII., n. h.
115. *lugubrata* Stgr. F. 1× am Licht, VII., s.
116. *sociata* Bkh. F. an Gartenhecken, f. a. L., VII., n. s.
117. *alchemillata* L. F. an Baumstämmen, in Sträuchern, f. a. L., VII., h.
118. *minorata* Tr. F. an Ebereschenstämmen an den Strassen, auf dem Gebirgskamm, VII./VIII., n. s.
119. *adaequata* Bkh. F. auf Waldwiesen im Tuppelburger und Kostner Thiergarten, VII., n. s.
120. *candidata* V. F. auf feuchten Wiesen, Tuppelburg, VI./VII., n. s.
121. *obliterata* Hufn. F. an Rosskastanien in Tuppelburg, VII., n. h.
122. *bilineata* L. F. in Gartenhecken, Laubgehölz, f. a. L., überall, VII./IX., h. h.
123. *sordidata* F. in Fichtenbeständen bis auf dem Kamm, auch an Laubbäumen im Vorgebirge, VII./VIII., n. s.
124. *silaceata* Hb. F. an Laubbäumen und Sträuchern, VII., n. h.
125. *berberata* V. F. an Gartenhecken, VI./VII., n. h.
126. *comitata* L. F. an Gartenhecken, f. a. L., VII./VIII., h. h.

Eupithecia Curt.

127. *oblongata* Thb. F. auf trockenen Lehnen, f. a. L., VII., n. s.
128. *subnotata* Hb. F. auf Waldwiesen, f. a. L., VII., n. s.
129. *linariata* F. F. auf Hauen, f. a. L., VII., n. s.
130. *pusillata* T. F. an Fichtenstämmen im Herrnbusch, V., h.
131. *abietaria* Göz. F. an Fichtenstämmen, VII., n. h.

132. *scabiosata* Bkh. F. auf trockenen Berglehnen, f. a. L., VII., n. h.
 133. *subfulvata* Hw. F. auf Waldwiesen in Tuppelburg, f. a. L., VII. h.
 134. *valerianata* Hb. F. auf Waldwiesen, f. a. L., VII., h. h.
 135. *pimpinellata* Hb. F. auf trockenen Berglehnen, VII., n. s.
 136. *vulgata* Hw. F. auf trockenen Berglehnen, f. a. L., VII./VIII., n. s.
 137. *absinthiata* Cl. F. auf trockenen Berglehnen, f. a. L., VII./VIII., n. s.
 138. *silenata* Stdf. F. f. a. L., VII., s.
 139. *lanceata* Hb. F. an Fichtenstämmen, V., h.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s): Laube Gustav Carl

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna des böhmischen Erzgebirges 81-89](#)