© Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Botanische Notizen.

Von Prof. Dr. *Franz Jechl* in Budweis.

(Aus einem Schreiben ddo. 8. Sept. l. J. an Hrn. Opiz.)

Die Hoffnung, die ich Ende vorigen Jahres in einer brieflichen Mittheilung ausgesprochen, und die Euer Wohlgeboren in unserer Vereinsschrift Lotos laut werden liessen *), ist in diesen Ferien zu meiner grossen Freude wirklich in Erfüllung gegangen. Nachdem ich beinahe den ganzen August mit der Durchforschung der südöstlichen Gränzgegenden zugebracht habe, ist es mir endlich gelungen, den lang gesuchten Coleanthus subtilis Seidl bei Wittingau in bedeutender Menge aufzufinden. Derselbe wächst dort in abgelassenen Teichen auf mässig feuchtem, nicht gar zu fettem Boden in Gesellschaft von Peplis Portula, Bidens tripartita, Heleocharis palustris etc. etc. etc. Auf Sandstellen fehlt er, und es wäre das Suchen eine vergebliche Mühe.

Anliegend sende ich dieses Gräslein in 150 Ex. für ihre Pflanzen-Tauschanstalt. Ferner erhalten Sie die Seidlia Jechelii Opiz, die ich gleichfalls in Mehrzahl gesammelt und — da sie sowohl dem Habitus als der Conformation der Perigonborsten nach ganz mit dem Scirpus sylvaticus L. übereinstimmt, und nur durch den Blüthenstand sich unterscheidet, — Scirpus sylvaticus L. β conglomeratus Jechl genannt habe, nebst Lycopodium inundatum und Lolium čechicum Opiz, mit dem Bemerken, dass ich nach meiner Rückkehr aus Wien, wohin ich morgen abzugehen beschlossen habe, die restirenden Sendungen so rasch als möglich machen werde. Mich in Dero Freundschaft empfehlend u. s. w.

Die von mir erzogenen Ichneumonen der Umgegend von Kaplitz.

Von *Leopold Kirchner* daselbst.

(Fortsetzung von S. 174.)

69. Genus. Trioxys Haliday.

Die Disco-Cubital-Zellen verwachsen; das Stigma dreieckig, der Radius desselben bogenförmig, abgekürzt; die Ventralscheide beim Weibchen mit zwei Dornen.

Fr. Aceris Hal. Schmarotzt in Aphis Aceris.

70. Genus. Praeon Haliday.

Die Praediscoidal-Zelle vollkommen.

Pr. dorsalis Hal. Einmal aus einer Aphis-Art gezogen.

IV. Familie. Chalcididae Westw.

Diese Familie ist unstreitig die schwierigste, aber auch die interessanteste und nützlichste unter allen schmarotzenden Hymenopteren. Die

---

*) s. Lotos, vorlieg. Jahrg. Februar S. 46. Die Redaction.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Jechl Franz

Artikel/Article: Botanische Notizen 185