

des Nordens von Europa, Asien und Amerika. Nach der Angabe des Hrn. Dr. A. A. Palliardi in seiner „Systematischen Uebersicht der Vögel Böhmens“ (S. 64 und 66) kommen diese Zugvögel auch dort nur selten vor.

Zu diesen Erscheinungen aus dem hohen Norden hat sich auch ein bei uns seltener Gast aus dem Süden gesellt, der meines Wissens unsere Gegend auf seinen Streifzügen zum ersten Mal besucht, nach Böhmen aber sich noch nie verirrt hat; — es ist diess die Zwerg-Scharbe (*Phalacrocorax pygmaeus* Dum., *Carbo pygmaeus* Temm.), ein junger Vogel ♂, welcher von einem Forstadjuncten auf den Teichen bei Mährisch-Ostrau am 10. October l. J. geschossen und an Hrn. Dr. Schwab in Neutitschein geschickt wurde. Die eigentliche Heimat dieses Vogels ist das kaspische Meer und Südeuropa.

Die der gelben Bachstelze (*Motacilla flava* Cuv.) ähnliche Varietät: *Motacilla Feldeggii*, welche im Egerlande, namentlich bei Franzensbad nach der Angabe des Dr. Palliardi (a. a. O.) schon einige Mal geschossen worden ist, wurde bei uns am 8. September l. J. zum ersten Mal an den Ufern des mährisch-schlesischen Gräuzflusses Ostrawitza erlegt. Das Exemplar ähnelt der *M. flava*, doch fehlt der weisse Strich über den Augen, der Kopf ist mehr schwarz als grau und der Schwanz länger. Es befindet sich in der Sammlung des oben erwähnten eifrigen Ornithologen Hrn. Schwab in Mistek, wohin auch ein ganz weisser Feldsperling (*Fringilla montana* Linné), der am 20. August bei Wallachisch-Meseritsch in Mähren geschossen worden, gekommen ist.

Diagnosen einiger neuer und minder bekannter Hemiptern.

Nach *Mulsant* und *Rey* mitgetheilt von *Weitenweber*.

Im neuesten Bande der für die Förderung der gesammten Naturwissenschaft sehr beachtenswerthen *Annales de la Société Linnéenne de Lyon* (Nouvelle série Tome deuxième, 1855) haben die beiden geschätzten französischen Naturforscher, Prof. E. Mulsant und Cl. Rey in Lyon, eine grössere Abhandlung veröffentlicht, in welcher eine Reihe von neuen oder weniger bekannten Arten Hemiptern-Homoptern aufgestellt und ausführlich beschrieben werden. Da wir mit einigem Grunde vermuthen, dass einige derselben auch in Deutschland und Oesterreich aufgefunden werden dürften, so erscheint es wohl gerechtfertigt, wenn wir an diesem Orte die betreffenden Diagnosen auszugsweise liefern, um sie auch unseren Lesern zugänglich zu machen.

I. Aus der Tribus der *Fulgoriten*:

1. *Dictyophora multireticulata*. Elongata, virescens; capite producto,

conico, lateribus rotundato; vertice recto; fronte, prothorace scutelloque tricarinatis; homelytris vitreis, apice numerosissime reticulatis, nervis viridibus; pedibus anticis rufo-testaceis. Longit. 0,012 — 0,014 millimetr. — Kommt um Lyon, doch ziemlich selten vor.

2. *Delphax tuberipennis*. Elongata, capite obtuse conico; fronte, vertice, prothorace scutelloque tricarinatis; fusco-brunea; carinis frontis, geniculis, tibiaram apice antennisque pallidis, his basi fusco-litauratis; vertice, prothorace scutello suturaeque basi pallido-luteis; homelytris post medium pellicido-maculatis, et transversim trituberculatis. — Longit. 0,004 millimetr. — In der Umgebung von Nimes, im Monat Juni.

II. Aus der Tribus der *Issiten*:

3. *Hysteropterum maculifrons*. Subovale, medio dilatatum, griseo-ferugineum; homelytris ad basim distincte nervosis, postice reticulatis, margine laterali pallidis; fronte subconvexâ, tenuiter tricarinatâ; lateribus punctis seriatis, disco maculis 4 majoribus, nigris. — Long. 0,005 — 0,006 millim., larg. 0,003 millim. — In der Provence, Lanquedoc. Juni; ziemlich selten.

4. *Conosimus* *) *coelatus*. Ovalis, fortiter nervosus, vage reticulatus, griseus, punctis maculisque fuscis variegatus, nervis carinisque pallidioribus; fronte leviter tricarinatâ, maculâ mediâ pallida; vertice antice angulato, prothoraceque medio carinatis; homelytris lateribus subgibbosis, pallido-subfasciatis, clavo medio oblongo-foveolato. — Long. 0,004 millim., larg. 0,0015 millim. — Auf den Hyèren, im Jänner und Februar; um Marseille im Mai.

5. *Peltonotus* **) *rani(ae-)formis*. Crassus, brevis, subcylindricus, infrâ niger pallido-maculatus, suprâ griseo-pallidus; frontis maculis uniformibus 2, verticis subtriangularibus 4, thoracis vittâ mediâ, scutelli vittis 3, brunneis; homelytris fuscis, vittâ subobliquâ pallidiori, abdomine suprâ 6. nigro-lineato; femorum maculis 2 et tarsorum apice obscuris; fronte, thorace, scutello, abdomine biserialim, lateribus pupillatis. — Long. 0,003 millim., larg. 0,002 millimetr. — Bei Faillefeu (Basses-Alpes).

III. Aus der Tribus der *Tettigometriden*:

6. *Tettigometra sulphurea*. Oblonga, sulphurea, crebro punctata; cly-

*) *Charact. generis*: Corpus oblongo-ovale; vertex leviter transversus, antice obtuse angulatus; frons oblonga, tricarinata; oculi rotundati, integri; ocelli non conspicui; homelytra lateribus subgibbosa; alae nullae, pedes breves, spinosuli.

**) *Char. generis*: Corpus crassum, subcylindricum; vertex transversus, antice truncatus; frons lata, tricarinata; oculi transversim-ovati, ocelli non conspicui. Prothorax antice peltato-dilatatus; scutellum maximum, prothoracis latitudine. Homelytra abbreviata, tricarinata, subparallela. Alae nullae. Pedes breves, spinosuli.

peo, pectore pedibusque nigro-purpureis; tibiaram apice tarsisque pallidioribus, unguiculis nigris. — Larg. 0,007 — 0,008 millim. — In den Umgebungen von Nîmes. Juni, auf *Onopordon Acanthium*. Steht zunächst der *T. virescens* Latreille.

7. *Tettigometra impressifrons*. Breviter ovata, punctata, nitida, nigropicta; puncto capitis antico, ano, metasterno, geniculis, tibiaram apice tarsisque pallidis; vertice medio sensim, fronte profundius, late excavatis. — Long. 0,003 millimetr., larg. 0,002 millim. — In Lanquedoc. Mai.

IV. Aus der Tribus der *Levipeden*, Amyot.

8. *Ptyelus notatus*. Oblongus, tenuiter albido-pubescentis, punctulatus, pallido-flavus; vertice, prothorace scutelloque lineâ longitudinali nigro-brunnea; homelytris lineâ subsuturali vittâque submarginali fuscis, ad angulum apicalem puncto nigriore, capite triangulariter acute producto. — Long. 0.008 millimetr. — In der Provence.

V. Aus der Tribus der *Serripeden*, Amyot:

9. *Chiasmus* *) *translucidus*. Oblongus, capite trigono, suprâ ad basim carinato; pallidus, pectore ventreque medio nigris; vertice scutelloque nigro luteoque variegatis; homelytris niveis diaphanis, distincte nervosis, postice ad suturam sinnatim decussatis. — Long. 0,0035 millim. — Um Marseille. Juni, sehr selten.

10. *Bythoscopus ustulatus*. Elongatus, apice attenuatus, subtilissime coriaceus, pallidus; scutello suturâque ferrugineo-maculatis, pectore antice nigro; homelytris nitidulis, pellucidis, ad apicem subinfuscatis. — Long. 0,005 — 0,006 millim. — Um Avignon, Bartholasse-Insel; auf weissen Pappeln, im Mai und Juni, ziemlich gemein. Mit zwei Varietäten um Lyon.

11. *Bythoscopus ocularis*. Elongatus, subtilissime coriaceus, fuscoluteus, vertice scutelloque pallescentibus; hoc basi maculis duabus triangularibus, illo maculis duabus rotundatis, nigris; prothorace antice obscuro-maculato; homelytrorum nervis albis, plus minusve fusco-interruptis; pedibus flavis. — Long. 0,004 millim. — Auf den Ilyères, la Seyne. Januar, Juni. Diese kleine Art steht am nächsten dem *B. notatus* Herr.-Schäff.

12. *Bythoscopus sinuatus*. Elongatus, subtilissime coriacens, capitis basi sub oculis sinuatâ; pallidus, pectore medio nigro; vertice et prothorace postice punctis duobus rotundatis nigro; scutello croceo basi nigro-bimaculato; homelytris apice attenuatis, subdiaphanis, nervis postice attenuatis. — Long. 0,0045 mill. — Um Marseille, Avignon; im Juni, ziemlich selten.

*) *Char. generis*: Corpus oblongum; vertex triangularis; frons oblonga, subparallela, oculi magni, transversî; ocelli conspicui. Prothorax brevis, transversus; scutellum triangulare. Homelytra ad apicem sinuata, decussata. Pedes elongati, spinosi.

13. *Stegelytra* *) *alticeps*. Oblongo-ovata, subrugosa, tenuiter hispidopilosa, griseo-testacea, punctis obscuris subtilibus irrorata; capite obtuse trigono; vertice transversim excavato, medio fusco-ferrugineo, margine postico elevato. Elytris, lateribus compressis, vage reticulatis, suturâ altissimis punctoque medio pallido notatis. Pedes pallidi, fusco-punctati. — Long. 0,006., larg. 0,0025 — 0,003 millim. In Lanquedoc, Provence. Januar, März; ziemlich selten.

14. *Jassus Cyclops*. Elongatus, apice attenuatus, nitidulus, capite obtuse trigono; pallide testaceus; verticis basi puncto majore rotundato, alteroque minore utriusque sub oculis, nigris; sutura obscuro-bipunctata; tibiis posticis obsolete fusco-punctatis. — Long. 0,006 millim. In der Provence.

15. *Jassus haematoceps*. Elongatus, postice attenuatus, vertice basi subtiliter canaliculato; rufescens; capite obtuse trigono, scutello thoraceque sanguineo variegatis, hoc basi nigro-bimaculato, homelytris nitidulis, subpellucidis, maculis oblongis albidis, nervis rubris; pectore ventrisque basi nigris. Pedes pallido-flavi, fusco-punctati. — Long. 0,0035 millim. Auf den Hyèren; im März. Diese Art hat viel Aehnlichkeit mit dem *Jassus croceus* Herr.-Schaeffer.

16. *Jassus didymus*. Elongatus, subdepressus, nitidulus, capite obtusissime trigono; nigricans; duabus lineolis apice frontis, duabus ante ocellos; thoracis macula laterali lineâque longitudinali mediâ, croceis; pedibus lividis, nigro-punctatis, femoribus infuscatis. — Long. 0,0035 millim. — Bresse. Im September, selten.

17. *Athysanus quadrinotatus*. Oblongus, nitidus, pallidus; pectore ventrisque basi, verticis obtuse trigoni punctis quatuor rotundatis, thoracis lineolis duabus anticis nigris, scutello basi punctis duobus fuscis; homelytris vitreis, apice infuscatis, laete fusco-nervosis. ad suturam postice vix sinuatis; pedibus fusco-punctatis. — Long. 0,006 millim. Auf den Bergen um Beaujolais. Im November, selten. Ist dem *Athysanus plebejus* Fallèn sehr ähnlich.

18. *Deltocephalus medius*. Elongatus, capite trigono; pallido-chlorizans, verticis lineolis duabus, pectore ventrisque basi, nigris; prothorace fusco-quadrilineato; homelytris pellucidis albescentibus, fortius nervosis; pedibus fusco-punctatis. — Long. 0,0045 millim. — In der Umgegend von Lyon; sehr selten. (Beschluss).

*) *Char. generis*: Corpus crassum, postice compressum. Caput obtuse trigonum; vertex excavatus; frons elongata, subparallela; oculi magni postice supra thoracis discum producti; ocelli conspicui, antici. Prothorax brevis, transversus; scutellum magnum, triangulare. Homelytra postice adscendentia, suturâ elevatâ. Pedes elongati, spinosi.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Weitenweber Wilhelm Rudolph

Artikel/Article: [Diagnosen einiger neuer und minder bekannten Hemipteren 235-238](#)