

werden genannt *H. candidula* und *H. striata* Drap. non Müll, letztere nur durch die Sculptur unterschieden, also doch vielleicht gerade *H. striata* Müll.-*costulata* Ziegl gemeint. *H. adspersa* und *pomatia*, *H. nemoralis* und *hortensis* kommen nebeneinander vor, ferner *H. Cartusiana* Müll. Vermisst werden *H. ruderata*, *personata*, *Cobresiana*, *bidens*, *incarnata*, *fruticum*, *strigella*, *rufescens* und *sericea*. *Cyclostoma elegans* sei häufig auf Kalkboden, *Pupa quadridens*, aber keine *P. avena*. Von *Pomatias* und *Hydrobia* je zwei Arten aufgeführt, *P. maculatum* und *obscurum*, *H. brevis* und *viridis*, ferner *Margaritana margaritifera*, *Unio sinuatus*, *litoralis* und *Requienii*. In Betreff der Pisidien unterscheidet der Verfasser, wie auch Dubrueil, zwei Arten, *annicum* und *fontinale*. Unter den Süßwasserschnecken vermisst der Verfasser selbst *Limnaeus pereger* und *Ancylus lacustris*, es finden sich unter den aufgezählten *Physa acuta*, *Ancylus Fabrei* und *striatus*.

v. Martens

Da in unserer Zeitschrift wegen der Menge der Original-Aufsätze die Literatur etwas in Rückstand gerathen war, so gebe ich nachträglich die zum Theil schon seit Jahren bereit liegende gedrängte Inhaltsanzeige einiger der wichtigeren periodischen Schriften.

Pfeiffer.

Journal de Conchyliologie. Vol. IX. (3 e sér. I.) Vierte Lieferung. 1. Okt. 1861. S. 317—412. Tafel 12—16. (Vgl. Malak. Bl. VIII. S. 126—132.)

— Studien über die Lucinen; von Deshayes (p. 317—334.)

— Monographische Liste der Arten der Gattung *Cardilia*, von Fischer (p. 335—44.) Geschichtliches über die Gattung, und Beschreibung der 3 lebenden und 2 fossilen Arten.

— Ueber *Cassidaria provincialis*, von Bernardi (p. 344.) Es hat sich durch Entdeckung eines weiteren Exemplares be-

stätigt, dass die von Martin beschriebene *Pyrrula provincialis*, der Vermuthung des Herrn Petit de la Saussaye entsprechend, eine wirkliche Cassidaria ist.

— Beschreibung einer neuen Gattung, von Fischer. *Philis Cumingi* p. 345. pl. 16. f. 8. 9. Verwandt mit *Lucina*.

— Beschreibung einer neuen *Corbicula*; von Mörch. *C. Primeana* p. 347.

— Beschreibung 2er neuen Arten; von Deshayes. *Helix Carolus* p. 348. pl. 16. f. 1. 2 von Luzon, und *H. psittacina* p. 350. pl. 16. f. 3—5, ebenda von Carl Semper gesammelt.

— Beschreibung 2er neuen *Murex*; von Crosse. 1. *M. Penchinati* p. 351. pl. 16. f. 6 von Liou-Tcheou. 2. *M. Fournieri* p. 352. pl. 16. f. 7, von Japan.

— Beschreibung neuer Muscheln; von Temple Prime. 1. *Glaucanome Jayana* p. 354, Australien. 2. *Cyrena sphaerica* p. 354 3. *C. acuta* p. 355, Centralamerika. 4. *C. fortis* p. 355, Ecuador. 5. *Corbicula Lydigiana* p. 355, Siam. 6. *C. prolongata* p. 356, Australien.

— Diagnosen fossiler Heliceen aus der Gegend von Constantine; von Crosse. 1. *Helix Jobaeana* p. 356. 2. *H. Vanvinciquiae* p. 357. 3. *H. Semperiana* p. 357. 4. *Bulinus Jobaeanus* p. 357.

— Beschreibung fossiler Conchylien aus den oberen Tertiärschichten; von C. Mayer (Forts. von vol. VIII. p. 213 und 421). — 54. *Tapes clandestina* p. 358 (abgebildet 1860. pl. 5. f. 10). — 55. *Cypricardia Deshayesi* p. 359. — 56. *Cardita Oironi* p. 359. — 57. *C. profundisulcata* p. 360. — 58. *C. rusticana* p. 361. — 59. *Arca aquitanica* p. 362. — 60. *A. umbonaria* p. 363. — 61. *Siliqua bavarica* p. 364. — 62. *Solenomya Doderleini* p. 364. — 63. *Sphenia Paulina* p. 365. pl. 15. f. 13. — 64. *Panopaea Fischerina* p. 366. pl. 15. f. 12. — 66. *Arca Burdigalina* p. 367. pl. 15. f. 14. — 67. *Chemnitzia Winkleri* p. 368. pl. 15. f. 9. — 68. *Trochus Moussoni* p. 369. pl. 15. f. 5. 6. — 69. *Pleurotoma Escheri* p. 370. pl. 15. f. 10. — 70. *Cancellaria*

Bernardii p. 371. pl. 15. f. 3. 4. — 71. *Buccinum Gumbelinum* p. 372. pl. 15. f. 7. — 72. *B. Taurinense* p. 372. pl. 15. f. 8.

— *Mytilus tenuis* Zitt. & Goub. erhält den Namen *M. mutatus* (p. 373). wegen der gleichnamigen Art von Deshayes.

— Bibliographie. Deshayes description des animaux sans vertèbres découverts dans le bassin de Paris. Paris 1857—1861. (Crosse p. 374.) — Proceed. Zool. Soc. Lond. 1859—1860. — List of American writers on recent conchology by G. W. Tryon. 1861. — Malakoz. Blätt. 1860. — Synonymy of the Cyclades; by Temple Prime 1861. — Mémoire sur le groupe oolithique inférieur des environs de Mâcon. Prem. part. Etage bajocien; par M. Eug. Dumortier. — E. de Fromentel Introduction à l'étude des Polypiers fossiles. 1858—61.

Journal de Conchyliologie Vol. X. (3^e sér. II). Erste Lieferung. 1. Jan. 1862. S 1—108 und 5 Tafeln.

— Anatomie der Gattung *Hipponyx*; von P. Fischer. S. 1—16. Taf. 2. Der Vf. erklärt, dass der Mangel eines Fusses ein hinreichend wichtiges Merkmal sei, um eine Familie der *Hipponycidae* zu gründen.

— Ueber *Hipponyx Danieli*, und Liste der gegenwärtig bekannten Arten; von Crosse. (S 17—28). Zunächst wird nachgewiesen, dass *Capulus Danieli* Crosse 1858 zu *Hipponyx* gehört, und dann 18 lebende und 22 fossile Arten aufgezählt.

— Paläontologische Schlussfolgerungen in ihrer Anwendung auf die Conchyliologie unserer Zeit; von P. de Rykholt (S. 28—35.) Aus dem Vorkommen identischer fossiler Reste in sehr entlegenen Gegenden wird die Theorie der bei der Schöpfung mehrfach vertheilten Keime derselben Art bestärkt.

— Beschreibung einer neuen *Verticordia*; von P. Fischer. *V. Deshayesiana* p. 35. pl. 5. f. 10. 11. Von China.

— Beschreibung eines neuen *Fusus*; von Mörch. *F. (Sipho) lividus* p. 36. pl. 1. f. 1. Von Terra nova.

— Beschreibung einer neuen *Nassa*; von Fischer. *N. Gallandiana* p. 37. Von Spanien und Portugal.

— Diagnosen von 9 neuen Siamesischen Landschnecken; von L. Pfeiffer. 1. *Helix Crossei* p. 39. pl. 5. f. 2. 3. — 2. *H. goniochila* p. 39. pl. 6. f. 1. — 3. *H. ptychostyla* p. 40. pl. 6. f. 2. (Hinsichtlich dieser beiden Arten vergleiche man meine Bemerkungen in der später nachfolgenden (bisher zurückgesetzten) Anzeige des Martens'schen Aufsatzes in Proc. Z. S. Lond. 1860., wo ich für die letztere den Namen *H. styloptycta* vorschlage). — 4. *H. breviseta* p. 41. pl. 5. f. 4. 5. — 5. *H. tenella* p. 42. pl. 5. f. 6. 7. — 6. *Streptaxis siamensis* p. 42. pl. 6. f. 3. — 7. *Bulimus Crossei* p. 43. t. 5. f. 1. — 8. *Hydrocena (Omphalotropis) fulvida* p. 44. pl. 6. f. 4. — 9. *Rhiostoma Bernardii* p. 45. pl. 6. f. 5.

— Beschreibung eines neuen Conus; von Bernardi. *C. Barthelemyi* p. 46. pl. 1. f. 12. Indisches Meer.

— Beschreibung neuer Arten; von Crosse. 1. *Ricinula Reeveana* p. 47. pl. 1. f. 3. Marquesas-Inseln. — 2. *R. Ozenneana* p. 49. pl. 1. f. 4. 5. — 3. *Mitra Uzielliana* p. 50. pl. 1. f. 2.

— Beschreibung einiger von G. Cuming in Nord-China gesammelten Seekonchylien; von Crosse. 1. *Neptunea Cumingi* p. 51. pl. 5. f. 12. — 2. *Littorina Souverbiana* p. 53. pl. 1. f. 6. 7. — 3. *Lampania Cumingi* p. 54. pl. 1. f. 10. 11. — 4. *Murex monachus* p. 55. pl. 1. f. 8. — 5. *M. Taliemwhanensis* p. 56. pl. 1. f. 9.

— Beschreibung fossiler Conchylien aus der Umgegend von Hauterive (Drôme); von Michaud. Als neu werden beschrieben: *Helix Bernardii* p. 60. pl. 3. f. 4—6; *H. Jourdani* p. 62. pl. 3. f. 12. 13; *H. Victoris* p. 63. pl. 3. f. 1—3; *H. Antonini* p. 64. pl. 3. f. 7. 8; *H. ruderoides* p. 64. pl. 3. f. 9—11; *H. Duvalii* p. 65. pl. 3. f. 14—16. (Verwandt mit *H. labyrinthica* Mich. Leider ist es dem Verf. entgangen, dass der Name schon längst von Petit vergeben ist.) *Bulimus Seringi* p. 67; *Zua laevissima* p. 67. pl. 4. f. 9; *Z. brevis* p. 68. pl. 4. f. 10; *Azeca Baudoni* p. 69. pl. 4. f. 8; *A. Loryi* p. 70. pl. 4. f. 7; *Clausilia Loryi* p. 71. pl. 3. f. 19; *Cl. Baudoni* p. 72. pl. 3. f. 17; *Cl. Miche-*

lottii p. 73. pl. 3. f. 20; *Cl. Fischeri* p. 74. pl. 3. f. 18; *Pupa Jobae* p. 75. pl. 4. f. 6; *Vertigo Baudoni* p. 76. pl. 4. f. 2; *V. Crossei* p. 77. pl. 4. f. 3; *V. Nouleti* p. 77. pl. 4. f. 1; *V. minutissima Hartm. (?)* p. 78. pl. 4. f. 4; *Planorbis affinis* p. 79. pl. 4. f. 13; *Pl. Mariae* p. 80. pl. 4. f. 14; *Cyclostoma Baudoni* p. 81. pl. 4. f. 12; *Acme fusca (?)* p. 82. pl. 4. f. 11.

— Beschreibung fossiler Heliceen von Constantine; von Crosse. (Forts.) 1. *Helix Desoudiniana* p. 84; *Dumortieriana* p. 85; *subsenilis* p. 85.

— Neue fossile Concholepas aus Touraine; von Rambur. *C. Deshayesi* p. 86.

— Bibliographie. Bericht von Moquin-Tandon und Cloquet über die künstliche Erzeugung der Perlen 1858. — A. Villa sull'origine delle Perle 1860. — Milne-Edwards Observation sur l'existence de divers Mollusques et Zoophytes à de très-grandes profondeurs dans la Mer méditerranée 1861. — Hupé observations sur un mode particulier de parasitisme offert par un Mollusque gastéropode du genre Stylifer. 1860. — Bourguignat Étude synonymique sur les mollusques des Alpes maritimes publiés par A. Risso 1861. — J. Stabile Fossiles des environs du lac de Lugano 1861.

— Nekrologe des Königs Dom Pedro V. von Portugal und des Dr. Grateloup in Bordeaux, so wie Nachrichten über den Tod mehrerer Konchyliologen.

— Kleinere Notizen.

Zweite Lieferung. 1. Apr. 1862. S. 108—204 und 4 Tafeln.

— Ueber die Stellung, welche die Gattungen *Solemya*, *Venericardia* und *Leda* im Systeme einnehmen müssen; von Recluz. (S. 109—124). Nach sorgfältiger anatomischer Vergleichung gelangt der Verf. zu der Ueberzeugung, dass die Gattung *Solemya* im Widerspruche mit Bruguière, Cuvier, Sowerby, etc. aber im Einklange mit Lamarck weit von der Gattung *Solen* entfernt werden muss, dass ferner die Gattung *Venericardia* nicht zu den Veneriden gehört, sondern eine

Familie für sich bildet, und dass die Gattung *Leda* nach den Charakteren der Weichtheile nicht in einer Familie mit *Nucula* verbleiben darf.

— Neue Documente über die gigantischen Cephalopoden; von Crosse und Fischer. (S. 124—140). — Zusammenstellung der seit Aristoteles bekannt gewordenen Angaben aus dem Mittelmeer, den nordischen Meeren, der Südsee und dem atlantischen Meere.

— Ueber die Gattung *Woodia* Desh.; von O. Semper. (S. 141—146). Aufzählung der zu dieser Gattung gehörigen Arten in 3 Gruppen. 1. Parvali (die Gruppenbezeichnungen sind aus der Sanscrit-Mythologie entlehnt). Arten: *digitaria*, *excurrens*, *Burdigalensis*, *plicatella*. 2. Sita. Arten: *crenunjata*, *marginalis*, *profunda*, *Deshayesiana* n. sp. (p. 144). 3. Rohini. Dazu: *lamellosa*.

— Beschreibung einer neuen *Helix* von den Philippinen; von O. Semper. II *Annae* (p. 146. pl. 5. f. 8. 9.)

— Beschreibung eines neuen *Alycaeus*; von O. Semper. *A. Caroli* p. 148 von der Insel Luzon.

— Neue Muschel von Nordchina; von Crosse. *Ostrea Taliemwanensis* p. 149. pl. 6. f. 6.

— Ueber ein tertiäres Terrain in der Umgegend von Constantine; von J. Joba (S. 150—152.) Geologische Notizen über das Vorkommen der zunächst beschriebenen Arten.

— Beschreibung fossiler Landschnecken von Constantine; von Crosse. Zu den schon im vorigen Jahrgange gegebenen lateinischen Diagnosen werden Berichtigungen, genauere Beschreibungen und Abbildungen gegeben von folgenden Arten: *Helix Jobaeana* p. 153. pl. 7. f. 3—4; *Semperiana* p. 155. pl. 7. f. 7. 8; *Desoudiniana* p. 157. pl. 7. f. 1. 2; *Vauvincquiae* p. 158. pl. 7. f. 9—11; *Dumortieriana* p. 160. pl. 7. f. 5. 6; *subsenilis* p. 162. pl. 7. f. 12—16; *Bulinus Jobaeanus* p. 165. pl. 7. f. 17. 18; *Ferussacia atava* p. 166. pl. 7. f. 19. 20.

— Beschreibung fossiler Konchylien aus Touraine; von P.

Rambur: *Helix extincta* p. 172. pl. 8. f. 5. 6, *asperula Desh.*, *umbilicalis Desh.*, *Planorbis incrassatus* p. 177. pl. 8. f. 3. 4; *Cyclostoma sepultum* p. 179. pl. 8. f. 7. 8; *Concholepas Deshayesi* p. 180. pl. 8. f. 1. 2.

— Neuer fossiler Clanculus von Auvers; von Crosse. *Cl. Ozennei* p. 182. pl. 8. f. 9—11.

— Bibliographie. Malakozologische Blätter für 1861. — Observations sur les Hélices saxicaves du Boulonnais; par M. Bouchard-Chantreaux 1862. — Loriol description des animaux invertébrés fossiles contenus dans l'étage néocomien moyen du mont Salève. 1861. — Eudes-Deslongchamps Note sur la présence du genre Phorus dans le dévonien supérieur du Boulonnais. 1862. — Gabb Synopsis of the cretaceous formation. 1861. — Revue et magasin de zoologie 1861.

Dritte Lieferung 1. Juli 1862. S. 205—300 und 4 Tafeln.

— Anatomie von Hinnites; von Fischer (S. 205—216. Taf. 11.)

— Miscellen von Petit de la Saussaye. Ueber *Pectunculus zonalis* Lam. (p. 217); *Melania Charreyi* Mor. = *Rissoa ulvae*; *Terebratula monstrosa* Scac. (p. 218); *Neritina fluviatilis* (p. 219); *Cancellaria* (p. 220); *Buccinum Orbignyi* Payr. (p. 222); *Pectunculus formosus* Reeve (p. 224); *Patella mamillaris* L. (p. 225).

— Vier neue Landschnecken; von L. Pfeiffer. *Helix cyrtopleura* p. 227. pl. 10. f. 1; *Angasiana* p. 228. pl. 10. f. 2; *Celebensis* p. 229. pl. 10. f. 3; *Cochinchinensis* p. 230. pl. 10. f. 4.

— Beschreibung neuer Arten aus dem Caledonischen Archipel. *Petricola pseudolima* Souv. p. 231. pl. 9. f. 1. — *Cypricardia spathulata* Souv. p. 233. pl. 9. f. 2. — *Columbella plicaria* Montr. p. 234. pl. 9. f. 3. — *Cerithium connotum* Montr. p. 236. pl. 9. f. 4. — *Rissoina Montrouzieri* Souv. p. 237. pl. 9. f. 5. — *Stylifer apiculatus* Souv. p. 238. pl. 9. f. 6. — *Stomatella picta* Montr. p. 239. pl. 9. f. 7. — *Mitra hystrix* Montr. p. 240. pl. 9. f. 8. — *Truncatella*

labiosa Souv. p. 242. pl. 9. f. 9. — *Truncat. semicostata* Montr. p. 243. pl. 9. f. 10. — *Pedipes Jouani* Montr. p. 244. pl. 9. f. 11. — *Plecotrema Souverbiei* Montr. p. 246. pl. 9. f. 12.

— Neue Helix von Souverbie. *H. palumba* p. 248. pl. 10. f. 5.

— Neue Art von der Westküste Afrika's; von Petit de la Saussaye. *Modiola Vignoni* p. 250. pl. 10. f. 7.

— Neue Art von Pisania; von Crosse. *P. Montrouzieri* p. 251. pl. 10. f. 5.

— Neue Mitra; von Crosse. *M. Sophiae* p. 253. t. 10. f. 6.

— Zwei neue Tunicaten aus dem Kohlenkalk; von P. de Ryckholt. *Haliocerasum* (nov. g. p. 256): *Savignyanum* p. 257. pl. 12. f. 13 und *Cycloclinium* (nov. g. p. 258): *Lessonianum* p. 259. pl. 12. f. 12.

— Neue Gattung der Chitoniden; von P. de Ryckholt. *Sulcochiton Grayi* p. 259. pl. 12. f. 14.

— Beschreibung fossiler Konchylien aus den oberen Tertiär-Formationen; von C. Mayer. (Forts.) 73. *Trochus acutus* p. 261. pl. 12. f. 9. — 74. *Trochus Deshayesi* p. 261. pl. 12. f. 8. — 75. *Triforis Dujardini* p. 262. pl. 12. f. 11. — 76. *Cerithium Puymorïae* p. 263. pl. 12. f. 2. — 77. *Cerithium rissoinoides* p. 264. pl. 12. f. 10. — 78. *Cerithium Rouaulti* p. 265. — 79. *Pleurotoma Aglaïa* p. 266. pl. 12. f. 5. — 80. *Pleur. Euphrosine* p. 266. pl. 12. f. 4. — 81. *Pleur. Thalia* p. 267. pl. 12. f. 3. — 82. *Buccinum Blesense* p. 268. pl. 12. f. 7. — 83. *Bucc. Crossei* p. 269. pl. 12. f. 1. — 84. *Bucc. Deshayesi* p. 270. — 85. *Bucc. spectabile* p. 271. pl. 12. f. 6.

— Bibliographische Curiositäten; von Fischer. (S. 276). Ueber Humphrey Museum Calonnianum.

— Bibliographie. W. Reiss Mittheilungen über die tertiären Schichten von Sauta-Maria 1862. — Brot Matériaux pour servir à l'étude de la famille des Mélanien. 1862. — Chenu Manuel de conchyliologie et de paléontologie conchologique Tome II.

1862. — Bourguignat Spiciléges malacologiques 1862. — Gwyn Jeffreys British Conchology. 1862. — Catalogue of shells in the collection of A. D. Brown 1861. — Macé Essai d'un catalogue des Mollusques de Cherbourg et de Valogne. 1860

Vierte Lieferung. 1. Oct. 1862 S. 301—436 und 4 Tafeln.

— Verzeichniss der an den Küsten von Algier gesammelten Seekonchylien; von H C. Weinkauff. (S. 361—371). Darin als neu beschrieben: *Eulima subcylindrata* Dunk. (p. 342. pl. 13. f. 7; *Turbonilla Weinkauffi* Dunk. p. 343. pl. 13. f. 9; *Turritella umbilicata* Dunk. p. 354. pl. 13. f. 8 und ausserdem lehrreiche Bemerkungen über einzelne interessante Arten.

— Ueber das Thier der *Jouannetia Cumingi* und 2 neue Arten derselben Gattung; von Fischer (p. 371. pl. 15). Die neuen Arten sind: *J. Duchassaingii* Desh. p. 375. pl. 15. f. 3 und *Vignoni* Fisch. p. 376. pl. 15. f. 4.

— Bemerkungen über *Hydrobia Simoniana Dupuy*; von Michaud. (S. 377). Soll in der Gegend von Perpignan in einer Salzquelle in Gesellschaft von *Hydr. viridis* zahlreich vorkommen, und eine wirkliche *Hydrobia* sein, während sie bisher von Manchen für eine *Acme* oder *Acicula* gehalten wurde.

— Neue Bemerkung über die Gattung *Verticordia*; von Fischer (S. 388). Vervollständigte Liste nach den Beobachtungen von A. Adams.

— Verzeichniss der Rissoinen von den Sandwich-Inseln, nebst einer neuen Art; von Harper Pease. (S. 381). Ausser 6 bekannten Arten wird als neu beschrieben: *R. granulosa* p. 382. pl. 13. f. 10.

— Neue Muscheln von Temple Prime. 1. *Glauconome Jayana* p. 383. pl. 14. f. 5. — 2. *Gl. Sumatrensis* p. 384. pl. 14. f. 3. — 3. *Gl. Cumingi* p. 384. pl. 14. f. 4. — 4. *Batissa elegans* p. 385. pl. 13. f. 1. — 5. *Cyrena sphaerica* p. 386. pl. 13. f. 2. — 6. *Cyrena acuta* p. 387. pl. 14. f. 1. — 7. *Cyr. fortis* p. 387. pl. 14. f. 2. — 8. *Corbicula Lydigiana* p. 388. pl. 14. f. 8. — 9. *Corb. prolongata* p. 389. pl. 14. f. 6. — 10. *Corb. gracilis* p. 389. pl. 14. f. 7.

— Neue Scissurella; von Fischer. *Sc. Munieri* p. 390.

— Neue Scissurella; von Munier Chalmas, nebst monographischem Verzeichnisse der bekannten Arten. Es werden 18 Arten aufgezählt, als neu: *Sc. Deshayesi* p. 391. pl. 16. f. 1—4.

— Verzeichniss der lebenden Arten von Pirena, nebst einer neuen Art; von Crosse (p. 397). Der Vf. zählt 12 Arten auf, darunter als neu: *P. Debeauxiana* p. 402. pl. 13. f. 6, aus Westafrika.

— Neuer Conus; von Bernardi. *C. Duwali* p. 404. pl. 13. f. 3.

— Neue Arten aus dem Caledonischen Archipel; von Crosse. 1. *Clanculus Thomasi* p. 405. pl. 13. f. 4. — 2. *Cl. Danieli* p. 407. pl. 13. f. 5.

— Neue Arten von Cuba; von Raphael Arango. 1. *Cyclost.* (Chondropoma) *Gundlachi* p. 408. (Von mir fast gleichzeitig als *Chondropoma solare* beschrieben). — 2. *Helicina Nodae* p. 409. — 3. *Bulimus* (Melaniella) *Pichardi* p. 409.

— Ueber die Gattung *Craspedotus*; von P. de Ryckholt. (S. 410.) Historisches und Aufzählung von 28 Arten.

— Bibliographie. Aucapitaine Mollusques terrestres et d'eau douce observés dans la haute Kabylie. 1862. — Bourguignat Paléontologie des Moll. terr. et fluv. de l'Algérie 1862.

Vol. XI. (3 e sér. III). Erste Lieferung. 1. Jan. 1863. S. 1—128 und 4 Tafeln.

— Ueber die Anatomie der Cyrenen; von P. Fischer. S. 5—10. Dazu Tafel 4. Erste genauere Untersuchung der noch fast unbekanntem Gattung an Exemplaren der *C. Largilieri* Phil.

— Ueber einige neue oder wenig bekannte Mollusken aus Gross-Kablien; von O. Debeaux S. 10—21. Eine Ergänzung der in der vorigen Nummer des Journ. de Conch. erwähnten Arbeit von Aucapitaine. Die Notizen betreffen folgende Arten: *Zonites cellarius*, *Djurjurenensis* Deb. (p. 11. pl. 2. f. 1), *Helix Cirtae*, *kabyliana* Deb. (p. 13), *cespi-*

tum, cedretorum Deb. (p. 15. pl. 2. f. 3), *Roseti, Devauxii* Deb. (p. 17. pl. 2. f. 2), *Bul. pupa, Ancyclus costatus, fluviatilis, Hydrobia nana*.

— Beiträge zur malakologischen Fauna der dänischen Antillen; von O. A. L. Mörch. S. 21—43. Nach einigen Bemerkungen über die Gattung *Aplysia* folgen Notizen über: *Aplysia parvula* Guild. (p. 22), *protea* Rang, *Dolabrifera ascifera* Rang. — Gattung *Notarchus*: *N. Fleii* Rang, *polyomma* Mörch (p. 25), *Doridium gemmatum* Mörch (p. 25), *Oxynoë Antillarum* (p. 27), *Pleurobranchus areolatus* Mörch (p. 28), *Berthella quadridens* Mörch (p. 29), *circularis* Mörch (p. 31), *Doris angustipes* Mörch (p. 32), *crucis* Oerst. (p. 33), *Doris* (subgenus *Rhacodoris* M.) *Krebsii* Mörch (p. 34), *Goniodoris picturata* Mörch (p. 35), *Bornella calcarata* Mörch (p. 36), *Hermæa viridis* Desh. (p. 37), *Elysia crispata* Oerst. (p. 40), *Pelta prasina* Mörch (p. 42), *Onchis Armadilla* Mörch (p. 43).

— Revision der Arten der Gattung *Oxynoë* Rafin. und *Lobiger Krohn*; von O. A. L. Mörch. S. 43—48. Von der ersten Gattung werden 9, von der zweiten 3 Arten aufgezählt.

— Bemerkungen zur malakologischen Fauna des Caledonischen Archipels; von P. Fischer. S. 48—57. Die früher gegebenen Verzeichnisse der von Montrouzier gesammelten Konchylien werden ergänzt durch Aufzählung von 49 Arten *Mitra*, 19 *Conus*, 1 *Oliva*, 2 *Voluta*, 2 *Ovulum*, 10 *Cypræa*, 1 *Harpa*, 3 *Strombus* und 2 *Marginella*.

— Studien über die Gattung *Cancellaria* und Beschreibung neuer Arten; von Crosse. (Forts.) S. 58—69. Die beschriebenen Arten sind: *C. Cuningiana* Pet. var. *subobtusa* (p. 62. pl. 2. f. 9); *Angasi* Crosse (p. 64. pl. 2. f. 8); *Semperiana* Cr. (p. 65. pl. 2. f. 7.)

— Bemerkung über *Cassidaria Deshayesii*; von Duval. S. 70. Taf. 1. Fig. 9.

— Beschreibung einer neuen *Volute*; von Valenciennes. *V. Loroisi* p. 72. pl. 1. f. 1.

— Beschreibung einer neuen *Helicina*; von L. Pfeiffer. *H. Rosaliae* p. 72. pl. 2. f. 5.

— Beschreibung neuer Arten; von Souverbie und Montrouzier. *Helix Isabellensis* Souv. p. 74. — *Hydrocena maritima* Montr. p. 74. — *Dolium Testardi* Montr. p. 75. — *Neritina Souverbiana* Montr. p. 75. — *Helicina Fischeriana* Montr. p. 76. — *Helix Woodlarkiana* Souv. p. 76.

— Neue Arten aus Nord-China; von Crosse und Debeaux. 1. *Cancellaria Bocageana* p. 77. — 2. *Fragilia Yanteiensis* p. 78. — Anatomische Bemerkungen über die letztere; von Fischer. p. 79. pl. 4.

— Weitere Bemerkung über *Chondropoma Gundlachi* und *Nassa Gaillandiana*; von Crosse. Erstgenannte Art wird pl. 2. f. 4 abgebildet, so wie pl. 2. f. 6 die andere.

— Beschreibung einer neuen Art von Guadeloupe; von Crosse. *Engina Schrammi* p. 82. pl. 1. f. 7.

— Beschreibung neuer Arten aus Australien; von Crosse. *Columbella infumata* p. 84. pl. 1. f. 3. — *Typhis Angasi* p. 86. pl. 1. f. 2. — *Bittium Lawleyanum* p. 87. pl. 1. f. 4. — *Pleurotoma Angasi* p. 87. pl. 1. f. 5. — *Pl. Beraudiana* p. 88. pl. 1. f. 6. — *Crenella Paulucciae* p. 89. pl. 1. f. 8.

— Beschreibung fossiler Konchylien aus den unteren Tertiärschichten; von C. Mayer. (Forts.) 26. *Sphenia truncata* Desh. p. 91. — 27. *Venus praecursor* M. p. 92. pl. 3. f. 1. — 28. *Cytherea aequistriata* M. p. 93. — 29. *Cardium Brongniarti* M. p. 94. pl. 3. f. 2. — 30. *Pectunculus glycimeroideus* M. p. 95. — 31. *Lima Aquensis* M. p. 95. pl. 3. f. 3. — 32. *Lima Tyrolensis* M. p. 96. — 33. *Dentalium nobile* M. p. 97. — 34. *Turritella Brongniarti* p. 98. pl. 3. f. 4. — 35. *Trochus peregrinus* M. p. 99. pl. 3. f. 6. — 36. *Fusus Serresi* Grat. p. 99. pl. 3. f. 5.

— Bibliographie. Auszüge aus *Annals and Mag. of nat. hist.* 1860—62, die neueren Publicationen von A. Adams enthaltend. — *Cours de Paléontographie stratigraphique*, par

A d'Archiac. 1862. — Vitt Pecchioli di un nuovo fossile delle argile subapennine. — Auszüge aus A. Adams Artikeln in Proceed. Zool. Soc. 1861. — Étude sur les Zonites de l'Italie septentrionale, par G. de Mortillet 1861 et 1862. — Gwyn Jeffreys on a species of Limopsis 1862. — Phil. Mathéron recherches comparatives sur les dépôts fluvio-lacustres des environs de Montpellier, de l'Aude et de la Provence 1862. — Th. Ebray sur la ligne de propagation de quelques fossiles, etc. 1862. — Cotteau rapport sur les progrès de la géologie et de la paléontologie en France pendant l'année 1861. Nekrologe: Bronn, Menke (nachträglich), Coudert.

Zweite Lieferung 1. April 1863. S. 129—224 und 4 Tafeln.

— Bemerkung über die malakologische Fauna der Umgegend von Kieff; von Jelski. S. 129—137. Aufzählung von 77 Arten von Land- und Süßwassermollusken, worunter als neu beschrieben: *Valvata Menkeana* (p. 136. pl. 6. f. 4).

— Bemerkungen über den Weinkauff'schen Catalog der Seekonchylien von Algier; von Petit de la Saussaye. S. 137—144. Aufzählung mehrerer in demselben nicht vorkommender und kritische Bemerkungen über verschiedene der genannten Arten.

— Ueber das Vorkommen des *Hinnites sinuosus* an den Küsten der Bretagne; von F. Daniel. S. 144—146.

— Ueber das Embryonalgehäuse des *Dolium pernix*; von P. Fischer. S. 147—149. Taf. 6. Fig. 7. Der Vf wirft die Frage auf, ob nicht die Gattung *Macgillivrayia* ein ähnlicher Larvenzustand sein möge?

— Ueber die im Mittelmeer lebenden Arten von *Cassidaria*; von N. Tiberi. S. 150—155. Die verschiedenen angeführten Arten werden auf 2: *echinophora* L. und *Tyrrhena Chemn.* reducirt.

— Beschreibung einer neuen Art von *Xenophora*; von N. Tiberi. S. 155—158: *X. mediterranea* p. 157. pl. 6. f. 1.

— Beschreibung neuer Arten aus dem Mittelmeer; von

Tiberi: *Scalaria soluta* p. 159. pl. 6. f. 3; *Cerithium Crosseanum* p. 160. pl. 6. f. 2.

— Beschreibung neuer Arten von Neu-Caledonien u. s. w.: *Cancellaria Forestieri* Montr. p. 161. pl. 5. f. 7 von der Insel Art; *Canc. Montrouzieri* Sow. p. 163. pl. 5. f. 8 ebendaher; *Hydrocena maritima* Montr. p. 165. pl. 5. f. 4; *Dolium Testardi* p. 166. pl. 5. f. 6, Insel Pot; *Tornatella alveola* Sow. p. 167. pl. 5. f. 9, Insel Art; *Stomatella stellata* Sow p. 169. pl. 5. f. 10 von Art; *Marginella suavis* Sow. p. 170; *Helicina Fischeriana* Montr. p. 171. pl. 5. f. 3, Insel Woodlark; *Helix Woodlarkiana* Sow. p. 172. pl. 5. f. 2; *Helix Isabellensis* Sow. p. 173. pl. 5. f. 1; Insel Isabella, Salomons Archipel; *Neritina Souverbiana* Montr. p. 175. pl. 5. f. 5.

— Diagnose einer neuen Glauconome; von Crosse und Debeaux: *G. Primeana* p. 177 aus Nordchina

— Neue Arten des Caledonischen Archipels; von Crosse: *Monodonta Bourcierei* p. 178. pl. 6. f. 6; *Trochus Fournieri* p. 180. pl. 6. f. 5.

— Systematisches Verzeichniss der Belemniten der Juraformation, nebst Beschreibung neuer Arten; von C. Mayer. S. 181—194. Die 15 neuen Arten sind: *Belemnites alter*, *Oosteri*, *macilentus*, *Oppeli*, *Möschi*, *paxillus*, *virgatus*, *praecursor*, *Escheri*, *Heberti*, *neglectus*, *helveticus*, *Bernensis*, *redivivus*, *Argovianus*.

— Neue fossile Gattung und neue Arten aus dem Becken von Paris und Biarritz; von de Raincourt und Munier-Chalmas. Die neue Gattung heisst *Goodalliopsis* (p. 194) *Orbigny* p. 195. pl. 8. f. 3 — ferner: *Jouannetia Thelusioniae* p. 196. pl. 8. f. 4; *Cypricardia Heberti* p. 197. pl. 8. f. 1; *Modiola arenularia* p. 198. pl. 8. f. 2; *Emarginula Parisiensis* p. 199. pl. 7. f. 5; *Tornatella Deshayesi* p. 199. pl. 7. f. 3; *Odostomia Verneuilensis* p. 200. pl. 7. f. 8; *Lacuna disjuncta* p. 201. pl. 7. f. 2; *Lacuna cliona* p. 201. pl. 7. f. 1; *Littorina solida* p. 202. p. 7. f. 4;

Scalaria Deslongchampsii p. 202. pl. 7. f. 7; *Scalaria Pellati* p. 203. pl. 7. f. 6.

— Ursprung der grauen Ambra; von Crosse. S. 204—208.

— Bibliographie. Proceed. Zool. Soc. of London 1861. — Ryckholt Mélanges paléontologiques. — Bourguignat Malacologie du lac des Quatre-Cantons et de ses environs. 1862.

— Bemerkungen über kupferhaltige Austeru S. 221—224.

Dritte Lieferung. 1. Juli 1863. S. 225—312 und 2 Tafeln.

— Ueber die Metamorphosen der *Jouannetia Cumingii*; von P. Fischer. S. 225—229. Taf. 11.

— Antwort von Weinkauff auf Bemerkungen von Petit über W.'s Verzeichniss der Algierischen Mollusken S. 230—234.

— Ist die Gattung *Planorbis* rechtsgewunden? Von O. Mörch. S. 235—239. Durch das Studium der Monstrositäten gelangt der Vf. dahin sie für links gewunden zu erklären. Hinzugefügt sind einige Bemerkungen über die Gattung *Choanomphalus*.

— Notiz über die Malakologie einiger Punkte des chinesischen Littorales; von O. Debeaux. S. 239—252. Verzeichniss der zu Hong-Kong, Amoy, Shang-hai, Tche-Fou, Fort Taku gefundenen Mollusken und über deren Gebrauch in China

— Neue oder wenig bekannte Molluskenarten des chinesischen Littorales; von Crosse und Debeaux. *Miya arenaria* L. zu Tche-Fou gefunden; *Soletellina japonica* Desh. ebenda; *Fragilia Yantaiensis* n. sp. p. 255. pl. 9. f. 2; *Glaucanome Primeana* p. 256. pl. 9. f. 1; *Unio Tientsinensis* n. sp. p. 257. pl. 10. f. 1; *Littorina Souverbiana et brevicula*, *Cerithium fluviatile* var. *microptera* p. 261; *Natica Fortunei* p. 262. pl. 9. f. 5; *Rapana Bezoar* var.; *Cancellaria Spengleriana*; *Cancellaria Bocageana* n. sp. p. 263. pl. 9. f. 3.

— Beschreibung einer neuen Helicine; von Crosse und Debeaux: *H. oxyrhyncha* p. 266. pl. 9. f. 4, von unbekannter Herkunft.

— Neue Ampullaria von Madagascar; von Morelet: *A.* (Lanistes) *Grasseti* p. 267. pl. 10. f. 2.

— Neue Arten von Poulo-Condor (Cochinchina); von Crosse und Fischer. *Helix Boueyi* p. 269. pl. 9. f. 7; *Emea Michauxi* p. 270. pl. 10. f. 4 (wohl eher zu Streptaxis zu zählen, wie ich nach Exemplaren der Cumingschen Sammlung annehme); *Emea bulbulus* Mor. p. 272. pl. 10. f. 3 (wohl ebenfalls Streptaxis).

— Neue australische Helix; von Crosse: *H. Lorioliana* p. 273. pl. 9. f. 6.

— Neue Arten aus dem caledonischen Archipel; von Souverbie und Montrouzier. *Helix Baladensis* Souv. p. 276. pl. 12. f. 1; *Turbo laetus* Montr. p. 277. pl. 12. f. 2; *Trochus constellatus* Souv. p. 279. pl. 12. f. 3; *Columbella pumila* Souv. p. 281. pl. 12. f. 4; *Montrouziera* gen. nov. Souv. p. 282: *clathrata* p. 284. pl. 12. f. 5; *Lepton translucentum* Souv. p. 285. pl. 12. f. 6; *Kellia subrugosa* Souv. p. 286. pl. 12. f. 7; *Poronia australis* Souv. p. 287. pl. 12. f. 8.

— Neue fossile Muschelgattung: *Anisocardia Munier Chalmas* p. 288; *elegans* p. 290. pl. 11. f. 5—8.

— Bibliographie. — Bourguignat Malacologie de l'Algérie. Fasc. 1 et 2. (darin wieder 20 neue Helixarten). — Baudouin nouveau catalogue des moll. du départ. de l'Oise 1862. — Humbert nouveau genre de Mollusque pulmoné terrestre (Tenentia) 1862. — Hall Contributions to Paleontology. 1862. — Gervais des notions relatives aux Céphalopodes, qui sont consignées dans Aristote. — Bourguignat mollusques de San-Julia de Loria (Pyrenäen — darin 3 neue Pupa). — Loriol descr. des animaux invertébrés fossiles du mont Salève 1863. — Seguenza Paleontologia malacologica: Fissurellidae. 1862. — Colbeau matériaux pour la faune de Belgique 1859. — A. Villa gîte malacologique, etc. 1863. — Bourguignat Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus. Fasc. 1 et 2. 1863.

Vierte Lieferung. 1. October 1863. S. 313—424 und 4 Tafeln.

— Documente über die Polarkügelchen des Molluskeneies; von P. Fischer. S. 313—319.

— Zur Naturgeschichte der Patellen; von P. Fischer. S. 320—325.

— Ueber *Helix Hauffeni* F. Schmidt; von Crosse. S. 325. Taf. 13. Fig. 4.

— Konchyliologische Miscellen; von Petit de la Saussaye. — Bemerkungen über *Murex Benoitii* Tib. p. 328; *Purpura brevis* Blainv. p. 329; *Mytilus crispus* Cantr. p. 330; *Pleurotoma undatigera* Biv. p. 331; *Oliva nana* Lam. p. 333; *Ovula purpurea* Risso p. 334; *Turbonilla Weinkauffi* Dunk. p. 335; *Neritina Showalterii* Lea p. 336 und über Wanderungen der Süßwassermollusken.

— Bemerkungen zum Verzeichnisse der Algierschen Seemollusken; von Aucapitaine. S. 338—342.

— Malakologische Fauna von Cochinchina; von Crosse und Fischer. Neue Arten: *Zonites Benoitii* p. 346. pl. 14. f. 4; *Helix Annamitica* p. 347. pl. 14. f. 3; *H. Weinkauffiana* p. 350; *H. Condoriana* p. 351. pl. 14. f. 1; *H. Tanquereyi* p. 353. pl. 14. f. 2; *Bulimus Annamiticus* p. 357; *Planorbis Saigonensis* p. 362. pl. 13. f. 7; *Leptopoma Michauvi* p. 367. pl. 14. f. 7; *L. Condorianum* p. 369. pl. 14. f. 8; *Quoyia Michauvi* p. 375. pl. 13. f. 6; *Columbella Michauvi* p. 377. pl. 13. f. 5.

— Neue Arten; von Crosse. *Clanculus Yatesi* p. 379. pl. 13. f. 1 von Südaustralien; *Trochus Tiberianus* p. 381. pl. 13. f. 2 ebendaher; *Valvata Jelskii* p. 382. pl. 13. f. 3 aus dem Dnieper bei Kieff; *Globulus Thomasi* p. 384. pl. 13. f. 8. von Japan.

— Neue Arten; von Crosse und Debeaux. *Helix Arcasiana* p. 386 von Shanghai; *Yantaiensis* p. 387 von Nordchina; *Munieriana* p. 387 desgl.; *Frilleyi* p. 387 desgl.

— Neue Arten; von Crosse. *Streptaxis Deshayesianus* p. 388; *Cylindrella Swiftiana* p. 388.

— Die Austernformation im Dianenteich auf Corsica; von Auca pitaine. S. 389—393.

— Bibliographie. Deshayes Catal. d. Moll. de la Réunion (neue Mytilaceengattung *Prasina*, ferner 6 neue *Helix*, 5 Pupa, u. s. w.). — H. & A. Adams fünf neue Molluskengattungen und andere kleine Schriften von A. Adams. — Dubrueil cat. d. moll. terr. et fluv. de l'Hérault. 1863. (Vgl. die Anzeige desselben Werkes von Martens. (Mal. Bl. 1864. Lit. S. 11).

(Fortsetzung folgt.)

Pfr.

Monographie du genre Conus, par le chevalier A. Bernardi. Accompagnée de deux planches coloriées faisant suite aux monographies de Reeve, Kiener et Sowerby.

Diese schön ausgestattete Schrift, welche im Jahre 1861 im Verlage eines für die Naturwissenschaften sehr thätigen jungen Buchhändlers, des Herrn J. Rothschild (41, Rue du Bac) in Paris erschienen ist, enthält auf 24 Seiten in gross 4^o und 2 fein kolorirten Tafeln die Beschreibungen und Abbildungen von 17 Arten der artenreichen Gattung *Conus*, welche zwar in den letzten Jahren schon publicirt sind, aber mit Ausnahme des *Recluzianus* in allen Monographien der Gattung noch fehlen. Es sind folgende: *C. Cabritii* Bern. p. 5. pl. 1. f. 8; *Caelinae Crosse* p. 6. pl. 2. f. 11; *Ceciliae Crosse* p. 8. pl. 2. f. 12; *Henoquei* Bern. p. 9. pl. 2. f. 13; *Chenui Crosse* p. 10. pl. 2. f. 18; *Couderti* Bern. p. 11. pl. 2. f. 17; *Lienardi* Bern. & Cr. p. 11. pl. 1. f. 3; *Crosseanus* Bern. p. 13. pl. 1. f. 2. 6; *Daullei Crosse* p. 15. pl. 2. f. 16; *Guestieri Lcrois* p. 16. pl. 1. f. 10; *Lubeckianus* Bern. p. 17. pl. 1. f. 9; *Pazii* Bern. p. 18. pl. 1. f. 4; *Macaræe* Bern. p. 19. pl. 1. f. 1; *Recluzianus* Bern. p. 20. pl. 1. f. 5; *Robillardi* p. 21. pl. 2. f. 15; *Rol-*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [11L](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Journal de Conchyliologie. 14-31](#)