

**737. *H. pila Adams.***

Synon.: *Pfr. Mon. Suppl.* p. 140. — *Reeve* t. 63. n. 322.  
— *Zonites pila Shuttl.* p. 121. Herr Sh. citirt:  
*H. Pila Pfr.* ex parte, und ebenso bei *H. Foremaniana*.  
Ich weiss nicht, was dies ex parte heissen soll, da ich  
nur Adams'sche typische Exemplare beschrieb und  
(Chemn. ed. nov. t. 126. f. 13) abbildete, ganz über-  
einstimmend mit Reeve's oben citirter Figur. Ent-  
weder ist diese Art *H. Foremaniana Ad.* oder *H. pila*  
*Ad.*, aber nicht beides ex parte.

**738. *H. lamellifera Adams.***

Synon. *Pfr. Mon. Suppl.* p. 141. — *Reeve* n. 318. t. 63  
(von Shuttl. nicht citirt). — *Zonites lamellifera*  
*Shuttl.* p. 119.

**739. *H. osculans Adams.***

Synon.: *Pfr. Mon. Suppl.* p. 141. — *Reeve* n. 315. t. 63?  
— *Zonites osculans Shuttl.* p. 122.

Ausser diesen zählt Hr. Sh. zu derselben Gruppe die  
*H. epistylilulum Ad.*, welche jedenfalls in meiner künst-  
lichen Anordnung hier keinen Platz finden kann, wenn man  
auch das Ungenabeltsein und die innere Lamelle nicht als  
nothwendige Charaktere der Gruppe Sagda betrachten will.

---

**Zur Gattung *Amphipeplea* Nilss.**

Vom Dr. L. Pfeiffer.

Es ist mir nicht bekannt geworden, dass in neuerer  
Zeit Arten dieser interessanten Gattung beschrieben wären,  
ausser derjenigen, welche ich in den Proc. Zool. Soc. 1845.  
p. 68 unter dem Namen *A. Cumingiana* \*) publicirte, bei

---

\*) *A. testa ovato-globosa, tenuissima, longitudinaliter confertim stria-  
tula, nitidissima, pellucida, pallide cornea; spira brevissima, mucronu-  
lata, callo tenui semiobtecta; columella nulla; margine anfractuum interno  
arcuato, appendice membranacea (decidua) munito; apertura amplissima,*

welcher nach des Entdecker's H. Cuming Mittheilungen über das Thier — in seinen Notizen war sie als „*fresh-water Bulla*“ bezeichnet — hinsichtlich der Gattung kein Zweifel obwalten kann. Weniger sicher ist dies bei einer andern, mir gegenwärtig vorliegenden Art, welche, da ich nichts von dem Thiere weiss, nur nach Analogie der Schale als zur Gattung *Amphipeplea* gehörig betrachtet werden kann. Ich nenne sie:

*Amphipeplea Strangei Pfr.*

T. globoso-ovata, tenuis, subtilissime striatula, sericina, pellucida, pallide cornea; spira brevis, inflata, mucronata; anfr.  $3\frac{1}{2}$  tumidi, ultimus  $\frac{3}{4}$  longitudinis formans, tumidus; apertura obliqua, acuminato-ovalis; perist. rectum, acutum, marginibus callo dilatato junctis, columellari libero, usque ad apicem conspicuo, subcalloso, prominulo, leviter arcuato. — Long. 23, lat. max. 18 mill. Apert. 18 mill. longa, medio 11 lata. (Mus. Cuming.)

Habitat Moreton-Bay Australiae (Strange.)

---

Notiz.

Im dritten oder Supplementbande meiner Monographia *Heliceorum* sind durch Versehen 2 *Bulimus*-Arten ausgeblichen, welche an folgenden Stellen einzutragen sind:

**149a.** *Bul. Tupacii Orb.* (Coll. 75 $\frac{1}{2}$ . — *Reeve* N. 86. t. 15. f. 86a—c. — *Scutalus Alb.* p. 160.) Vid. Mon. II. p. 52.

**234a.** *Bul. Dunkeri Pfr.* (Coll. 114 $\frac{1}{2}$ . — *Reeve* N. 533. t. 74. — *Mesembrinus Alb.* p. 157.) Vid. Mon. II. Pfr. p. 101.

---

semiovali, margine supero breviter arcuato, patente. — Long. 30, diam. 22 mill. Ap. 26 mill. longa. — Found at Naga, province of South Camerines, island of Luzon, by H. Cuming, Esq. (Pfeiffer l. c.)

---

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Zur Gattung Amphipelea Nilss 63-64](#)