

mediterranea“ of prof. O. G. Costa 1873. — Pouchet description de quelques nouvelles espèces du genre Patelle. 1868. — Grube Mittheilungen über Saint-Malo und Roscoff und die dortige Meeres- besonders die Anneliden-Fauna. Pfr.

M i s c e l l e n

von

H. Dohrn.

1. *Bulimus Cordovanus* Pfr. ist Anfangs mit dem Fundorte „Andes near Cordova“ angegeben, im letzten Bande von Pfr. Mon. p. 75 steht „Cordova, Veracruz.“ Da ich vermüthe, dass das beigefügte Veracruz auf das Cordova hindeuten soll, so will ich bemerken, dass die Art von meinem Freunde Dr. Stelzner in grösserer Zahl in der Umgegend des argentinischen Cordova gesammelt worden ist, wo sie auch als Miniaturform von *Macrodonates* zu den andern gezahnten *Bulimus* des transaequatorialen Amerika hingehört. Ich erhielt sie unter dem vielleicht auch anderweit in Anwendung gekommenen Manuscriptnamen *Scalarinella Stelzneri Doering*.

2. *Bulimulus (Scutalus) Stelzneri n. sp.*

Testa profunde rimata, ovato-conica, tenuiuscula, dense et irregulariter rugoso-striata, sordide albida, apice minuto, sublaevi; spira conica; anfract. 5—6 modice convexi, ultimus spiram superans, antice effusus; columella profunde et obsolete plicata; apertura subverticalis, ovalis, intus albescens, nitida; peristomium simplex, margine dextro vix expanso, basali dilatato breviter expanso, columellari dilatato, patente.

Long. 23—28, lat. 14—20; ap. long. 13—18, lat. 8—11 mill.

Habitat in republica Argentina: Cerro de Chepe.

Steht am nächsten in der Form den *Bul. Proteus* und *derelictus*, zeigt auch dieselbe Neigung zum Variiren in Form und Grösse, unterscheidet sich von beiden durch die Sculptur, die dünne Schaale und die Form des Nabels. Ich erhielt dieselbe in einigen Exemplaren von meinem Freunde Dr. A. Stelzner mit einer grösseren Suite argentinischer, von ihm gesammelter Land- und Süsswasser-Conchylien. Da die andern unbeschriebenen Arten Manuscriptnamen von Herrn Dr. Doering in Cordova führen, so steht wohl deren Publikation in Bälde zu erwarten, und will ich demselben nicht vorgreifen.

3. *Buliminus (Rhachis) pallens* Jonas.

Von der Goldküste erhielt ich vor einigen Jahren eine Art Rhachis, die ich mit keiner beschriebenen Species zu identificiren vermochte, und vorläufig in meiner Sammlung als *B. Finschi* bezeichnete. Dieser Name ist in dem Pael'schen Sammlungscatalog abgedruckt worden, darf aber nicht bestehen bleiben, da die Art in jungen Exemplaren bereits als *B. pallens* Jonas beschrieben ist. Die Art zeigt in der Färbung gerade dieselben Varietäten wie mein *B. Burnayi* von Ilha do Principe. Dagegen ist sie schlanker und länger gezogen, als alle verwandten Arten, mit ganz flachen Windungen, die Schale ist etwa von gleicher Stärke, wie bei *B. neuricus* Reeve. Sie hat bei 7 Windungen folgende Dimensionen:

Long. 22, lat. 9, ap. long. 11, lat. 6 mill.

Bemerkungen über einige Landschnecken aus Liberia.

Von

Dr. H. Dohrn.

1. *Streptaxis Monrovia* Rang.

Nachdem diese Art in ein paar hundert Exemplaren in meine Hände gelangt ist, bin ich im Stande, zwei Arten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Dohrn Anton Felix

Artikel/Article: [Miscellen 202-203](#)