

Diagnose einer neuen Cistula.

Von

Dr. L. Pfeiffer.

Cistula Aguadillensis Pjr.

T. perforata, oblongo-turrita, truncata, solidula, liris spiralibus superne vix prominentibus, in anfractibus ultimis distinctioribus, subapproximatis, lineisque filaribus confertissimis, illas transcurrentibus decussata, vix subnitidula, rubello-fulva; spira regulariter attenuata, anguste truncata; sutura mediocris, nodulis fasciculato-striatis subcrebre denticulata; anfr. superst. $5\frac{1}{2}$ —6, convexiusculi, ultimus basi rotundatus, circa perforationem liris spiralibus fortioribus munitus, antice brevissime solutus, dorso carinatus; apertura verticalis, ovalis, superne subangulata, intus nitida; perist. duplex, internum continuum, vix prominulum, expansiusculum, externum ad anfr. contiguum excisum, superne angulato-lingulatum, caeterum peranguste patens. — Operc. normale. — Long. 18, diam. 6 mill. Apert. intus 4 mill. longa, $3\frac{1}{2}$ lata.

Habitat prope Aguadilla insulae Portorico (Dr. J. Gundlach).

Diese wie es scheint noch unbeschriebene Art ist wohl mit *Cistula rostrata* Pjr., deren Vaterland noch unbekannt geblieben ist, in mehrfacher Beziehung nahe verwandt, aber sogleich durch ihre viel schlankere Gestalt und die viel geringere Entwicklung des äusseren, sehr schmal abstehenden Mundsaumes, u. s. w. zu unterscheiden.

L i t e r a t u r.

Museum Godeffroy. Catalog V. Nebst einer Beilage, enthaltend topographische und zoologische Notizen. 1874. (214 Seiten.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Diagnose einer neuen Cisula. 207](#)