

würde glauben, dass diese Art mit der ebenfalls 1875 von H. Adams publicirten *Pupinopsis Angasi* von den Louisiaden (*Pfr. Mon. Pneum. IV. p. 412*) identisch wäre, wenn nicht die Bildung des Columellarrandes den Beschreibungen nach sehr abweichend erschiene. — 10. *Epidromus Bednalli* p. 6 aus Süd-Australien, verwandt mit *E. Brazieri Ang.* und *Coxi Braz.* — 11. *Cypræa Sophiæ* p. 7, San Cristoval, Salomons-Archipel, ähnlich *C. erronea*. — 12. *Conus* (Rhizoconus) *Sophiæ* p. 7 von den Salomons-Inseln. — 13. *Cassis* (Casmaria) *Thomsoni* p. 8 von Sydney Heads. — 14. *Bithinia hyalina* p. 9 von New-South-Wales.

Ein zweiter Aufsatz desselben Verfassers enthält die Beschreibungen von 8 australischen und tasmanischen Land- und Süßwasserschnecken. 1. *Helix* (Hadra) *rufofasciata* p. 17 von Süd-Australien, ähnlich *H. Cassandra Pfr.* — 2. *H.* (Hadra) *Cookensis* p. 17 von Cook-Town, Nordostküste von Australien. — 3. *H.* (Rhytida) *Langleyana* p. 18 von Macquarie Harbour, Westküste von Tasmania, mit *H. Milligani* verwandt. — 4. *H.* (Charopa) *impera* p. 18 von King George's Sound, Südwestküste von Australien. — 5. *Pupa* (Vertigo) *Rossiteri* p. 18 von New-South-Wales, rechtsgewunden, von Cox (*Mon. Austr. landsh. t. 14. f. 18. 18 A* als Varietät von *P. Strangei Pfr.* abgebildet. — 6. *Amnicola Petterdiana* p. 19. — 7. *Amnicola Simsoniana* p. 19. — 8. *Planorbis meridionalis* p. 20. Letztere 3 von Tasmania.

---

Journal de Conchyliologie (Crosse & Fischer).  
XXIV. (Forts. von Malak. Bl. XXIII. p. 27—39.)

Erste Lieferung. 1. Januar 1876. S. 1—136.  
Taf. 1—3.

— Monographie der Gattung Rhodea; von H. Crosse.  
S. 1—24. — Wenn die Gattung Rhodea nicht bereits in den letzten Jahren sich als eine vollkommen be-

gründete erwiesen hätte, so würde der letzte Zweifel durch die vorliegende in streng wissenschaftlicher Form bearbeitete Monographie beseitigt sein. Dieselbe behandelt zunächst das Geschichtliche der Gattung, sodann ihre Charaktere (neue Gattungsdiagnose S. 13) und Verwandtschaften, nach welchen Vf. sie nach dem Vorgehen von Dohrn als zunächst neben die Gattung *Stenogyra* gehörig betrachtet, und endlich Aufzählung der 3 bis jetzt bekannten Arten mit vollständiger Literatur und neuen ausführlichen Diagnosen. Es sind diese: *Rh. Pfeifferi* Crosse p. 14. pl. 1. f. 1, 1a, 1b (ehemals *californica* Pfr., welcher Name wegen der entschieden irrigen Vaterlandsbezeichnung allerdings nicht beibehalten werden konnte), *gigantea* Mouss. p. 18. pl. 1. f. 2, 2a und 2b, und endlich *Wallisiana* Dohrn p. 21. pl. 1. f. 3. 3a, 3b. Alle 3 von Neu-Granada. (Vgl. Pfr. Mon. Helic. VIII. p. 253.)

— Ueber die von Dr. Sievers in den transcaucasischen Gegenden gesammelten Konchylien; von Mousson. Zweiter Artikel. (S. Malak. Bl. XXII. S. 94.) — Nach einer kurzen Uebersicht der neueren hier einschlagenden Literatur finden wir dann geographische und andere Bemerkungen über schon bekannte und Diagnosen der neu aufgestellten Arten. Es sind: *Hyalina* (Mesomphix) *semisculpta* p. 26. pl. 2. f. 1, *H.* (Euhyalina) *subnitidosa*, *H.* (Crystallus) *contortula* Kryn., *Patula ruderata*, *Helix* *Derbentina*, *hispida* var. *hispidosa* Mouss., *frequens*, *globula*, *H.* (Fruticola) *septemgyrata* p. 29. pl. 2. f. 2, *Nordmanni*, *Narzanensis*, *pratensis*, *Ravergiensis*, *transcaucasica* Bayer p. 31 (bisher als Var. der *Ravergiensis* betrachtet), *delabris*, *armenica*, *Appeliana* p. 32. pl. 2. f. 3, *Ghilanica* p. 33. pl. 2. f. 4, *Buliminus* (Petraeus) *brevior* p. 34. pl. 2. f. 5, *Mesopotamicus* Mart., (Chondrus) *diffusus* p. 36. pl. 2. f. 6, *Ghilanensis* Iss., *Pupa* (Pupilla) *superstructa* p. 37. pl. 2. f. 7, *trifilaris*, *signata* Mouss. (2 var.), *minutissima*, (Pupilla) *micula* p. 40, *si-*

*nuata*, *Clausilia Sieversi* Pfr., (Alinda) *fusorium* p. 41. pl. 2. f. 8, *ossetica* Bayer, (Marpessa) *Raddei* p. 43. pl. 4. f. 3 (ob zu *Somchetica* Pfr. gehörig?), *Cionella lubrica*, *Glandina algira?*, *Succinea Pfeifferi*, *oblonga*, *Linnea peregra*, *auricularia*, *Planorbis marginatus*, *Cyclotus Sieversi*, *Cyclostomus caspicus* p. 46. pl. 4. f. 2, *Vivipara Costae* Heldr. p. 47. pl. 4. f. 1, *Unio Hueti Bourg.*, *Anodonta anatina* L.

— Malakologische Fauna des Thales von Cauterets, nebst Bemerkungen über die Vertheilung der Mollusken in den Pyrenäen; von P. Fischer. S. 51—84. Mit einer Tafel.

— Ueber einige neue oder wenig bekannte Conchylien der östlichen afrikanischen Inseln; von A. Morelet. S. 85—91. — 1. *Helix fulgurata* Sow. stammt von Madagascar. — 2. *H. Geoffreyi* H. Ad. scheint fast mit *H. proletaria* zusammenzufallen. — 3. *Cyclostoma Dupontianum* sp. n. p. 86. pl. 3. f. 1 von Madagascar. — 4. *C. obsoletum* Lam. Deckel. — 5. *C. citrinum* Sow. von Madagascar, nicht von Trinidad, wo *C. rugosum* Sow., welches früher für identisch mit jenem gehalten wurde, lebt. *C. rugosum* Sow. muss daher den früher wegen *C. rugosum* Lam. gegebenen Namen *C. semidecussatum* Pfr. wieder erhalten. — 6—8. *C. Boivini*, *aplustre* und *Kraussianum*. Deckel. — 9. *C. defloratum* p. 88. pl. 3. f. 3, subfossil von der Insel Bourbon. — 10. *C. Philippianum*. Deckel von Otopoma, wie auch 11. *C. Coquandianum* Pet. — 12. *Megalomastoma croceum* Sow. von Madagascar, nicht Mauritius. Deckel hornartig, dünn, platt, spitz oval, röthlich, mit 4 etwas erhobenen Windungen und homogenem, centralem Nucleus. — 13. *Planorbis Mauritanus* p. 91. pl. 3. f. 7 von Mauritius.

— Beschreibung eines neuen Nudibranchiers von Neu-Caledonien, nebst Verzeichniss der Arten der Gattung *Ceratosoma*; von P. Fischer. *Ceratosoma caledonicum* n. sp. p. 92. Die übrigen Arten der Gattung,

welche von Fischer zu den Polyceriden gezählt wird, sind: *C. trilobatum* Gray, vielleicht identisch mit der folgenden, *cornigerum* Ad. & Reeve und *gracillimum* Semp.

— Bemerkung über *H. Buvinieri* Michaud; von P. Fischer. — Diese Art ist in Act. Soc. Linn. Bord. 1841. XII. p. 64 gut beschrieben, was den neueren Autoren unbekannt geblieben war, so dass sie später von mir unter dem Namen *Helix asturica* als neu beschrieben und auch von Hidalgo abgebildet wurde.

— Bemerkungen über einige Landschnecken der Insel Kauai; von H. Crosse. — Abgebildet werden einige früher von Harper Pease im Journ. Conch. 1870 beschriebene Achatinellen. Aus der Section Lep-tachatina: *turgidula* pl. 4. f. 5, *costulosa* pl. 3. f. 4, *balteata* pl. 4. f. 4, *tenebrosa* pl. 3. f. 5, *laevis* pl. 4. f. 6, *antiqua* pl. 3. f. 6. Aus der Section Amastra: *sphaerica* pl. 1. f. 5. 5a und *rugulosa* pl. 1. f. 4. 4a.

— Ueber die Gattung *Heterocyclus*; von Crosse. S. 99—101. — Diese im Journ. Conch. XX. 1872. p. 355 als muthmasslich zu den Cyclophoriden gehörig aufgestellt und danach auch in meiner Mon. Pneum. IV. p. 54 aufgenommene Gattung ist nach neueren Mittheilungen des Entdeckers eine Wasserschnecke, wahrscheinlich zu den Valvatiden gehörig. Herr Crosse vermuthet, dass *Valvata pupoidea* Gould zu derselben Gattung gehören möge.

— Diagnosis Ampullariae novae, Guyanae gallicae incolae; auct. H. Crosse. *Ampullaria Schrammi* p. 102.

— Neue Mollusken aus den paläozoischen Schichten der Umgegend von Rennes; von E. Munier-Chalmas. — 1. *Oriostoma* (nov. genus) *Barrandei* p. 103, *Naticopsis Sirodoti* p. 103, *Littorina Hermitei*, *Murchisonia Delagei*, *Pleurotomaria Larteti* und *Tentaculites Velaini* p. 104, *Adranaria* (nov. genus) *Tromelini* p. 105, *Crossei* p. 106, *Lyrodesma* (nov. gen.) *gallica*, *Lebes-*

*cont* et *Sacheti* p. 106, *Cardiolaria* (nov. gen.) *Barrandei* p. 107, *Modiolopsis Heberti* et *Edgelli* p. 107, *Zejsneri* p. 108, *Grammisia Armorica*, *Hallei*, *Lyelli* et *Murchisoni* p. 108, *Modiolopsis Delagei* p. 109.

— Beschreibung neuer Mollusken aus der Tertiärformation Dalmatiens; von S. Brusina. — *Melanopsis camptogramma* p. 109, *astrapaea* p. 110, *Prososthenia decipiens* p. 111, *Fossarulus moniliferus* p. 111, *armillatus* p. 112, *Neritina Sinjana* p. 113. — Berichtigung mehrerer früher als Varietäten betrachteter Formen.

— Bibliographie. — Species général et Iconographie des coquilles vivantes par Kiéner, continué par P. Fischer. Livr. 141—146. Genre Troque. 1875. — Pfeiffer Mon. Helic. viv. Vol. VII. fasc. 4. 1875. — E. A. Benoist Catalogue synonymique et raisonné des testacés recueillis dans les faluns miocènes des communes de la Brède et de Saucats. 2e partie. — Dupuy Note sur une espèce du genre Maillot, qui parait être nouvelle pour la malacologie 1873: *Pupa Baillensi*. — Carlo de Stefani descrizione di nuove specie di molluschi pliocenici italiani. 1875.

Nekrologie: Deshayes — Charles des Moulins — L. A. Lafont — Terver — Schramm — Baudelot — Lyell — J. E. Gray — Lowe.

Zweite Lieferung 1. April 1876. S 137 — 216. Taf. 4—7.

— Bericht über die von Dr. Sievers im asiatischen Russland gesammelten Konchylien; von Mousson. Dritter Artikel. 1. *Helicarion Sieversi* p. 137. pl. 5. f. 1 von Tabizhuri. — 2. *Hyalina subnitidosa* ebendaher. — 3. *Helix crenimargo Kryn.* var. *obtusior* p. 139. — 4. *H. Narzanensis*. — 5. *H. Eichwaldi* Pfr. — 6. *Bulinus brevior*. — 7. *Chondrus seductilis*. — 8. *Chondrus tricollis* Mouss. p. 141. pl. 5. f. 2. — 9. *Ch. sagax*. — 10. *Pupa bifilaris*. — 11. *P. signata*. — 12. *P. pygmaea*



var. *nitidula* p. 143. — 13. *Clausilia Somchetica* Pfr. — 14. (Mentissa) *acuminata* p. 144. pl. 5. f. 4 von Tabizhuri. — 15. (Alinda) *griseo-fusca* p. 145. pl. 5. f. 3 ebendaher. — 16. *Succinea Pfeifferi*. — 17. *Limnaea peregra* var. *solidula* p. 146. — 18? *L. microcephala* Küst. — 19. *Planorbis subangulatus*. — 20. *Valvata piscinalis*.

— Synonymik und Aufenthalt einiger Mollusken von Neu-Caledonien; von Fischer S. 148—151. — *Pedipes Jouani Montrouz.* ist nochmals beschrieben von Garrett in Proc. Ac. Philad. 1873. p. 236 als *subglobosus* von den Viti-Inseln, *Plecotrema Souverbiei Montrouz.* desgl. (ibid. p. 235) als *turrita* von Tavinni, *Rissoina Montrouzieri Sow.* desgl. (ibid. p. 209) als *supracostata* von den Viti-Inseln, *Odostomia interstriata Sow.* desgl. (ibid. p. 223) als *densecostata*, *Rissoina incerta Sow.* desgl. (ibid. p. 212) als *R. terebra*, *Pleurotoma scalata Sow.* desgl. (ibid. p. 222) als *Cithara melanostoma*; *Pleurotoma apiculata Montr.*, *nigrocincta Montr.*, *Columbella lactescens Sow.*, *Trochus fossulatus Sow.* werden sämmtlich von G. und H. Nevill als auch auf den Andamanen, theilweise auf Ceylon vorkommend angegeben; *Trochus Lamberti Sow.* wird für identisch erklärt mit *Tallorbis roseola Nevill* in Journ. As. Soc. XXXVIII. 1869. p. 160.

— Berichtigungen der Nomenclatur einiger *Scalaria*-Arten; von Tapparone-Canefri. S. 152—156. — Neue Namen werden vorgeschlagen: *simillima* für *principalis* Sow., non Pall., *Fischeriana* für *unicostata* Sow., non Orb., *microsoma* für *attenuata* Sow. non Pease, *jucunda* für *Constantia elegans A. Ad.* (= *Scalaria japonica Nyst*, non Dunk.), *Carpenteri* für *raricostata* Carp. non Lum. nec Sow. — Subgenus *Psychrosoma* für *Opalia* Carp. non H. & A. Ad., *Gouldi* für *Opalia borealis* Gould non Beck, *Crosseana* für *Opalia bullata* Carp.

non *Sow.*, *erronea* für *Mörchi Sow.* non *Ang.* — *Cirsotrema Kieneri* für *Scalaria decussata Kien.* non *Lam.*

— Bemerkungen über die malakologische Fauna von Cauterets; von P. Fagot. S. 156—158.

— Nachträgliche Bemerkung über *Helicina bicincta*; von Gloyne. — Die Art war nach einem unvollkommenen Exemplare beschrieben (*Pfr. Mon. Pneum.* IV. p. 250), die ausgewachsene Form (p. 159. pl. 5. f. 5) hat einen umgeschlagenen Mundsäum und gehört zu §. 23.

— Ueber *Bulinus Semanei Morelet*; von Morelet. S. 160. Taf. 4. Fig. 7. — Fällt wahrscheinlich mit *Bul. Bourguignati Letourn.* (*Pfr. Mon. Hel.* VIII. p. 87) zusammen,

Ueber das Vorkommen der Gattung *Haliotina* auf den Antillen; von Lechmere Guppy. S. 161—163.

— Ueber eine neue Varietät der *Voluta musica L.*; von Crosse. — Var.  $\zeta$  *polypleura* p. 163. pl. 5. f. 6.

— Diagnoses molluscorum novorum; auct. H. Crosse. — *Lucina Schrammi* von Guadeloupe S. 166, und *Ennea Dupuyana* von den Comoren. S. 167.

— Neue *Helix* von Madagascar: *Helix Sganziniana Crosse & Fisch.* p. 167. In der Mitte stehend zwischen *H. lanx* und *sepulcralis*.

— Beschreibung von fossilen Konchylien aus den oberen Tertiärschichten; von E. Mayer (Forts.) — 191. *Ostrea Brocchii* p. 168. pl. 6 et 7. f. 1. — 192. *Pecten* (Neithea) *Bollenensis* p. 169. pl. 6. f. 2. — 193. *Pecten* (Neithea) *Labnae* p. 170. pl. 6. f. 3. — 194. *Pecten* (Neithea) *Stazzanensis* p. 171. — 195. *Pecten Probsti* p. 173. pl. 6. f. 4. — 196. *Pecten Schilli* p. 174. pl. 7. f. 2. — 197. *Nucula Zahirae* p. 175. pl. 6. f. 5. — 198. *Cardium Probsti* p. 175. pl. 7. f. 3. — 199. *Cardium Kraussi* p. 176. pl. 7. f. 4. — 200. *Cardium reconditum* p. 177.

pl. 7. f. 5. — 201. *Tapes Partschii* p. 178. pl. 7. f. 6.  
202. *Siliqua suevica* p. 179. pl. 7. f. 7.

— Bibliographie. — Martini und Chemnitz. Neue Ausgabe. Section 71: Anodonta IV. 1874. Section 72 und 74: *Pyruca* et *Fusus* I. II. 1874. 1875. Section 73: *Conca* IV. 1875. Section 75: *Melania* I. von Brot. 1874. Section 76: *Pleurotoma* I. von Weinkauff. — Tapparone-Canefri Studio monografico supra i Muricidi del mar Rosso. 1875. — Carlo de Stefani Fossili pliocenici dei dintorni di S. Miniato. 1874. — E. Dumas Note sur la *Panopaea Aldrovandi* découverte à l'état subfossile dans l'ancien cordon de la Méditerranée. 1875. — E. Piette sur plusieurs genres nouveaux ou peu connus de Gastéropodes. 1874. — De Folin et Bérillon Faune malacologique de la région extrême S. O. de la France. 1875. — Sandberger. Die Steinheimer Planorbiden. 1873. — W. T. Blanford Description of a new *Helix* from Southern India (*H. Beddomci*). 1875. — Blanford Note on the molluscan genera *Coelostele* and *Francesia*, and on some species of landshells from Aden. 1875. — G. & H. Nevill Descriptions of new marine mollusca from the Indian Ocean. 1875. — Gwyn-Jeffreys and Norman Submarine-cable Fauna. 1875. — Weinkauff Catalog der Gattung *Conus*. 1874. — Pinart Voyages à la côte Nord-Ouest de l'Amérique. Hist. nat. 1875. — Smith a list of species of the genus *Planaxis*, etc. 1872. — Smith Descriptions of some new shells from Kerguelen's Island. 1875. — Gulick & Smith Descriptions of new species *Achatinellinae*. 1873. — H. Krebs On the Westindian *Rissoinae*. 1873. — Lechmere Guppy On the tertiary mollusca of Jamaica etc. 1866. — Guppy On the West-Indian tertiary fossils 1874. 1875. — Mörch Prodrômus faunae molluscorum Grönlandiae. 1875. — Piette Note sur les coquilles ailées des mers jurassiques. 1876. Pfr.

---



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Journal de Conchyliologie \(Crosse et Fischer\) XXIV. 185-192](#)