

Helicodiscus Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p.  
264: genus Patularum.  
(Species 10.)

~~~~~

**Synopsis molluscorum marinerum  
Indiarum occidentalium  
imprimis Insularum danicarum.**

auctore O. A. L. Mörch.

(Contin. vid. XXIII. p. 143.)

**Fam. Strombidae.**

*Gen. Strombus L.*

335. *Strombus gigas L.*

*πορφυρολ* s. *Purpura Roncera Genuensibus*, Ognatella Romanis Belon Aquat 1553. p. 419.

*Murex marmoreus Rondelet* 1554. p. 76. fig.

*Murex marmoreus Rondeleti Gesn.* 1558. p. 244.  
tab. XI.

*Murex aculeatus Gesn.* tab. X.

*Murex marmoreus Rondeleti Aldrov.* 1614. p. 334

*Murex marmoreus striatus et virgatus Aldrov.* p.  
337. (adult.)

*Murex aculeatus marmoreus Besl. rarior.* 1642.  
tab. XX.

*Lambis Rochefort Antill.* 1658 non fig.

*Murex* über  $\frac{1}{2}$  Elle lang. Olear. Gottorf. 1665.  
p. 61. t. 32. f. 57 = Besler.

*La Croqu du Lambis Du Tertre Hist. Antill.* 1667,  
2. p. 258.

*Voluta utrobis aperta Dan Major* 1675 fig. (frustum).

*Murex aculeatus* Grew Mus. reg. 1681. p. 125.

*Murex* quem piscatores in mari tranquillo americano prope urbem Carthagena expiscantur, Garocoo cornuto Italis vocatur Buon. Recr. 1681. f. 404—5. adult. (= List. 863) f. 303 (= List. 887.) (jun.)

*Murex magis auritus* Bon. f. 307—8.

*Murex pyramidalis* figura Bon. f. 303. (= List. 887.)

*Murex auritus* in mari Hispaniae americanae generatur Bon. 304.

*Bucc. ampullaceum striatum* clavicula muricata apertura leuiter purpurascente List. Hist. 1685. t. 886.

*Bucc. pictura* quadam undata List. 888. (= Rumph. 49. f. M.)

*Murex orthocentrus purpureus* Aldrov. List. 864. f. 19.

Bastard Switzer broek of Morgenstern Val. Mus. fig. 88. 90.

*Murex jamaicensis* Petiv. Gaz. t. 74. f. 1. (jun.)

*Murex bilinguis jamaicensis maximus* Petiv. Mem. for the Curious. 1708. p. 1089 n. 1.

id. spinis longis distantibus ib. n. 5.

id. Sloane Jam. 11. p. 247. in additam. p. 247. Lin. 35.

*Alata labro et columella suberocea* Mus. Richt. 1725 p. 318.

*Bucc. gallicum* Mus. Richt. 1725 p. 322.

*Murex aure admodum expansa* etc. Gualt. 1742 t. 33.

*Buccinum rugosum mucrone insigne* Gualt. fig. B. (jun.) E.

*Trochoconus muricatus gallicus* Klein. 1753. §. 192. p. 72. f. 85.

*Conchilium maximum* Browne Jam. 1756. p. 408.

*Admiralis vicarius* Knorr. V. t. 4. f. 11. (jun.) II. t. 29. f. 1. V. t. 4. f. 11.

*Strombus lucifer* L. X. n. 414. XII. n. 503. (jun.)

*Cochlis alata marmorea*. *Ala aquilina* Mart. 3. f. 824.

*Cochlis alata imperfecta*. *Alata mutilata gallica* ib. f. 878—81.

*Tutuschnecke*, *S. gigas*. Oldendorf, *Geschichte der Mission*, Barby 1777. p. 148.

*Pyramea lucifer* Linck Verz. 1807. p. 107.

var.  $\alpha$ . labro postice acute angulato.

*Murex maximus striatus* Gualt. t. 34.

var.  $\beta$ . (monstr.?) labro postice coarctato-lobato.

*Mus*. Gottw. t. 18. f. 128.

Hab. in 3 to 4 fathoms water on bluish sand; eats species of *Sphaerococcus* (*S. confervoides* Agard) King-shell (Krebs Cat. p. 2) Cuba (d'Orb. n. 298) Guadeloupe (Beau) Jamaica (Lister) Bermuda (Redf.) St. Thomas, St. Johns, St. Croix, Tortola, St. Barth and Carthagena (Krebs, Riise, Hornbek.) Gustavia, St. Barthelemy (Euphrasén Reise St. Barthelemi 1798. p. 135.)

var.  $\beta$ . John Bremers Bay St. Thomas, constant variety (Krebs).

Animal. Duclos Cheny Ill. tab. 1. ♂. Kien. tab. 1.

336. *Strombus Goliath* Chemn.

List. Hist. f. 862. f. 18<sup>a</sup>.

*Alata lata, costosa* Klein p. 100. §. 261. 1.

*Strombus goliath* Chemn. XI. 1795 p. 147. tab. 195 A.

*Strombus goliath* Wood Index 1828. t. 25. f. 23. (copi.)

*Strombus goliath* Gray Descr. Cat. p. 2.

*Alatus expansus* Le deployé Humphr. Cat. p. 39. n. 724?

$\alpha$ . t. angustata, apertura pallide carnea.

*Murex auritus maximus marm. exoticus* \*) Fab. Col. exot. 1610 Cap. XXXI.

*Murex marmoreus* Aldrov. 1614. p. 335. 36. fig. prona et supina.

*Strombus goliath* Duclos Chenu Ill. t. 38. (non tab. 28. f. 4).

*Strombus goliath* Chenu Man. f. 1581.

*Strombus goliath* Reeve Iconica t. 1. f. 1.

Hab. Westindien? (Spgl) Brasilia? (Humphr.) Guadeloupe (Beau, Fischer Cat. n. 858 p. 7.) Indian Ocean (Gray.)

Of the typical form I have seen single specimens in nearly all old collections. In the Museum of „Naturforschende Freunde at Berlin“ there is three specimens. Prof. Dunker has one. In Copenhagen one, besides the typical specimen and a young shell from a modern collection. The epidermis in this latter specimen is very thin and not like that of the preceding species, coriaceous.

### 337. *Strombus integer* Sws.

*T. planiuscula*, *solidula*, *albescens*; *spira elongata*, *acuta*, *conica*; *ultimo anfractu postice leviter noduloso*; *labro tenui expanso*.

Long. 200 mm.; lat. 150 mm.

Lister Hist. 1788. tab. 856 bene. = Fav. t. XX. f. A. 9.

*Strombus integer*, Swainsons Stromb, Gray Descr. Cat. June 1832. p. 2 n. 6.

Hab. „Florides“.

In 1869 I obtained by Mr. Landauer at Frankfurt a specimen from a french collection marked „*S. inermis Florides*“ exactly corresponding to Listers figure. It is the only I recollect to have seen.

---

\*) „Neapoli ab amico fontium constructore dono habuimus quindecim ab hinc annis.“

338. *Strombus inermis* Sws.

*T. planiuscula*, nodis parvis, labro tenue simplice.

*Strombus inermis* Sws. Blight. Cat. teste Gray.

*Strombus inermis* Sow. Thes. p. 35. n. 46. t. 10.  
f. 113.

*Strombus inermis* Desh. l. c. IX. p. 711 n. 34.

*Strombus inermis* Duclos Chenu Ill. t. 25. f. 4.

*S. accipitrinus* var. Reeve Icon. f. 14.

var. *a.* labro postice producto, linguæforme.

*S. Haitensis* Sow. Geol. Journ. VI. 1850. p. 48.  
t. IX. f. 7?

Hab. Antill. dan., verisim. I. St. Croix. Specim.  
plur. in Mus. Hafn. Rocksound (Krebs 1876). Bahama  
and coast of Florida. (Swift.)

I have never seen any transitions to the following  
species.

339. *Strombus costatus* Gm.

*Murex lacteus* Rondel. p. 78. §. IX.

*Murex lacteus* Rondeleti Gesn. p. 244. fig. inf.  
(copi.)

*Murex lacteus* Rondeleti Aldrov. p. 339. f. 2. (copi.)

*Murex lacteus noster primus* Aldrov. ib. p. 339.  
f. 2.

*Murex lacteus* Mus. Gottw. VII. t. 1. f. 124.  
(bona. jun.)

*Ala accipitrina* Mart. 3. f. 829 et 887 (jun.)

Fav. pl. 20 A. f. 1.

*Strombus costatus* Gm. p. 3520. n. 32, Desh. IX.  
p. 687.

*Strombus accipitrinus* Lam. VII. p. 200. n. 2.

*Strombus accipiter* Dill. Cat. p. 669. n. 24.

Hab. In 5—7 fath. on bluish sand in Spratbay, St.  
Thomas; eats sea-weed; lives in flocks. Queen shell,

spacy Queen shell. (Krebs. Cat. p. 1.) Hayti parait special (d'Orb. Cuba n. 299). Tortola, St. Croix (Krebs. Riise, v. Eggers) Guadeloupe (Beau) Bermuda (Redf.)

340. *Strombus raninus* Gm.

*Bucc. bilingue subfuscum labro crasso recto subcroceo* List. 871. f. 65.

*Bucc. nebulosum primo orbis parte pulvinate* ib. 891. f. 11. (jun.)

*Murex marmoreus striatus et virgatus* Aldrov. p. 337?

*Murex marmoreus* Grew Mus. reg. p. 125.

*Murex magis auritus etc.* Buon. f. 307. 8.

*Pugil cinereus* Heb. 317.

*B. bilingue jamaicense vulgaris* Petiv. Mem. for the Curious. 1708 p. 189. n. 33\*).

*B. bilingue* Sloane Jam. 2. p. 282. n. 17.

*M. striatus rugosus* Gualt. t. 32. f. F.

Seba t. 62. f. 4. 5. 9. 12. 13. 14. 15 & 27.

*Rothe Froschschnecke* Knorr. III. t. 11. f. 1. p. 25. VI. t. 26. f. 8.

*Zeltzame Kamphaan* Val. Mus. f. 91 & 93?

Mus. Gottw. §. VII. f. 133. lit. a.

*Monodactylus subfuscus* Klein §. 251. p. 48.

*Alata lobata* Carcer Bon. Klein §. 261. p. 100. t. VI. f. 108.

*Conchylium albo-nigro variegata* Browne Jam. p. 408. n. 7.

*Pugil costoso-muricatus* Carcer Mart. 3. f. 836—37.

*Strombus costoso-muricatus* Mörch Cat. Yoldi. p. 61.

*Strombus raninus* Gm. p. 3511.

*Lambis curruca* Bolt. p. 14. — Linck p. 109.

---

\*) This work I only know from Sloane. It is not in the Library of British Museum.

*Strombus quadratus* Perry Conch. t. XII. f. 1.

*Strombus bituberculatus* Lam. VII. 202 n. 6.

*Strombus lobatus* Sws. Ill. 2 Ser. t. 3. pl. 153.

*Strombus lobatus* Sow. Thes. f. 76—78.

Hab. Jamaica (Lister, Sloane) 5—7 fathoms on bluish sand; eats sea weed; lives in flocks together with the preceding species (Krebs Cat.) Cuba, Martinique, Guadeloupe, St. Lucie (d'Orb.) Cuba n. 301. Anguilla, St. Barth, St. Martin, St. Thomas, Trinidad, Barbadoes, Tortola (Krebs, Riise etc.) Carthagenæ N. gr. H. Krbs.) Bermuda (Redf.)

var. *pumilio*. Vera Cruz. (Liebm.)

### 341. *Strombus gallus* L.

*Bucc. bilingue profunde striatum muricatum labro late sulcato ejusque unic. parte digitata* List. 874. f. 3.

*Cochlea* Buon. f. 309, 10.

*Murex minor laevis* Barel. Ic. 1321. f. 1. p. 132.

*Ala tuberosa et nodosa* Heb. p. 318.

*Kamphaanje Vleugelhorn* Rumph. t. 37. f. 5.

*Murex striatus* etc. Gualt. t. 32. f. M.

*Alata major senis muricibus* Seba t. 62. f. 1. 2. p. 162.

Knorr IV. t. 12. f. 1. p. 21.

*Angeli Ala. Cochlea alata monodactylus* Mart. 3. f. 841. 42. 46.

*Fav.* pl. 21. f. A. 1.

Gottw. t. 11. f. 120 bon.

*Alata aratrum* Humph. Cat. p. 721.

Hab. On gravel in 1—2 fathoms water. St. Johns at Long point on Tortola (Krebs) Guadeloupe (Beau) Cuba, Martinique, St. Lucie (d'Orb. Cuba n. 300) Margarita (Hornb.)



*Sbg. Strombidea Sws. (Strombella Schlüt.)*342. *Strombus pugilis* L.

- Murex marmoreus candidus* Aldr. 1614. p. 337.  
fig. (trit.)  
*Murex orthocentrus purpureus* ib. 340.  
*Murex elegantibus mucronibus tuberosus* Buon. f. 299.  
Il murice marmore overo litteo. Mus. Mosc. p. 212.  
f. 3. §. 54.  
Mus. Gottw. VII. t. 1. f. 125. 26.  
*Murex bilingue* Sloane Jan. II. p. 253. n. 18.  
*Murex in summitate striatus* Gualt. t. 32. f. B.  
*Alata lata leviter rostratus* Kl. §. 261. p. 100 n. 16.  
*Oreille dechiré* Argv. t. 15. f. A.  
*Conchilium croceum labris nitentibus* Browne Jam. p. 408.  
*Oreille de cochon* Davila p. 184. n. 320.  
*Straubenschnecken* Knorr I. t. IX. f. 1. III. t. 16. f. 1.  
*Alata rubra aculeis armata* Mart. 3. p. 86. f. 830—31.  
*Alata aculeata* Humph. Cat. n. 715.  
*Strombus cornutus* Perry Conch. t. XI. f. 4.  
*α spinis duplicatis.*  
*S. pugilis duplicatus* Ch. X. p. 215. f. 1493.  
*S. pugilis* d'Orb. Cuba. n. 313.  
*β. spinis dilatatis planis, compressis verticalibus* Sow. Gen. f. 1, List. 901, f. 26.  
*Strombus Sloanii* Leach Miscellany.  
*S. pugilis* var. *Sloanii* Duclos Chenu Ill. t. 7. f. 3. 4. Kien. p. 31. t. 20. f. 2. Chenu Man. f. 1582.  
*γ. spinis compr. horizontalibus* Sow. Gen. f. 2.  
Hab. two fathoms water on mud (Krebs Cat. p. 2.)  
Cuba, Martinique, Guadeloupe, St. Lucie, Carthage  
N. Granada, New-Orleans (d'Orb. Cuba n. 302) St.



Thomas, St. Croix, Tortola (Krebs, Riise) Vera Cruz  
Venez. (Krebs) Brasilia, Rio Janeiro, (Reventlow, Krö-  
yer, d'Orb.) Texas (Roemer) Cuba (Pfr.)

343. *Strombus alatus* Gm.

Bucc. dense striatum paulo ventricosius, clavicula  
brevis List. 889 f. 70. t. 890.

Schwartzes Flügelhorn Bolt. Mart. 3. f. 894.

Schwartzes Flügelhorn Schröt. Einl. 1. p. 452, t. 2.  
f. 14.

*Strombus alatus* Gm. p. 3513. n. 14.

The purple mouted var. of *S. pugilis* from Florida  
Port. Cat. n. 1731.

Alata violacea Florida. Humphr. Cat. p. 716.

*Strombus pyrulatus* Lam. VII. 205. n. 13. IX.  
p. 696. n. 13.

*Strombus pyrulatus* Kien. p. 29. n. 21. t. 19. f. 1.  
pl. 34. f. 2.

*Str. alatus* Sow. Thes. n. 34. f. 72—75.

Triton pileare Enc. meth. t. 422. f. a. (jun.?)

*Strombus sulcatus* Anton Verz. p. 85. n. 2798.

var. *a.* *S. undulatus* Chem. in litt. Küster p. 39.  
t. 46. f. 3—4.

Hab. Guadeloupe (Beau) Mexico (Anton) Vera Cruz  
(Liebm.) St. Anna (Casp.) Florida (Humphr.) Cuba  
(Pfr.)

*Spec. dub.*

344. *Strombus Listeri* Th. Gray.

„T. fusiformi, turrita, alba, luteo-fasciata et macu-  
lata, ultimo anfractu subcompresso, obtuse angulato, in-  
ferne sulcato, spira longitudinaliter plicata, transversim  
striata; labro plano. valde expanso, subquadrato, superne  
producto, intus laevi.

Long.  $4\frac{3}{5}$  unc.; lat.  $1\frac{4}{5}$  unc.

Bucc. bilingue canadense labro laevi ex inferiore

parte mucronato, clavicula dense admodum striata, longa, tenuis. List. Hist. t. 855. Fav. t. XX. f. 1.

*Epidromus canadensis* Klein Tent. p. 53.

*Strombus Listeri* Th. Gray on a new sp. of *Strombus* in the Hunterian Museum at Glasgov. Annals and Mag. of N. H. 2 Ser. 1852. X. p. 430.

Hab. Canada (Lister.)

*Stromb. vittati* L. affinis; *Aporrhais occidentalis* Beck, non absimilis sed quadruplo major.

345. *Strombus dubius* „Sow.“ C. B. Ad.

Hab. Jamaica (Jay, C. B. Ad.) Florida (Ad.)

non *S. dubius* Sow. qua Meta Reeve. (*Conella*: Sws.)

an *S. alatus* Gm. jun.? = *S. pugilis* jun. Krebs.

Lyc. N. H. 1866. VIII. p. 398.

### Fam. Tritonidae.

#### Gen. *Ranella* Lam.

Bursa Bolt. (non Petiv.) Gyryneum Link. Bufonaria Sch.

346. *Ranella spadicea* Mtf.

*Concha laevis* Aldr. p. 357. f. 6?

Long square whilk Grew. Mus. Reg. 1681. tab. X.

*Bucc. brevir. compressum striatum ore dentato minus asper* List. t. 995. f. 59.

*Lagena ore semilunata* Klein. §, 141. p. 50.

*B. bufonia minus aspera* Bursa gallorum Ch. IV. f. 1272—73.

*Rana crassa* Humph. Cat. N. 614. (nomen).

Fav. t. 32. f. B. 4.

*Murex crassus* Dill. 692. n. 23.

*Bufo spadicea* Mtf. C. S. p. 375. 1810.

*Ranella granulata* Lam. Enc. t. 412. f. 4. Hist. n. 8.

*Ranella crassa* d'Orb. Cuba. p. 164.

var. *b. dorso ventroque uno-tuberculatis* Lam. l. c.

Hab Guadeloupe (Hotess Beau) Terra firma (Hornb.)  
Porto Cabello (C. Wessel).

*Sbg. Lampas Schum.*

247. *Ranella Thomae* d'Orb.

*Ranella rhodostoma* Beck. Sow. Ill. fig. 10. (non Proc. 1841 nec Reeve.)

*Ranella Thomae* d'Orb. Cuba p. 164. t. 24. f. 23  
—24.

Hab. St. Thomas grand prof. (d'Orb.) Frederiksværns  
Fort St. Croix (Ovesen) Cuba (Andrea) New Providence  
(Krebs).

*Subg. Apollon Mtf.* (Gyrin~~ca~~ Sch. Biplex Perry.)

348. *Ranella corrugata* Perry.

Bucc. recurvir. labro duplicato List. 943. f. 39.?

Biplex corrugata Perry Conch. 1811. t. 5. f. 1.

*Ranella granifera* Lam. var. tritonea Mke. Cat.  
Malsb. n. 930.

*Ranella ponderosa* Reeve f. 14.?

Hab. Guadeloupe (Duchassaing Krebs p. 25.) Hams-  
bluf St. Croix (Krebs.) St. Thomas (Fru Eckardt Ma-  
gens) Jamaica (Krebs).

349. *Ranella cubaniana* d'Orb.

*Ranella cubaniana* d'Orb. Cuba p. 105. p. 368. t.  
23. f. 24.

Hab. Cuba (d'Orb., Andrea.) St. Lucie (d'Orb.) St. Croix  
(Eggers.) St. Thomas (Magens) Guadeloupe (Beau.)

*Ranella semigranosa* Lam. Kien. (non Reeve) R.  
*quercina* Mörch et *Ranella pustulosa* Reeve ex Africa  
occid. affines. An var. praecedentis.

*Sbg. Aspella Mörch.*

350. *Ranella anceps* Lam.

*Ranella anceps* Lam. Hist. VII. 1822. p. 154. n.  
13. IX. p. 550.

Ranella anceps Kien. Spec. gen. p. 36. n. 27. t. 4.  
f. 2.

Ranella anceps Chenu Man. f. 722.

Hab. St. Thomas (Hornb. Riise.)

**Gen. Triton Lam.**

(not) Tritonellium Val. Compt. Rendu 1858) Varicaria Fabr. 1823.

*Sbg. Colubraria Schum.*

Trompeta Petiv. Epidromus Klein, Mörch. Cumia Biv.

351. *Triton testaceum* Mörch.

Differt a *T. obscuro* Reeve t. crassiore, brevior, anfr. convexioribus, asperis; columella granosa.

Turbo veluti malleo compressus etc. Buon. p. 119.  
f. 48.?

Trompeta indica minor etc. The Pigmies Trumpet  
Petiv. Gazoph. t. 55. f. 7. n. 259. (Copi.)

Epidromus arachnoides Kl. Tent. p. 53.

Triton testaceus Mörch Cat. Yoldi p. 107. n. 2009.

(nomen.)

Triton testaceus Mörch Cat. Henck. 1854. p. 13.  
n. 479.

Triton testaceus Mörch Krebs Cat. p. 24.

Triton obscurus Reeve C. B. Adams, Krebs p. 23.

Hab. St. Thomas, St. Croix, St. Martin, (Krebs, Riise)  
Guadeloupe (Beau) Jamaica (Ad.) St. Jean (Sommer.)  
N. Providence (Krebs. Lyc. N. York. VIII. 1867.)

352. *Triton lanceolatum* Menke.

Ranella lanceolata Mke. Synops. 1828. p. 87. 1830.  
p. 145. excl.syn. Helbl.

Triton lanceolatum Mke. Kien. Spec. gen. p. 27. t.  
28. f. 1.

Triton lanceolatum Reeve f. 79.

Triton lanceolatum Desh. Lam. IX. p. 617. n. 35.

Triton lanceolatum Mörch Yoldi p. 108.

Hab. under stones and pices of corals in one and two feet water (Krebs) Guadeloupe (Duchas, Beau) St. Thomas (Riise) St. Croix, Crabisland, Trinidad, St. Martin, Anguilla (Krebs) Martinique, Havanna (Kien.) Portorico (Mke.) Vera Cruz (Liebm.) New Providence (Krebs.)

*Sbg. Buccinatorium Petiver.*

Buccinum Antiquorum, Rond. Charlest. Browne. Beck. Triton Mtf. Lampusia  $\beta$  Sch. Septa Perry. Tritonium Linck. Charoni $\beta$  Gistel.

353. Triton marmoratum Linck.

„Thick and heavy, slender upper whorls with minutely granulated revolving lines; columella brown with white plaits mostly narrow. Smaller and more ponderous in proportion in all stages.“ Conrad.

Buccinum variegatum ac striatum F. Col. Lister. t. 959. f. 12.

Buccinatorium barbadense majus Petiv. Mem. Curious 1708. f. 190. n. 20.

Bucc. maxim. variegatum Sloane Jam. 2. p. 244.

Buccinum Tritonis Kundm. Rariora 1737. p. 81. t. IV. f. 8.

Buccinum Tritonis Seba t. 39. f. 2 sup.

Bucc. Tritonis minus crocei vel aurei coloris Kl. p. 44. t. VII. n. 127 \*).

Bucc. marm. undul.-varieg. Browne Jam. 2. p. 404.

Bucc. Tritonis Chem. IV. f. 1277—83.

Bucc. nereidum Humph. Cat. p. 34. n. 626 (nomen.)

Tritonium marmoratum Linck. Verz. 1807. p. 122.

Triton variegatum Lam. Enc. Meth. 1816. t. 421. f. 2.

Triton variegatum Kien. pl. 2.

---

\*) Mus. Esgersiani.

*Triton variegatum* Conrad Philad. Proc. 2. Ser. 1848. p. 121.

pullus. Mart. IV. p. 233. f. 1410?

*Voluta nasuta* Gm. p. 3455.

Hab. Barbados (Lister). In two fathoms water on seaweed St. Thomas (Krebs) Guadeloupe (Duchas. Beau.) Vera Cruz, N. Gr. (Krebs) St. Thomas (Riise) Vera Cruz (Liebm.)

354. *Triton nobile* Conrad.

„Body whorl dilated ventricose, tramped on the upper part, about which three of the ribs are prominent, rounded, the lower one broadest. Lgth. 11 inches; width  $5\frac{3}{4}$  inches.“ (Conr.)

*Strombus magnus* Aldrov. 1614. t. X. f. 4.

*Trompette marine* Rochefort Antill. 1658 p. 227. (Copi).

*Trompette de mer* Labat Nouv. Voy. 1724. 1. f. 268. (Copi).

*Mus.* Besler. t. 20. f. 4.

*Fav.* tab. 32. f. G. 1. 2.

*Triton variegatum* Blv. Man. t. 18. f. 3?

*Triton variegatum* Reeve t. 1. f. 3.

*Triton nobile* Conr. Journ. ac. Sc. Philad. 2 Ser. 1849. p. 212.

Hab. Jamaica, St. Johns. Carthagenia N. Gr. Bermuda, St. Thomas (C. B. Ad. Krebs, Riise, Hornb.) An var. praeced.

*Sbg. Lampusia Sch.*

(*Simpulum* Kl. p. p.)

355. *Triton costatum* Born.

*Bucc. rec. ventricosum magnis striis intervallo donatum* List. t. 936. f. 31. (= Buon. f. 289).

*Murex in orientali indiarum mari natus* Buon. f. 289.

*Bucc. rec. labro simplice* List. t. 332. f. 27.

*Murex fastigiatus dilute flavus* Seba t. 57. f. 29. 31,

Die getrocknete Birne Knorr V. t. 21. f. 1.

Murex costatus Born Index 1778\*) p. 296. Mus.  
p. 297.

Buccinum costato-tuberculatum Chemn. IV. f. 1252.  
53. (Forskäl.)

Buccinum quinquangulare Chem. IV. f. 1254.

Argobuccinum nodosum Chem. IV. f. 1255.

Murex pileare L. Chemn. XI. f. 1837—38.

Triton succinctum Lam. VII. p. 181. n. 8? N.  
Holl?

Murex parthenopus Salis. Dill 2. p. 696. n. 29.

Triton olearium L. Desh. IX. p. 629.

*α americanum.*

Triton pileare d'Orb. Am. mér. p. 449. n. 388  
non L.

Triton americanum d'Orb. Cuba p. 163. p. ~~355~~ t.  
23. f. 22.

*αα. americanum, minus.* Long. 45 mm.

Triton brasilianum Gould. Bost. Proc. III. May.  
1849. p. 142.

Triton brasilianum Gould Exped. Shells. Add. p.  
504. f. 296.

Triton brasilianum Gould Otia p. 65.

Hab. Cuba, Brasilia (d'Orb.) Guadeloupe (Beau) Tor-  
tola (Krebs) Margarita (Hornb.) Brasilia Rio Janeiro  
(Reventlow, Kröyer.)

*αα. Brasilia (P. W. Lund.)*

356. Triton Martinianum d'Orb.

Bucc. olearium jun. imperfectum apertura haud  
plicata edentula Chemn. IV. p. 56. f. 1250.

Bucc. olearium hujus species adhuc reticulatum ib.  
f. 1251.

Triton pileare Lam. VII. p. 182. n. 9.

---

\*) Chem. vol. V. 1780. is however quoted by this species.



*Triton pileare* Mörch Yoldi. p. 108. n. 2024.

*Triton Martinianum* d'Orb. Cuba p. 162. n. 354.

var. *α* *latior*. *Tr. vestitum* Hinds. affinis.

Hab. Cuba, Guadeloupe, St. Lucia, St. Thomas (Sagra, Hotess., Hornbeck. d'Orb.) Carthagera, N. Gr. St. Johns Bermuda, Tortola, St. Martin Barbadoes (Krebs) Bahia (Andrea) Catinguiba (Hygom.)

357. *Triton aquatile* Reeve. occidentale.

*Buccinum variegatum angustum* labro duplicato

List. t. 934. f. 29.

*Murex olearium* L. Schröt. Einl. 1. p. 492. tab. 3.

f. 1.

*Murex olearium* L. Schröt. Wiedem. Archiv. IV. 2. p. 141. cfr.

*Triton aquatile* Reeve Icon. f. 24.

*Triton vestitum* Hinds. Krebs Cat. p. 29.

Hab. Jamaica (List.) Guadeloupe (Beau) St. Thomas Scholten, long. 95 mm.; Fru Eckardt. Riise. Krebs.)

358. *Triton rubecula* L. occidentale.

Differt a forma indica: *T. pallidiore*, interstitiis rugarum columellae aurantiis; epidermide straminea, membranacea, laminis confertissimis ciliato-pectinatis.

Long. 32 mm.; lat. 17 mm.

Hab. St. Thomas, dredged by Joe (R. Swift.) sub nomine *R. gemmatum* Reeve. f. 60.

359. *Triton chlorostomum* Lam.

*Triton chlorostomum* Lam. XI. 185. n. 20. IX. p. 636. n. 20.

*Triton chlorostomum* Kien. p. 14. t. 12. f. 2.

Hab. Antill. (Lam.) Cuba, St. Lucie, Martinique, Guadeloupe (d'Orb. Cuba n. 351.) Jamaica, St. Johns, Bermuda: (C. B. Ad. Krebs) St. Thomas (Hornb. Krebs) Vera Cruz (Liebm.)

var. *pumilio*. Long. 0,72 inch.; br. 0,36 inch. (Ad.)

*Triton pulchellus* C. B. Ad. Contr. 1850. Jan. p. 60.

*Triton chlorostomum* young. Krebs, Lyc. of N. York VIII. 1866. p. 398,

„This shell resembles a small and slender *T. chrystomus*.“ Ad.

Hab. Jamaica (Ad.) St. Thomas (Riise) New Providence (Krebs).

360. *Triton Thersites* Reeve. occidentale.

*T. elongata*, anfr. angulati; interst. lir. cancellata. Long. 25 mm. lat. 12 mm.

*Triton Thersites* Reeve. Proc. 1844. Ic. t. 13. f. 48.

*Triton vespaceum* Lam. Quorund.

Hab Antill. (Bardenfl.) St. Croix (Ovesen) Eleuthera (Krebs.)

361. *Triton gracile* Reeve. occidentale.

*T. alba*, faucibus candidis; epid. straminea, ciliata; columella rugoso-plicata praesertim antice; canali gracili. Long. 33 mm.; lat. 14 mm.

*Triton gracile* Reeve Icon. f. 58.

Hab. St. Thomas (Riise.)

362. *Triton Krebsii* Mörch.

Differt a *T. corrugato* Lam.: spira brevissima, columella ad finem canalis rugosa, plica dentiforme ad initium canalis. Differt a *T. trigono* Gm.\*): *T. crassiore*, spira longiore, apertura candidissima unicolore. plicis columellaribus minoribus. Epidermis laminis sat distantibus pectinatis, ciliis brevissimis, in laminae nodorum setigeris.

Long. 57 mm.; lat. 31 mm.

Hab. St. Thomas floating dock (Swift Krebs.) St. Croix (Mus. reg.)

---

\*) *T. ficoides* Reeve. *T. caudatus* Kien. non Say. Guinea.

*Sbg. Cymatium* Bolt. (Lotorium Mtf.)

## 363. Triton femorale L.

Buccinum triangulare Grew. Mus. reg. p. 130. t. X. f. 1. 2.

Bucc. peche stricta e la guscia pia sodia. Mus. Mosc. 1656. p. 214. f. 3.

Bucc. rec. magnum labro duplicato quasi triangulari List. t. 941. f. 37.

Bucc. triangulare Buon. f. 290.

Bucc. jamaicense triangulare Petiv. Mém. Cur. 1708. p. 190. n. 12.

Bucc. majus canaliculatum Gualt. t. 50. f. C.

Bucc. triang. Sloane Jam. II. p. 250. n. 10.

Bucc. fusc. fasciatum angulatum Browne Jam. 180.

Bucc. luteum Hebenstr. Richt. p. 314.

Mur. costosus labro duplicato Kl. §. 266. p. 102.

Pyrum triangulare subulatum Mart. 3. f. 1039.

Bucc. angulatum Humph. 627. B. porcellum ib. 626.

Lotorium lotor Mtf. 2. p. 583.

Hab. on bluish sandy mud together with Strombus galus (Krebs p. 23.) Jamaica (Lister Ad.) St. Lucia, Cuba (d'Orb. Nr. 350.) Martinique, Bresil (Kien.) Guadeloupe (Beau) St. Johns, St. Thomas, St. Croix, St. Martin, Tortola, Trinidad (Krebs, Riise).

*Sbg. Guttarium* Kl.

## 364. Triton antillarum d'Orb.

Lister t. 935.

Nodulus Heb. Mus. Richt. 315.

Purpura clathro-tuberosa Nodulus Mart. III. 1050—51.

Triton nodulus Mörch Yoldi p. 109. n. 2041.

Triton tuberosum Lam. VII. p. 185. 18. p. p.

Triton tuberosum Reeve f. 1<sup>b</sup>.

Triton tuberosum Gould Exped. Shells p. 240.

W. Ind.

Triton antillarum d'Orb. Cuba p. 161. n. 352. p. 23. f. 20,

Triton pyriformis Conr. J. ac. sc. Philad. 2. Ser. 1849. cfr.

Hab. Martinique, Guadeloupe (d'Orb.) Cuba (Andrea) St. Thomas (Riise, Krebs) Vera Cruz (Liebm.)

*Sbg. Ranularia Schum. (Ranula Kratz. Regf. V. f. 50.)*

365. Triton cynocephalum Lam.

Bucc. ampullaceum rostratum List. t. 893. f. 13. (jun.)

Purpura e mari brasiliensi habita si albedine observes etc. Buon. f. 338.

Bucc. e flavo annulata Seba t. 49. f. 74—75.

Bucc. e flavo annulata Fav. t. 34. f. A. 1?

Murex niveus Gm. p. 3545.

Triton cynocephalum Lam. VII. p. 184. n. 13.

Triton cynocephalum Kien. p. 3. t. XII. f. 1.

Hab. Guadeloupe (Beau) St. Johns, Jamaica, Bermuda (Ad.) St. Croix, St. Martin, (Krebs.) Bahia (Kien.)

*Subg. Linatella Gray.*

366. Triton (Linatella?) tranquebaricum Lam.

Hoc cochlea duplicato labio donata est. Pertinet ad Bucc. fastigiat. Seba t. 57. f. 33.

Argus fasciatus a bandelettes tuberculeuses et convexes. Fav. 1. p. 50.

Murex argus fasciatus Chem. X. p. 240. f. 1522.

Murex argus  $\beta$  Gm. 78.

Triton tranquebaricum Lam. Enc. t. <sup>4</sup>222. f. 6. Hist. VII. p. 189. n. 30. p. 640.

Triton tranquebaricum Reeve t. 14. f. 55. tab. 20. f. 55 trivaricosa, bene.

Triton Chemnitzii Gray. Bechey Voy. p. 110.

Triton balteatus Beck fide Reeve.

Ranella vexillum Cuming. Pfr. Reg. p. 97.

Hab. Guinea (Spgl. Praetorius, Mörk.), „Tranquebar“  
no doubt erroneous.

*a. minor, crassa.* Long. 31 mm.; lat. 21 mm.

Hab. Porto Cabello (Krebs.)

*β tenuis inflata; spira producta.*

Long. 51 mm.; lat. 31 mm.

Hab. Barcellona (Krebs.)

367. Triton (Linatella) Poulsenii Mörch.

*T. subglobosa ferruginea, canali brevissima; lira angulari leviter nodosa, columella profunde arcuata plerumque laevis, interdum antice plicis 1—2 obsoletis; epid. lineis confertissimis ciliatis.*

Long. 51 mm.; lat. 38 mm.

Buccinum fastigiatum, album Seba t. 57. f. 30.

Buccinum costatum Meusch. Mus. Gevers. 1787. n. 605 non Born.

Triton cynocephalum Lam. Enc. t. 422. f. 3?

Hab. Curaçao, Portocabello (spm. 6 Krebs.)

Differt a sequente praesertim canali brevissima.

Mart. III. 1084: non absimilis.

368. Triton (Linatella) rostratum Mart.

Differt a praecedente praesertim canali producto.

Dolium rostratum Mart. 3. f. 1083.

Buccinum caudatum Gm. p. 3471. n. 6.

Cassidaria cingulata Lam. VII. p. 216. n. 3.

Triton undosum Kiener t. 6. f. 2. bene.

Hab. St. Thomas Harbour floating dock, (long. 48 mm.; lat. 30 mm.)

I cannot see any difference between the above specimen and a specimen from Pulo Penang collected by Prof. Reinhardt during the expedition of Galathea.

*Sbg. Cabestana Bolt.*

Aquillus Mtf. Dolarium Schlüt. Neptunella Gray. Proc. 1853. p. 38.

369. Triton (Cabestana?) labiosum Wood.

Murex labiosus Wood Ind. Supp. 1828. p. 18.

Triton labiosus Wood. Reeve Ic. f. 52. p. p.

Triton Loroisi Petit J. C. 1852. p. 53. t. 2. f. 8.  
1856. p. 38.

Hab. between stones and coral pieces on 2 feet water at  
St. Thomas (Krebs Cat. p. 23) Guadeloupe (Beau, Du-  
chas.) St. Thomas, St. Croix (Ovesen, Riise) St. Martin,  
Tortola (Krebs.) Cuba (Andrea) Vera Cruz (Liebm.)

*Sp. ign.*

Triton commutatum Dkr. teste Gabb. Philad. Tr.

### Distorsio Bolt.

370. Distorsio clathrata Lam.

Differt a D. ridente Reeve, canali elongata.

Triton clathratum Lam. Enc. meth. 1816. t. 413.  
f. 4. Hist. p. p.

Murex reticulatum L. Beck.

Buccinum reticulatum Humph. Cat. p. 34. n. 620.

var.  $\alpha$  anguste reticulata.

Auris pilosa Seba t. 65. f. 5?

Cochlea canaliculata extus incurva Gualt. t. 31.  
f. D?

Cassis penita Meusch. Gevers p. 388. n. 1258?

Hab. Portorico (Humphr.) St. Thomas (Hornb., Riise)  
Haiti (Fokkes) Am. mer. (Lam.) Catinguiba (Hygom.)

371. Distorsio acuta Perry. occidentalis.

Cassis vera. Distorsio reticulata Mart. 2. f. 405—6.

Murex mulus Dill. 2. p. 704. Wood Ind. t. 26.  
f. 46?

Distorsio reticulata Bolt. p. 94. n. 1639. 8/

Distorta acuta Perry 1811. t. XI. f. 1. 1811.

Triton clathratum Lam. p. p. Kien. t. 11. f. 1?

Hab. St. Thomas (Hornb.) Guadeloupe (Duchassaing)  
Jamaica (Ad.) Carthagena N. Gr. (Krebs) Tortola  
(Krebs.)

## Cassis Kl.

*Sbg. Casmaria Ad.?*\* 372. *Cassis Coronadoi* Crosse.

*Cassis Coronadoi* Crosse Journ. Crosse. J. C. 1867.  
 XV. p. 64. t. V. VI.  
 Hab. Matanzas, Cuba (Coronado in Barcellona, v. Lennepe.)

*Subg. Semicassis Kl.*373. *Cassis inflata* Shaw.

*T. magna*, *tenuis*, *inflata*, *laeviuscula*, *evaricosa*.  
*Bucc. recurvirostrum* List. 996. f. 1.  
*Bucc. cassideum tessellatum* Chem. XI. p. 76. f.  
 1792—93.  
*Bucc. granosum*, Guinea Sol. Port. Cat. p. 1293. cfr.  
*Bucc. inflatum* Shaw Miscellany V. 1789. pl. 953.  
*Cassis tessellata* Pfr. Register p. VIII.  
 Hab. St. Thomas (Hornb.) Barbados (Lister.)

374. *Cassis granulata* Born.

*T. globosa*, *minore*, *crassa*, *varicifera* vel *evaricifera*.  
*Cassis ventricosa* Mart. 2. 1771. f. 344. 45. (*varicifera*) 350—52 (*evaric.*)  
*Cassis ventricosa* Mörch Yoldi n. 2096.  
*Buccinum granulatum* Born Index 1778. p. 239.  
 Mus. p. 248.  
*Cassidea granulosa* Brug. Dict. n. 5. Lam. VII. p.  
 227. t. 20.  
*Cassidea inflata* Shaw. Reeve f. 22.  
 Hab. St. Thomas, St. Croix (Riise, Krebs.) At certain  
 seasons of the year in seaweed on 2 or 3 feet water  
 and on the white sand of the beech. (Krebs p. 34)  
 Guadeloupe (Beau).  
 var. *a. varicifera* vel *nuda*; *apertura patula*.  
*Cassis granulosa* Lam. Kien. t. 16. f. 33.  
 Hab. Brasilia (Reventl. Kröyer.) Catinguiba (Hygom.)



375. *Cassis gibba* Gm.

*T. ovata, angusta, porcata, rudis evaricosa.*

List. 999. f. 64. Schröt. Einl. 1. p. 378.

*Buccinum gibbum* Gm. 3476. n. 24.

*Buccinum undulatum* Gm. var. Dill. 2. p. 545. n. 24.

*Cassis globulus* Bolt. 1798. p. 22. n. 371.

*Bucc. cepa* Bolt. n. 372.

var. *α. angustior.*

List. 1056. fig. inf. 9.

*Cassis malum* Bolt. p. 222. n. 370.

Hab. Catinguiba (Hygom) Cap Haiti (Liebm.) Florida,  
Carolina (Stimps.) St. Anna (Casp.) Vera Cruz (Liebm.)

376. *Cassis abbreviata* Lam.

*T. rudis, varicibus validis 1—2.*

*Bucc. recurvirostr. ventricosum lev. cancellatum* List.  
1005. f. 65.

*Turbo e lusitanico litore* Bon. f. 157. (copi.)

*Cassis abbreviata* Lam. VII. 1822. p. 224. n. 12.

*Cassis abbreviata* Kien. p. 33. n. 21. t. 15. f. 31.

Hab. Antill. dan. (Riise, Hornb.) Guadeloupe (Beau) St.  
Thomas (Riise) Cap. Haiti (Liebm.)

377. *Cassis cicatricosa* Meusch.

*Bucc. ventr. tenue levi* List. 1016. f. 75.

*Bucc. cicatricosum* Meusch. 1778. n. 1158.

*Bucc. cicatricosum* Gronov. Zoophyl. 1350. t. 2.  
f. 1. 2.

*Bucc. recurvirostrum* Gm. p. 3477. (non Reeve.)

*Cassis laevigata* Mke. Syn. 1828. p. 87. 1830. p. 115.

*Cassis sulcosa* Kien. p. 32. t. 16. f. 34.

Hab. Barbados (Lister. Hemmerich.) Guadeloupe (Duchas.  
Beau) St. Johns, Jamaica, Carthagena, Tortola, St. Croix  
(Krebs) St. Thomas (Hornb. Riise).

var. *α. linea angulari, punctis asperis.*

378. *Cassis lactea* Kien.

*Bucc. bilineatum* Gm. p. 3476. n. 23. (List. 998. f. 63.)?

*Bucc. decussatum* Pennt. t. 79. f. 2. inf.

*Bucc. bilineatum* Mtg. Test. p. 244.

*Cassis minuta* Mke. Cat. Malsb. n. 806! (jun.)

*Cassis lactea* Kien. p. 38. t. 16. f. 35.

*Cassis lactea* Mörch Yoldi p. 113. n. 2099.

Hab. St. Thomas (Hornb. Riise.)

n. 373—78 an merae varietates.

*Sbg. Goniogalea Mörch 1857. Cat. Suenson.*

379. *Cassis madagascariensis* Lam.

*Buccinum plicatum* L. XII. 444. (Beck.)

*Buccinum grande* Soldr. *Cassidea grandis* Humphr. Cat. p. 20. n. 318?

Fav. t. 20. f. A. 1. 2.

*Cassis madagascariensis* Lam. VII. p. 219. n. 1.

*Cassis madagascariensis* Kien. p. 7. n. 3. pl. 2. f. 2.

*Cassis madagascariensis* Chenu Ill. pl. 1. Man. f. 1121.

*Cassis cameo* Stimps. Sillim. Journ. 1860. p. 443.

Hab. St. Thomas, St. Croix (Krebs, Riise.) Jamaica (C. B. Ad.)

380. *Cassis flammea* L.

Lesser persian whilk Grew Mus. reg. p. 127. tab. 9.

*Bucc. recurv. ventric. undatim depictum Turbo auritus tuberculatus* Aldrov. List. 1005. f. 72.

*Turbo non dissimilis drappo d'argento* Bon. p. 131. f. 156.

*Stormhoed* Rumph. t. 23. n. 2.

*Bursa jamaicensis maxime nodosa* Petiv. Mem. Cur. 1708. p. 190. n. 18.

*Cassis* Seba t. 173. f. 5. 6. 10. 11. 14—16. 19 & 20.

Die gerippte und geflammte Sturmhaube. Attalische Kleid. Knorr. IV. t. 4. f. 1. III. t. X. f. 1. 2.

Westindische Sturmhaube Val. amb. pl. XI. f. 99.  
100.

*Bucc. striatum* Meusch. Gronov. Zoophyl. p. 302.  
t. 19. f. 18.

*Vestis attalica genuina* Mart. 2. f. 353—54.

*Cassis ziczac* s. *plicata* Meusch. Mus. 1297.

*Cassis flammea* Lam. Enc. t. 406. f. 3.

*Cassis alba* Perry t. 33. f. 2.

*Cassis tuberosa jun.* Kien. pl. 3. f. 5.

Hab. in 3 fathoms water on seaweed (Krebs p. 34)  
Jamaica (Lister, Ad.) Cuba (d'Orb.) Guadeloupe (Beau)  
Barbadoes, Antigua, Tortola (Krebs) St. Thomas (Hornb.  
Riise.)

381. *Cassis tuberosa* L.

*Murex triangularis* Rondelet. p. 46.

*Murex triangularis* Gesn. de Test. p. 244.

*Murex triangularis* Aldrov. p. 212. f. 4.

*Cochlea indica ventricosa* Bon. 323?

*Cochlea cassidiformis umbilicata* Labat. Voy. 5. p.  
262. fig.

*Cochlea cassidiformis* Sloane Jam. II. p. 242. n. 2.

*Cochlea cassidiformis* Mus. Gottw. VIII. t. 1. p. 159.

*Cochlea cassidiformis umb. marmorata, striis cancellatis* Gualt. t. 41 A.

*C. striata multicolor* Bon. Kl. §. 237. 9. p. 92?

*Cassis* Seba t. 73. f. 10. 11. 12.

Gros Casque d'amerique Dav. Cat. p. 177. n. 297.

Casque triangulaire ib. p. 298.

Fav. t. 25. f. B. 2.

*Cassis tuberosa, marmorata* Mart. 2. p. 136. f. 359.

*Cassis undulata* Humphr. p. 19. n. 317.

var? t. minore, spira producta.

*Cassis tuberosa, marmorata var.* Mart. 2. f. 381. 82.

*Cassis rotundata* Perry t. 33. f. 1.

Hab. Cuba (d'Orb.) Jamaica, Bermuda (Ad.) Guadeloupe

(Beau, Duchassaing) Antigua, St. Johns, Tortola, St. Martin, Barbados (Krebs) St. Thomas (Rüse, Hornb.)

*Subg. Cypraecassis Stutchb.*

382. *Cassis testiculus* L.

Bucc. ventr. t. labro pulvinateo 3-cinctum et asperum  
List. 1001. f. 66. (= Cochlea Bon. 162.)

Westindische Stormhoed Rumph. n. 3. p. 81. t. 23. f. 3.

Bucc. jam. vulg. umbilicatum Petiv. Mem. 1708. p. 190. n. 120.

Cochlea cassidiformis Gualt. t. 39. f. C.

Cassides crassae, Pileoli polonici dictae Seba t. 72. f. 17—21.

Schellenschnecke Knorr. III. t. 8. f. 2. IV. t. 6. f. 1.

*Cassis clathrata*, squamis rufis. Pileolus polonicus  
Mart. 2. f. 375—76.

Vestis attalica ib. f. 377—78.

Neritoides frequentius striata. Barel. p. 132. f. 1321—4. Sloane Jam. II. p. 248.

*Cassis fasciatim flammea* Klein p. 92. §. 376.

Casque des indes ou des Iles de France. Dav. p. 174. n. 289.

Fav. t. 26. f. D. 3.

Hab. Jamaica (Lister. Ad.) St. Johns, Arecibo, Carthagena, Bermuda (Ad.) Guadeloupe (Beau) St. Croix, Tortola, St. Barth, Barbadoes, Trinidad, Carthagena (Krebs.)

**Morum Bolt.**

*Oniscia* Sow. *Theliostoma* aut. apud Sow. Gen.

383. *Morum conoideum* Scop.

*Rhombus parvus dentatus muricatus* List. 791. f. 44.

*Cypraea conoidea* Scop. Delic. Insubr. 1786. t. 24. f. 3. p. 78.

Moerbey. Val. Amb. pl. 4. f. 33.

*Strombus oniscus* L. Chem. XI. pl. 195 A. f. 1872.  
73! Wood pl. 22. f. 26.

*Cassidea oniscus* Brug. Diet. I. p. 432. n. 15.

*Cassidaria oniscus* Lam. VII. p. 217. X. p. 10.  
Kien. p. 92. t. 12. f. 5.

*Oniscia oniscus* Sow. Gen. XXIV. f. 4. Man. f. 469.

*Oniscia Lamarekii* Desh. X. p. 12. Chenu Man.  
f. 1139.

Hab. St. Jean (Dr. Langemark.) Guadeloupe (Beau.)

### 384. *Morum oniscus* L. aut.

*Strombus oniscus* L. XII. p. 1210. Hanl. Ipsa Conch.  
p. 27. t. 5. f. 3.\*)

*Cochlea conoidea dentata* Gualt. t. 22. f. L.

*Rh. parvus dentatus muricatus* Seba t. 55. f. 23.  
fig. plur.

*Cassis-Erdbeere* Knorr IV. t. 12. f. 4. VI. t. 15.  
f. 6.

*Mus. Gottw.* p. 37. pl. 26. f. 179 b. 180.

*Cassis nodosa et verruculata. C. parva ind. occid.*  
Mart. II. f. 357. 58.

*Voluta verruculata* Karsten *Mus. Lesk.* 1. p. 226.  
1789.

*Fav.* t. 26. f. K.

*Oniscia triseriata* Mke. Syn. 1830. p. 64.?

Hab. St. Thomas, St. Croix, Tortola, St. Barth, St.  
Johns, Anguilla, St. Martin (Krebs, Riise, Hornb.)

### 385. *Morum strombiforme* Reeve.

*Rhomboides nodosus* Petiv. *Gazophyl.* t. 48. f. 16.

*Cypraea conoidea* var. Scop. l. c.?

*Oniscia strombiformis* Reeve Proc. 1842. p. 91. C.  
S. p. 218. t. 253. f. 1.

*Oniscia strombiformis* Reeve Icon. f. 2.

*Morum oniscus* Ad. Gen. t. 23. f. 7.

---

\*) an sp. seq.?

Hab. Honduras (Dyson) St. Thomas (Krebs, Riise) St. Croix (Ovesen).

386. *Morum Dennisoni* Reeve.

*Oniscia* *Dennisoni* Reeve. Proc. 1842. p. 21. C. S. t. 253. f. 5. 6.

*Oniscia* *Dennisoni* Desh. Lam. X. p. 14. n. 3. Reeve Ic. f. 6.

Hab. Guadeloupe (Beau.)

*Spec. dubiae.*

*Oniscia* *quadriseriata* Mke. Syn. 1830. p. 145.

T. ovato-elliptica, crassa, albido spadiceoque varia, nodorum seriebus 4 sulcisque intermediis cincta; columella granulosa; labro intus dentato. Long. 1 poll. 3 lin.; lat. 9 lin.

Hab. ad Barbados. Attulit Christ. Hemmerich.

an *M. strombiformis* Reeve?

*Cassidaria oniscus* Lam. Kien. Anton? Verz. p. 94.

***Sconsia* Gray.**

387. *Sconsia striata* Lam.

Fav. t. 26. f. G.

*Cassidaria striata* Lam. Enc. 405. f. 2. Hist. X. p. 10. n. 4.

*Cassidaria striata* Kien. p. 6. pl. 2. f. 3. Reeve Ic. f. 1.

*Cassidaria striata* Desh. Enc. I. p. 208. n. 1.

*Cassidaria laevigata* Sow. Geol. Journ. VI. p. 47. t. X. f. 2. affinis.

*Cassidaria sublaevigata* Guppy ib. XXII. p. 287. t. 19. f. 10. aff.

Hab. Jamaica?

***Dolium* Hill.**

388. *Dolium antillarum* Mörch.

T. cylindrico-globosa, perforata; spira brevis, sutura

canaliculata, costis 19 magnis et 9 minoribus in interstitiis posterioribus; costa suturali bipartita; costis 4—5 in anfr. spirae, in interstitiis linea angusta mediana; apex nigricans.

Long. ap.  $13\frac{1}{2}$  cm.; lat.  $6\frac{1}{2}$  cm.

Dolium galea Krebs. Cat. p. 35. (non L.)

Hab. St. Thomas (Riise, Swift) Jamaica (Ad.)

var. *brasiliana*. T. costis convexioribus, liris interstitialibus spirae obsoletissimis.

Hab. Brasilia (Romberg) Catinguiba (Hygom, A. Benzon.)

*Sbg. Galea Kl.* Perdix Mtf. Dolium Browne. Brün.

389. Dolium perdix L. occidentalis.

List. 984. f. 43. (= Bon. 3. f. 191.)

Indian partridge shell Petiv. Amb. Gaz. 153. f. 13.

Am. Cat. n. 504.

Perdix jamaicensis vulgaris Petiv. Mem. Curious 1708. p. 90. n. 21.

Sloane Jam. II. f. 246. n. 12.

Bucc. majus canaliculatum Gualt. t. 51. f. 1.

Dolium pennatum. D. perdix Mart. 3. f. 1079. p. 390.

Das Rebhuhn, Schellenschnecke Knorr III. t. 8. f. 1.

Galea striata Klein. §. 167. 1. p. 56.

Urceus Kl. 139. IV. p. 149.

Melo reticulatus Kniph. Orig. t. 265.

Perdix reticulatus Mtf. C. S. 447.

*α* var.?

Bucc. brev. tenue umbilicatum asperius striatum variegatum List. 985. f. 44.

Perdix. Seba t. 69. f. 12. 13.

Dolium pennatum Mart. f. 1078.

Dolium pennatum Mörch Cat. Yoldi. p. 110. n. 2058.



*T. larvalis.*

*Helix sulphurea* Ad. Contr. p. 33 & 98.

Hab. Jamaica (Lister, Ad.) St. Johns, Guadeloupe (Beau)  
Tortola, St. Martin, St. Barth, Barbadoes, Trinidad  
(Krebs) Vera Cruz (Liebm.)

*β. brasiliانا.*

*D. perdix* var. Mörch Yoldi n. 2057.

Hab. Bahia (Andrea) Brasilia (Yoldi.)

### **Pyrula Lam.**

390. *Pyrula fortior* Mörch.

*Ficus* Seba t. 58. f. 3—5.

Figue blanche Dav. p. 216. t. 415.

*Cochlea longa pyriformis* Gualt. 26. f. M.

*Ficus longa indiarum occidentaliu* Knorr III. t.  
23. f. 1.

*Pyrula reticulata* Lam. Enc. meth. t. 432. f. 2. Lam.  
VII. p. 121. n. 9. (non Linck nec. Schloth.)

*Pyrula reticulata* Kien. p. 28. t. 12. f. 1.

*Pyrula clathrata* Rousseau Ill. Conch. tab. 2. (non  
Lam.)

Hab. Antill. (Magens) Campeche (Wessel canali ferru-  
ginea; vivide maculata.)

Differt a sequente t. ventricosiore, liris incrementis  
fortioribus.

391. *Pyrula papyratia* Say.

*Pyrula nebula* Humphr. cat. 585. (Florida.)

*Pyrula papyratia* Say. Journ. Phil. ac. I. Ser. II.  
1822. p. 238.

*Ficula gracilis* „Sow.“ \*) Phil. Mke. Zeitschr. 1848.  
p. 971.

*Ficula gracilis* Petit. J. Conch. 1852. p. 149.

*Sycotypus papyratia* Stimps. Check List.

---

\*) Tank. Cat. p. XVIII, n. 1615 = *P. Dussumieri* Kien. verisim,

*Pyrula reticulata* Sow. gen. n. XXIV.

Hab. Florida (Humphr. Phil. Jay) Georgia and East Florida (Say.) Campeche (Phil.)

*Sp. dub.*

*Ficus* Seba t. 58. f. I?

*Ficus tenuis magna cancellata* vel. *hispanica reticulata* Mart. 3. p. 17. f. 733.

*Ficus cancellata* Kl. §. 208. n. 8.

*Pyrula ventricosa* Sow. Tank. p. XVII. n. 1614.

p. p.

Hab. „Westind.“ Martini.

an var. major *P. reticulatae*?

~~~~~

## Fam. Cypraeacea.

### Cypraea L.

*Sbg. Erythraea Tournef. Barelier.*

(Tigris Troschel non. Kl.)

392. *Cypraea cervus* L. Mantiss. p. 548.

*Concha ven. maxima fusca innumeris maculis* List. 697. f. 44.

*Die grosse Porcellane* Knorr I. t. 5. f. 3—4.

*Die westindische Argus* Val. Verh. 585. f. 83 et p. 540.

*Faux argus de la grande espèce* Dav. 279. n. 580.

*Argus Indiae occidentalis fuscus* Mart. 2. p. 348. f. 257—58.

*Le Firmament ou la Perdrix orientale* Fav. Cat. p. 69. n. 298.

*Cypraeorum maxima* Ch. X. f. 1393.

*Cypraea oculata* Meusch. 1778. n. 1066. Zoophyl. 1271. Gm. p. 3403.

*Cypraea atheroma* Meusch. Gev. p. 402. n. 367—68.

*Cypraea cervina* Lam. Enc. meth. t. 351. f. 3.

*Cypraea argus occidentalis* Humphr. Cat. p. 9. n.  
132. p. p.

*Cypraea meleagris* Bolt. 305.

*Cypraea leucopsis* Shaw Misc.

Hab. Westind. Valentyn, Kien. Pacific ocean under stones  
(Cumg.) J do not know any perfectly authentical specimen  
from Westindia.

393. *Cypraea exanthema* L.

*Concha venera major fusca cui maculis majusculis  
albis* List 669. p. 15. t. 698. f. 45.

*eadem fasciata* List. 699. f. 46.

*Venera ovi gallinacei figura exprimans* Buon. f. 257.  
266. 267.

*Concha venera jamaicensis* Petiv. Mém. Cur. 1708.  
p. 157. n. 9.

*C. v. laevis subfusca.* Sloane p. 234. 235.

*Erythraea maculis fuscis* Barel. 1714. Ic. 1133. t.  
1321. f. 22.

*Porcellana spiralis* Gualt. t. 16. f. O.

*Porcellana* Seba t. 76. f. 4. 5 & 15.

*Argus pupilla fusca in iride alba* Mart. 1. f. 289.  
298. 300.

jun. *Cypraea Zebra* L. Gm. 3 non.

*Rhombus tenuis ex fusco fasciatus* List. 791. 37.

*Cypraea bifasciata* Gm. 3405. n. 33.

*Cypraea plumbea* Gm. 3403. 17.

*Cypraea dubia* Gm. p. 3405. n. 30.

var. b. *maculis perpaucis ocellatis* Lam. IX. p. 488.

Hab. Jamaica (List.) Cuba (Sagra) Martinique, Guade-  
loupe, St. Lucie (Candé, Beau) St. Barth, St. Martin,  
St. Thomas (Krebs, Riise) St. Croix (Hornb.)

var. c. *pumilio* Anegada (Riise.)

var. d. *piriformis.* Sow. Ill. f. 330.

394. *Cypraea mus* L.

*C. ven. fusca angustior minime gibba maculis latis  
fuscis rufescentibus.* List. 688. f. 35.

- Venerea mole parva, Brasilia Buon. f. 325. (jun.)  
 Het Carthageensche Kliphooorn Rumph. t. 39. f. S.  
 Porcellana maculosa carthageniensis Heb. Richt.  
 p. 300.  
 Klipklevers Seba t. 76. f. 33. 34.  
 Porcellana aus Maricaibo Knorr 3. t. 12. f. 3.  
 Fav. pl. 30 A. f. A.  
 Porcellana Achatas linea fulva virgata d'Argv. p.  
 267. t. 8. f. 2.  
 Le Leopard, le Crapaud Dav. p. 269. 568. 273. 579.  
 Porcellana Carthageniensis Mart. 1. p. 315 & 324.  
 222—23.  
 Cypraea vanelli (Guinea) Humphr. p. 8. n. 120.  
 Cypraea autumnalis Perry t. 21. f. 2.  
 jun. Bulla non umbilicata rarior subalbida Mart. 1.  
 f. 209. 210.  
 Bulla ferruginea Gm. p. 3432. Dill. Wood. t. 18.  
 . 13.  
 Hab. Cuba (Sagra) Martinique (Candé) Curaçao (Swift)  
 Bonaire (Dietz.) Carthagenia (Rumph.)
395. *Cypraea cinerea* Gm.  
 Concha venerea fusca, valde laevis duabus fasciis  
 albidis exornata List. 667. f. 11.  
 Concha ven. parva subcinerea ventre candida unica  
 fascia fusca List. 668. f. 13.  
 C. v. parva subfusca, levis, elato dorso bifasciato  
 List. 670. f. 16.  
 C. v. Jamaicensis fusca fascia rufa. Pet. Gaz. n.  
 585. t. 80. f. 5.  
 Sloane Jam. II. p. 235.  
 Porcellana spiralis levis subflava Gualt. t. 16. f. H.  
 L. M.  
 Porcellana spiralis levis subflava Gualt. t. 16. f.  
 L. M.

*Porcellana cinerea* latis fasciis fuscis Mart. 1. p. 316, 346. f. 254—55.

*Cypraea fragiliodes* Meusch. 1778. n. 1051. (List. 670. f. 16) Zoophyl. 1262.

*Porc. grisea* Meusch. Gev. n. 1349?

*Cypraea cinerea* Gm. 3402. 16. Lam. IX. p. 579. 22.

*Cypraea translucens* Gm. 3404.

*Cypraea sordida* Lam. IX. p. 510. n. 24. Ki. t. 26. f. 2.

*Cypraea succincta* „L.“ Mörch Cat. Yoldi. n. 2148. Hab. Jamaica, Barbados (List.) St. Thomas, Tortola, St. Barth, St. Martin, Anguilla, St. Domingo, Barbados (Krebs) Cuba, Martinique, Jamaica (d'Orb.) Guadeloupe (Beau) Vera Cruz (Liebm.) Bonaire (Riise)

396. *Cypraea surinamensis* Perry.

*Cypraea surinamensis* Perry 1811. pl. XX. f. 4.

*Cypraea surinamensis* Mörch Yoldi p. 116. n. 2184.

*Cypraea surinamensis* MSS. Br. Mus. Sow. Thes. f. 514. 15.

*Cypraea nebulosa* Kien. p. 63. t. 32. f. 3, non ab-similis.

Hab. Surinam (Perry.) Kurachie Woodw. Sir D. Barkleys coll. The specimen of Count Yoldi was obtained by Mr. Cuming and is probably the same figured by Sowerby. Seq. an var.?

\* 397. *Cypraea Aubryana* Jousseume.

*Cypraea Aubryana* Jouss. Revue Zool. 1869. p. t. 18. f. 1—3.

*Cypraea Aubryana* Sow. Thes. f. 529—30.

*Cypraea bicallosa*, non bicalleusc. Coll. de Guadeloupe.

Hab. Guadeloupe (Musée des colonies de Paris.)

*Sbg. Erosaria Troschel* (Luponia „Gray“, Mörch 1853.)

398. *Cypraea bicallosa* Gray.

*Cypraea bicallosa* Gray. Misc. 1. p. 35. Descr. Cat. p. 7. n. 56?

*Cypraea bicallosa* Sow. Ill. n. 50. f. 10. Reeve f. 79.  
Hab. St. Vincent W. Ind., Guilding (Reeve) Vera Cruz  
vel St. Thomas (C. Wessel.)

*Marie galante* (Beau) verisim. sp. praeced.

399. *Cypraea spurca* L.

Conch. ven. Barbado. minor maculis flavescens  
Petiv. n. 586. t. 95. f. 13. Mus. Gottw. pl. 5. f. 18?

Porcellana in utroque latere fimbriato Mart. 1. p.  
402. f. 335.

*Cypraea lota* Born. p. 178. t. 8. f. 4. 5.

*Cypraea acicularis* Gm. p. 3421. n. 107.

*Cypraea flaveola* Lam. Enc. 356. f. 14. non L.

*Cypraea spurca* L. O. Fabr. Act. Hafn. 1821. 1824.  
p. 75. d'Orb. Cuba n. 266.

*Cypraea flaveola* Desh. X. p. 558. n. 86.

Reeve f. 95.

*Cypraea flaveola* var. *alba* Sow. Ill. f. 81. 83. 104.

*Luponia flaveola* Roberts Am. J. C. 1870. p. 195.

*Cypraea flaveola* var. *labro-lineata* Gask. Proc. 1848.  
p. 97?

Hab. Antill. (Hotess. Desh.) St. Croix (O. Fabr.) Mar-  
tinique, St. Lucy, Cuba (d'Orb.) Guadeloupe (Beau) St.  
Thomas, St. Croix, St. Martin, Barbados (Krebs, Riise,  
Hornb. etc.) Vera Cruz (Liebm.)

**Trivia Gray.**

400. *Trivia pediculus* L.

Concha ven. striata cui summo dorso sinuato fusca  
nebulae striis eminentibus conspicuis List. 106. f. 56.

C. v. *americana* striata exigua Pet. Mem. Cur. 1708  
p. 157. n. 16 Sloane Jam. 2. p. 236.

Porcellana fimbriata striata Gualt. t. 15. f. P. R.

Mus. Gottw. IV. t. IV. f. 45. a. f.

Pou de mer d'Argy. t. 18. f. L. Zoom. p. 40. f.  
I. J. K.

Globuli marini s. Nussatellanae granulatae Seba t.  
55. f. 22.

Ziczac Porcellaine Knorr VI. t. 17. f. 5.

Cypraea transverse striata Browne Jam. p. 410.

Cypraea pisum Meusch. 1778. n. 1071.

Cypraea sulcata Dill. 1. p. 666. n. 62. excl. var.  
var. labiosa Gask. Proc. 1833. p. 202?

Hab. Jamaica, Barbados (List.) Cuba (Pfr., Sagra)  
Martinique (Candé) Guadeloupe (Beau) St. Thomas,  
St. Croix, St. Johns, Tortola, St. Martin, St. Barth,  
Anguilla, Barbados, Trinidad (Krebs.)

var. picturata.

Hab. Florida.

401. *Trivia suffusa* Gray.

*Trivia suffusa* Gray Deser. Cat. n. 134. Sow. Ill.  
f. 41. Reeve f. 142.

*Trivia suffusa* Desh. IX. p. 566. n. 97. Yoldi 2221.

*Cypraea armandina* Duclos. Kien. n. 140. pl. 46. f. 2.  
Pot. & Mich. 1. p. 477 (nomen).

*Cypraea pullata* Hugh Oven. teste Sow. Thes.

Hab. Guadeloupe (Beau) St. Thomas, St. Croix, St.  
Barth, St. Martin, Anguilla, Barbados, New Providence,  
Trinidad, Watling (Krebs.)

402. *Trivia quadripunctata* Gray.

*Trivia quadripunctata* Gray Deser. Cat. p. 14. n.  
120. Sow. Ill. f. 33.

*Cypraea quadripunctata* Reeve f. 146. Desh. IX.  
p. 569. n. 101.

*Cypraea rotunda* Kien. n. 141. t. 53. f. 2. Mörch  
Yoldi p. 2220.

Hab. Cuba, St. Lucy, New Orleans (d'Orb. p. 270) St.  
Thomas, St. Croix, St. Johns, St. Barth, St. Martin,  
Anguilla, Barbados, Trinidad, Jamaica (Krebs, Riise)  
Watling, Guadeloupe, New Providence (Krebs.)



\* 403. *Trivia candidula* Gask.

*Cypraea candidula* Gask. Proc. 1835. p. 200. Sow.  
Ill. f. 149.

*Cypraea candidula* Reeve f. 151. 154.

*Cypraea olorina* Ducl. (teste Gask.)

*Cypraea approximans* Beck. (teste Gask.)

Hab. Mexico (Gask.)

404. *Trivia globosa* Gray.

*Trivia globosa*-China Gray Descr. Cat. n. 121.  
Sow. Ill. n. 134. f. 34.

*Cypraea pilula* Kien. Krebs Cat. p. 41.

*Cypraea subrostrata* var. *alba* Krebs p. 42.

Hab. Cuba (Auber) N. Orleans (d'Orb.) St. Barth, An-  
guilla, St. Croix, St. Martin, St. Jean, Guadeloupe,  
(Krebs).

405. *Trivia subrostrata* Gray.

*T. globosa* obscure-violacea.

*Trivia subrostrata* Gray Descr. Cat. n. 124. Sow.  
Ill. f. 36.

*Cypraea subrostrata* Reeve f. 147.

Hab. Guadeloupe (Beau) St. Johns, St. Croix, St. Barth,  
Anguilla, Barbados (Krebs) St. Thomas (Riise, Krebs).

406. *Trivia nivea* Gray.

*Trivia nivea* Gray Descr. Cat. n. 127. Sow. Ill.  
f. 38.\*

*Cypraea nivea* Gray Reeve f. 136.

*Trivia oryza* Gray Z. J. III. p. 319. Gask. Proc.  
1848. p. 48.

*Cypraea scabriuscula* Kien. (non Gray.)

Hab. Cuba, New Orleans, Sur le côte nord (d'Orb. 217.)  
Guadeloupe (Beau) Cuba (Andrea) Anguilla, St. Croix,  
St. Barth, Watling J. (Krebs).

**Erato Risso.**

*Lachryma* Humphr. in Sow. Thes.

407. *Erato Maugeriae* Gray.

*Erato Maugeriae* Gray. Sow. Ill. f. 47. n. 4. Thes. p. 83. f. 7—9.

Hab. West Indies (Gray) St. Thomas, St. Barth (Krebs.) Guadeloupe (Beau) Curaçao, St. Martin (Krebs.)

*Spec. dubiae.*

*Erato?* *cypraeoides* C. B. Ad. Proc. Bost. Soc. 1845. p. t. Cat. p. 16.

*Erato?* *cypraeoides* Krebs Lyc. N. York. VIII. 1866. p. 395.

„T. solida, alba; anfr. infra suturam fusco-canaliculatis; spira plana, parva; apertura lineari, profunde emarginata; labro extra crasso, intus exile crenulato; labio per totum transversim exile plicato. Long. 0,325 poll., lat. 0,2 poll.“

Hab. Jamaica.

***Pachy bathron* Gask.**408. *Pachy bathron cassidiforme* Gask.

„T. subcylindrico-ovata, opaca, alba, leviter trifasciata, dorso longitudinaliter rude striata; spira brevissima, subacuminata; anfractibus quatuor prominulis, irregulariter crenulatis, ultimi margine posteriori carinam nodulosam extus sulco profundo circumdatam ad finem anteriorem aperturæ desinente, apice subobtusulo prominulo; basi subrotundata, lata, crassissima, ad marginem anteriorem abrupte terminata, et trans partem tertiam anteriorem testæ lateris ad extremitatem columellarem desinente; apertura angustiuscula, parum arcuata; labro crasso, margine interiori exiliter denticulato; margine columellari dentes 12—14 lineares remotos, basin trans-euntes et ad marginem interiorem sulci columellari<sup>s</sup> desinentes exhibente, sulco columellari lato, minime profundo; extremitatibus planis, prominentioribus, carinatis, posteriori non rostrato; canali profundo, breviusculo.“

Long.  $\frac{25}{100}$ , lat.  $\frac{15}{100}$  poll.

*Pachybathron cassidiformis* Gask. *Annals & Mag. Mag.* 2. Ser. 1853. p. 2. t. 12. f. 1—3. *Ad. Gen.* t. 20. f. 4.

*Pachybathron marginelloideum* Chenu *Man.* f. 1141.  
Hab. ad Ins. St. Vincenti (Gask.)

409. *Pachybathron marginelloideum* Gask.

T. subcylindrica, alba opaca, fascia brunnea spiram plerumque circumdante, fasciis tribus (quatuor?) lineis fulvis sagittaeformibus interruptis ciucta; dorso longitudinaliter leviter striato, sulcis remotis profundioribus parallelis excavatis impresso; spira plana, depressa (juniorum apice prominulo, obtuso), anfractibus 3—4, plus minusve crenulatis; basi rotundiuscula, lata, crassissima, ad marginem exteriorem abrupte latitudine decrescente et ad dorsum canalis desinente; apertura angustiuscula, parum arcuata, postice non rostrata; labro crasso, per totum marginem interiorem denticulato, latere columellari denticulis 12—13 fortibus remotiusculis linearibus a margine per basin usque ad marginem interiorem sulci columellaris extensis munito; sulco columellari lato, minime profundo; extremitalibus obtusis, crassis; canali brevi.

Long.  $\frac{28}{100}$ ; lat.  $\frac{16}{100}$  poll.

*Pachybathron marginelloideum* Gask. l. c. f. 4—6.

*Pachybathron cassidiformis* Chenu f. 1142.

Hab. in India occidentali. Gask.

## Fam. Amphiperasidae.

Ovula Lam.

Amphiperas Meusch.

Sbg. *Cyphoma* Bolt.

Ultimus Mtf. Carinea Sws. Binvoluta Schlüt.

410. *Ovula gibbosa* L.

Concha utroque latere se colligans Fab. Col. Purp.  
1616. p. 29. f. 5.

Venerea in littore brasiliiani frequens Bon. 339.

Cochlea eburnea Brasilia Bon. f. 249.

Venerea brasiliensis Mus. Kirch. p. 471. n. 338.

Concha utroque latere se colligans List. 711. f. 64.

Veneroides alba, Concha veneris effusa Petiv. Gazoph.  
1702. t. 15. f. 5.

Porcellana integra Gualt. t. 15. f. 3.

Porcellana albida gibbosa d'Argv. t. 18. f. Q.

Porcellanae albissimae Seba t. 55. f. 18.

Die gestumpfte Schn. Knorr I. t. 14. f. 3—6. VII.  
t. 32. f. 4.

Bulla brasiliensis alba, Mart. I. f. 213—14.

Cyphoma gibbosa Bolt. p. 15. n. 253.

var. *a* rostrata.

Bulla oblonga, non dentata Mart. 1. f. 211—12.

Cyphoma dorsata Bolt. p. 15. n. 254.

Ultimus gibbosus Mtf. 2. p. 642.

Ovula pharetra Perry t. 53. f. 2.

Ovulum gibbosum Sow. Thes. f. 17. 18?

Hab. Cuba (Sagra) Guadeloupe (Beau) Martinique, St.  
Lucie (d'Orb. n. 262) St. Thomas, St. Johns, Anguilla,  
Trinidad (Krebs, Rüse) Jamaica, Barbados, (Lister)  
Cumana, Anguilla (Krebs).

411. *Ovula intermedia* Sow.

Concha venerea altera dorso annulato, leviter ad-  
modum striata List. t. 712. f. 68.

Missile textorum Hebenstr. Mus. p. 302.

Porcellana rostrata, dorso parumper annulato Klein  
p. 90. n. 4.

Bulla oblonga Mart. 1. f. 215—16.

Bulla spelta L. Dill. 2. p. 775 9.

Ovulum intermedium Sow. Spec. Conch. p. 9. f.  
32—33.

Ovulum intermedium Sow. Thes. p. 479. f. 61—62.  
Hab. Brasilia (Mawe. Sow. Suenson).

*Sbg. Rhizorus Mtf.*

Simnia Leach 1826. Scymnia Risso.

412. *Ovula carolinensis* Mörch.

T. solidula, pallide isabellina, labro et labio candidissimis, antice et postice striata. Differt ab O. inflexo (Gulf of Dulce) Sow. Ill. f. 60 t. graciliore. Differt ab O. deflexo Sow. Thes. f. 37. 38 labro tenui.

Long.  $20\frac{1}{2}$  mm.; lat.  $5\frac{1}{2}$  mm.

Ovula uniplicata „Sow.“ Stimps. Check List. et in sched.

Hab. Charleston, S. Carolina (Stimpson com).

413. *Ovula acicularis* Lam.

Concha venerea parva, admodum tenuis leviter purpurascens List. \*) t. 711. f. 66.

Bulla secale Sold. MSS. Dill. Cat. 1. p. 474. Wood Index p. 85. n. 7. t. 18. f. 7.

Ovula acicularis Lam. Ann. du Mus. 9. Hist. VII. n. 9.

Ovulum aciculare Sow. Thes. p. 277. f. 43—46.

α. sulphurea.

β. purpurea.

Hab. Cuba d'Orb, St. Martin (Krebs) Guadeloupe (Beau) Antill. (Maugé) Terra firma (Hornb.) Jamaica (Soldr.) Corabai, St. Jean (Krebs).

414. *Ovula subrostrata* Sow.

T. obscure purpurea, utrinque acuminata.

Ovula subrostrata Sow. Proc. 1848. p. 136.

Ovula subrostrata Sow. Thes. f. 39. 40.

Hab. Honduras (Dyson.) Brasilia (Suenson.)

415. *Ovula uniplicata* Sow.

T. aurantia, antice angulata rostro subtorto.

---

\*) an sp. praeced.? sed „purpurascens“ non quadrat.

Ovula uniplicata Sow. Proc. 1848. p. 135

Ovula uniplicata Sow. Thes. p. 478. f. 30. 31. 32.

Hab. Brasilia (P. W. Lund) Rio Janeiro (Sow.) „South Carolina obtained, (not „dredged“) near Charleston S. Carolina by Mr. Cumg.“ probably erroneous.

\* 416. Ovula antillarum Sow.

T. obscure purpurea utrinque obtusa.

Ovula antillarum Sow. Reeve f. 64.

Hab. Antill. (Cumg.)

Ovalum aequale Sow. Ill. p. 61. Panama Cumg. peraffinis.

### Pedicularia Sws.

\* 417. Pedicularia decussata Gould.

Pedicularia decussata Gould Proc. Bost. Soc. V. 1854. p. 127. 1855. p. 126.

Pedicularia decussata Gould Otia p. 215.

Hab. Georgia & Florida (Gould.)

---

## Fam. Naticidae.

### *Stomatia* Hill.

Cryptostoma Blv. Sigaretus Lam.

418. *Stomatia depressa* Phil.

Weisse Ohrläppchen Knorr VI. t. 39. f. 5 non IV. t. 17. f. 5.

Cochlis elliptica etc. Mart. 1. f. 152?

Auris venerea alba. Humphr. Cat. p. 20. n. 330.

L'oreille de Venus toute blanche. Fav. p. 570.

Sigaretus depressus Phil. Abb. Juli 1844. p. 143.

t. 1. f. 3.

Sigaretus haliotoideum L. \*) Recl. Chenu Ill. p. 19.

t. 3. f. 6--7.

---

\*) *Helix haliotoidea* L. ex Hanley Ips. Conch. = *S. incisus* Reeve.

Sigaretus antillarum Recl. J. Conch. 1851. p. 185.

Sigaretus haliotoides d'Orb. Cuba p. 37. n. 124.

Cryptostoma Leachii Blv. Man. p. 467. t. 42. f. 3.?

Hab. St. Martin, Cuba (d'Orb, Liebm.) St. Thomas (Petit et Hornbeck) St. Jean (Magens, Sommer, Fru Eckardt, Ravn.) St. Thomas, Tortola (Krebs, Riise.)

419. *Stomatia perspectiva* Say.

Differt a praecedente T. convexiore, liris fortioribus.

Sigaretus perspectivus Say Am. C. p. 3. Sept. 1830. t. 25.

Sigaretus Leachii Blv. \*) Sow. Gen. n. XIX. f. 3.

Cryptostoma carolinum Cuv. R. A. 3. 91 (nomen).

Sigaretus perspectivus Dekay p. 153. t. VII. f. 156.

Hab. New Jersey and farther south (Say) Long Island (Dekay.)

*Sbg. Stomatia Hill.*

420. *Stomatia zonata* d'Orb.

Auris bahamica non perforata Petiv. Gaz. n. 587. 293. t. 11. f. 4.

*Stomatia gibbosa striis numerosis tenuibus, dusky chocolate* Hill p. 119. t. 7. f. 2. (1752.)

*Stomatia minor glabra* Browne Jam. p. 398. d'Arg. t. 8. f. D.? t. 7. f. C.

*Auricula muris* Mart. 1. p. 176. p. 196. t. 151 & 154.

*L'oreille de Venus* Fav. 1. p. 59. t. 5. f. C.

*Sigaretus zonatus* d'Orb. Cuba 2. p. 35. n. 215. (1842.)

*Sigaretus Martinianus* Phil. Abb. Juli 1844. p. t. 1. f. 5.

*Sigaretus maculatus* Say. Recl. Chenu Ill. p. 16. t. 1. f. 1a.

Hab. St. Domingo (Fav.) St. Croix (Magens, Oersted.)

---

\*) cfr. S. *Leachii* Blv, Reeve f. 13 Westindies.



Margarita (Hornb.) Guadeloupe (Hotessier, Beau) St. Martin (Krebs) St. Thomas (Riise) Brasilia (P. W. Lund.)

\* 421. *Stomatia maculata* Say.

*Sigaretus maculatus* Say Am. Conch. n. 3. Sept. 1830.

*Sigaretus maculatus* Phil. Abbild. t. 2. f. 9 (copi.)  
Hab. on the South coast of North America (Say.)

### Natica Lam.

#### Sbg. *Naticina* Gray.

421. *Natica* (*Naticina*) *semisulcata* Gray.

*Natica semisulcata* Gray Beechy Voy. p. 136.

*Natica semisulcata* Phil. Abbild. p. 16. t. 1. f. 10.

*Natica semisulcata* Reeve f. 116.

Hab. Portorico (Reeve) St. Martin, St. Croix, St. Thomas, Tortola (Krebs, Riise). *Sarasota, Simpson*

#### Sbg. *Neverita* Risso.

422. *Natica* (*Neverita*) *campechiensis* Recluz.

*Cochlea alba umbilico pulvinato margine circumdato clavicula compressa* Lister t. 562. f. 9.

*Neritaeformis pressa* Meusch. Mus. Gev. 1787. n. 325 p. p.

*Nerita duplicata* S. Amer. Br. Mus. Wood Supp. t. 8. f. 11.

*Natica campechiensis* Recl. Chenu Ill. t. 4. f. 9.

*Natica campechiensis* Reeve Ic. f. 1.

Hab. Sin. Campechiensis Ind. occid. (Lister.)

423. *Natica* (*Neverita*) *fossata* Gould.

T. *perforata*.

*Natica fossata* Gould Bost. Proc. II. 1847. p. 263.

*Natica texasiana* Phil. M. Zeitschr. 1848. p. 158 (Mart. 1849.)

*Natica texasiana* Römer Texas 1849. p. 457. n. 82.  
var. *a.* t. paulo magis depressa, umbilico simplice.

var.  $\beta$ . t. paulo magis elevata, umbilico striato extus margine prominente baseos, veluti carinula cincto (Phil.)  
 Hab. Florida coast (Gould, Stimps.) Galveston, Texas (Römer) Vera Cruz (Liebm.) St. Anna (Casp.)

an var. praecedentis?

424. *Natica* (*Neverita*) *duplicata* Say.

*T. imperforata*.

*Natica duplicata* Say Journ. Ac. Sc. II. p. 247.

*Natica duplicata* Philippi Abbild. pl. 1. f. 9.

*Natica duplicata* Gould Mass. p. 236. f. 164. ed. 2. p. 345.

Hab. Charleston S. Carolina (Stimps.) Mouth of Rio grande (Schott.) Nantucket common, Boston (less common.)

*Sbg. Mamilla Schum.*

*Naticella* Sws. Ruma Ch. Ad.

\* 425. *Natica* (*Mamilla*) *Bernardii* Recluz.

*Natica Bernardii* Recluz J. Conch. 1851. p. 197. t. 15. f. 1.

Hab. Golf de Mexique (Recl.) *Exotic?*

*Sbg. Pollinices Mf.*

*Mamma* Kl. p. p. Mörch. Ad. *Albula* Bolt. p. p. *Eucaryum* Ehrb. *Naticina* Guild.

426. *Natica* (*Pollinices*) *fuscata* (Ch.) Humphr.

*Cochlea subflava unicolor* List. 566. f. 14.

*Platystoma subflavum, unicolor* Klein p. 15. §. 40. n. 7.

*Vitellus saturate flavicoloris* Seba. t. 38. f. 32-33.

*Klappenschnecke* Knorr 1768. IV. t. 8. f. 4.

Geve t. 28. f. 306.

*Mamelon souci* Davila Cat. p. 119. n. 125. t. 2. p. 285. 1.

*Cochlea semilunaris mammaeformis, maxime umbilicata* Favart 2. p. 304.

Mamelon ou le Teton brun de Venus Fav. 1780.  
t. 2. p. 285. t. XI. f. H. 1.

Mamma veneris fuscata seu lutea Ch. V. p. 282.  
f. 1932—33.

Nerita mamilla  $\beta$ . Gm. 1789. p. 3676.

Nerita mamilla Schröt. Einl. t. II. p. 232.

Uber fuscatum Humphr. 1797. p. 21. n. 347.

Albula hepatica Bolt. p. 14. n. 249 (1798.)

Natica brunnea Linck Rost. 1807. p. 140.

Natica mamillaris Lam. V. p. 197. n. 3.

Natica mamillaris Reeve f. 29.

Natica fuscata Ch. Mörch Yoldi n. 2447.

Hab. Barbados, Jamaica (Lister) St. Thomas (Ch. Riise, Krebs) Cuba, St. Lucie (d'Orb. n. 210) Jamaica, Carthagena (Krebs) Margarita (Hornb. long. 75 mm.) Catanguiba (Hygom) Vera Cruz (Liebm.) St. Anna (Casp.)  
var.? obscura.

Natica bahiensis Recluz J. Conch. 1850. 1. p. 399. \*)

Hab. Bahia (Recl.)

\* 427. Natica (Pollinices) Draparnaudi Recl.

Natica Draparnaudii Recl. J. Conch. II. 1851. p. 198. t. 5. f. 11.

Hab. Le Golf de Mexique? Petit Coll. *err. of habitat.*

\* 428. Natica (Pollinices) candidissima Recl.

Natica candidissima Recl. J. Conch. II. 1851. p. 87. t. 2. f. 3.

Hab. Bahia.

---

\*) T. ovata, ventricosa, solida, superne cervina, inferne albido cinerascens; spira vix exserta, conico-depressa, albida; anfractu infimo versus suturam compressiusculo; apertura obliqua, semicirculari, intus rufo-fusca; labio oblique subrecto, superne et extus callo, incrassato, medio sulco diviso; umbilico pervio, canali lato, intense luteo rufo, medio spiraliter anguloso. Alt. 28 mm.; lat. 26 mm. Ap. alt. 26 mm. ap. lat. 12 mm. (Recluz.)

429. *Natica* (*Pollinices*) *ochrostoma* Recl.

*Natica ochrostoma* Recl. Journ. de Conch. 1850.  
p. 391. t. 19. f. 10.

Hab. Tortola, brought by a fisherman with other shells  
1859 (Swift.)

\* 430. *Natica* (*Pollinices*) *porcellana* d'Orb. mss.

T. anguste profunde umbilicata, oblique globosa,  
solida, spira brevi, obtusa anfractibus superne concavo-  
unidentatis, deinde convexis, apertura lunari-ovata, colu-  
mella superne late callosa, callositate parva columnari  
intrante; caerulescente lactea, epid. corneo flavicante  
partim induta.

*Natica porcellana* d'Orb. mss. Reeve. Ic. 1855. f. 102.  
Hab. Bahia (Mus. Cumg.)

\* 431. *Natica* (*Pollinices*) *uberina* d'Orb.

T. ovali, ventricosa, crassa, laevigata, alba; spira  
prominula, acuta; anfr. senis, convexiusculis, ultimo  
magno; apertura semilunari, apertura angulo posteriori  
crassissimo, umbilico sulcato (callo funiculari; ex icon.)  
Long. 20 mm.; diam. 15 mm.

*Natica uberina* d'Orb. Cuba p. 31. t. XVII. f. 19.  
Hab. Cuba (Sagra) Martinique, Guadeloupe, St. Lucie  
(St. Cyr. Hotess.)

432. *Natica* (*Pollinices*) *lactea* Guild.

*Uber albatum* Humphr. Cat. p. 21. n. 345 (nomen.)

*Naticina lactea* Guild. Linn. Trans. t. VI. p. 29.

*Natica nitida* Don. d'Orb. 2. p. 32. n. 209.

*Natica pes elephantis* Pfr. W. Arch. 1840. 1. p.  
254. 289 non Ch.

*Natica Pfeifferi* Phil. Mke. Zeitschr. 1851. p. 45.  
n. 43.

*Natica Pfeifferi* Phil. Küster 2. t. 19. f. 12.

Hab. Cuba, Martinique, St. Lucie, Guadeloupe (d'Orb.)  
St. Thomas, Tortola (Riise) Vera Cruz (Liebm.) N.  
Provid., Porto Plata (Krebs.)

433. *Natica* (*Pollinices*) *caribaea* Phil.

T. ovata, sordide alba, ad suturam zona lactea munita; anfractibus superius vix convexis, spira brevi, acuta; apertura semiorbiculari, umbilico parvo; callo lato cum labio confluyente illum maxime ex parte opplente.

Alt. 8; diam. 7 lin.

*Nerita nitida* Don. IV. 1802. pl. 144?

*Nerita nitida* Mtg. Supp. p. 149.

*Natica mamilla* Lam. Brown. Ill. 1827. t. 43. f. 7—11 bene.

*Natica caribaea* Phil. Proc. 1850. p. 234.

*Natica caribaea* Phil. Reeve Ic. 1855. f. 168.

Hab. St. John (Phil.) Tortola (Krebs) St. Croix, Guadeloupe (Riise.)

„Forma omnino accedit ad *N. mamillatam* vel *N. lacteam* et umbilico pervig cum *N. lacteo* convenit. Differt tamen umbilico longe angustiore, et callo ejus longe majore; an nihilominus mera var.? *N. uberina* d'Orb. t. longe angustiore magis differre videtur. (Phil.)

***Natica Adams***, s. strict.

*Sbg. Stigmaulax* Mörch.

operculum costa mediana lata aspera.

434. *Natica* (*Stigmaulax*) *cancellata* Herrm.

Operculum: costa mediana crassa verrucosa, lineis 3 marginalibus compressis serratis, deinde lira crassa. (coll. Swift.)

*Cochlea variegata cancellata* List. 556. f. 16.

*Cochlea carolina* rugis tessellatis undatis; lattice furrowed. Petiv. gazoph. n. 566. t. 69. f. 5.

*Nerita rugosa granosa*, flammis rubicundis insignita Chem. V. f. 1911—12.

*Nerita cancellata* Herrm. Ntf. 1781. XV. Stück. t. 2. f. 8—9.

*Nerita cancellata* Gm. p. 3670.

*Cochlea sulcata* Bolt. p. 104 n. 1859.

*Natica cancellata* Lam. VI. p. 204. n. 31.

*Natica sulcata* Reeve f. 91. 95. p. p. Desh. VII. p. 645. p. p.

*Natica* (*Stigmaulax*) *rugosa* Ch. Mörch Yoldi. n. 2464. p. 133. Schröt. Register.

Hab. Westind. (Chem.) St. Thomas (Riise) Guadeloupe (Beau) St. Johns, Porto-Plato, St. Croix, Trinidad (Krebs.)

Differt a sequente testa candida fulvo nebulosa, spiraliter lineata, costis decussatis.

435. *Natica* (*Stigmaulax*) *sulcata* Born.

Operculum: costa mediana conferte et irregulariter mamillato-verrucosa, marginem versus laevigata; margine externo sulcis acutis 4 inaequalibus (coll. Riise.)

*Nerita sulcata* Born Ind. p. 466. Mus. p. 270. t. 17. f. 5—6.

*Nerita rugosa*, anfr. longitudinaliter rugosis Ch. V. f. 1902—3.

*Nerita rugosa* Gm. p. 3673.

*Cochlis plicata* Bolt. p. 104. n. 1858.

*Natica costata* Mke. Malsb. 1829. p. 12. Synops. p. 47.

*Natica* (*Stigmaulax*) *sulcata* Mörch Yoldi n. 2463. Hab. St. Thomas, St. Croix. Guadeloupe (Riise, Krebs.)

Differt a pracedente t. unicolore, substantia dura, interstitiis costarum spiraliter impresso-lineatis.

\* 436. *Natica* (*Stigmaulax*?) *Haneti* Recluz.

*Natica Haneti* Recl. J. Conch. 1. 1850. p. 289. t. 13. f. 6—7.

Hab. Bahia (Hanet.)

*Subg. Nacca Risso.*

Operculum multisulcatum.

437. *Natica* (*Nacca*) *canrena* L. Ch.

*Cochlea fusca*, cujus lineis spirales aliquot albicantes

intersecant characteres quidum nigri List. t. 556. f. 4.  
(opereulum.)

*Cochlea umbilicata rotundata et nitida* Buon. p. 16.  
f. 372.

*Cochlea umbilicata* Kirch. p. 365. p. 473. Petiv. t.  
156. f. 4.

*Cochlea marina umb. fulvida a.* Gualt. t. 67. f. V.

*Cochlea marina* Geve t. 27. f. 290<sup>b</sup>.

*Cochlea marina* d'Argv. t. 7. f. A.

*Nerita ombilique des indes* Dav. Cat. p. 116. n. 166.

*Die bandirte halbe Mond* Knorr III. t. 15. f. 4.  
t. 20. f. 40.

*Platystoma litterata* Klein. §. 39. p. 13.

*Ala papilionis* Ch. V. f. 1860—61. (operculum.)

*Natica fascié* L'aile de papillon. Fav. 2. p. 276.

*Neritaeformis fusca* Meusch. Gev. 276. n. 338. (Gualt  
67. p. V.)

*Nerita pellis erminea* Martyn Un. Conch. 109.  
(Chenu ed. t. 37. f. 3.)

*Lunatus vittatus* Humphr. Cat. p. 21. n. 307.

*Cochlis canrena* Bolt. n. 1843.

*Natica canrena* L. Lam. Enc. t. 453. f. 1. Sow.  
Gen. f. 1.

*Natica canrena* Pot. & Mich. Douai p. 291. t. 28  
f. 21—23. (op.)

Hab. Carolina, Bahama (Lister.) Pernambuco (Petiver)  
Martinique, St. Dominique (Fav.) Florida (Alphen) d'Orb.  
n. 207. St. Lucie, Guadeloupe, Cuba d'Orb., Jamaica  
Turks Island, Bermuda (Ad.) Rio Janeiro d'Orb. Am.  
mer. p. 400.

St. Barth, St. Thomas, St. Johns, Tortola, Anguilla,  
St. Martin (Krebs, Riise, Scholten, Magens, Sommer,  
Castonier.)

*Sbg. Cochlis (Bolt.) n.*

Operculum politum, sulco marginali impresso.



438. *Natica* (*Cochlis*) *pennata* Ch. Schröt.

*Nerita pennata maculis semilunaribus* Chem. V. f. 1921.

*Nerita pennata perforata* ib. p. 242.

*Nerita canrena* ♂. Gm.

*Nerita canrena* H. Dill. 1. p. 997.

*Nerita pennata* Schröter Register 1788. p. 72.

*Natica Chemnitzii* p. p. Pfr. Reg.

var.

*Natica cayennensis* Recl. J. C. 1850. p. 383. t. 14. f. 6.

Hab. Cayenne (Recluz.) Trinidad (Riise, Swift.) Westind. (Ch.), Catinguiba dredged in the river (Hvgom.)

Differt a sequente apertura patula, spira brevi.

439. *Natica* (*Cochlis*) *limacina* Jousseaume.

*Nerita maroccana* Chem. V. f. 1905. 6.

*Nerita marochiensis* Gm.

*Natica taeniata* Mke. Cat. Malsb.

*Natica Chemnitzii* Pfr. Register p. p.

*Natica limacina* Jousseaume Rev. Zool. 1874. 1. p. 14. t. 2. f. 7—8.

Hab. Trinidad (Riise) St. Croix (v. Eggers) Antill.? (Jouss.)

var. major. Long. 32 mm.; diam. 24 mm.

*Natica affinis* v. d. Busch. Phil. Abb. non absimilis.

Hab. Catinguiba (Hvgom.)

440. *Natica* (*Cochlis*) *livida* Pfr.

„T. subglobosa, solida, unicolore livida, anfr. 4 infra suturam oblique rugosis, ultimo ventroso; umbilico semilunari; callo fusco: apertura intus nitida, fusca: Pfr.

Long. 7, diam. 7 lin.

*Cochlea parva subrufa media et ima parte ustulatae albicante* List. t. 559. f. 2.

*Natica livida* Pfr. Arch. f. N. G. VI. 1840. p. 254. n. 99.

*Natica jamaicensis* Ad. Contr. 1850. p. 111.

*Natica jamaicensis* Ad. Reeve Ic. f. 131.?

var. *nigrescens* Ad. Contr. p. 112.

Hab. Cuba (Pfr.) Jamaica (Ad.) St. Thomas, Guadeloupe (Riise) St. Croix (Ovesen.)

\* 441. *Natica* (*Cochlis*) *rufilabris* Reeve.

T. obtecte umbilicata, subglobosa, tenuicula, spira mediocri, subexserta, anfractibus rotundatis, laevibus, apertura ovata, columella superne callosa, callositate lata reflexa umbilicum tegente; livido plumbea, obsolete fasciata, nitente, encausta columellari et callositate vivide castaneis.

*Natica rufilabris* Reeve Ic. f. 102. Juni 1855. \*)

Hab. Bahia (Mus. Cuming.)

an var. *praecedentis*?

442. *Natica* (*Cochlis*) *proxima* C. B. Ad.

*N. Dillwyni* Payr. peraff. Operculum laevigatum, costa et linea impressa marginali; anfr. primi opaci asperi.

*Nerita rufa* Mtg. Supp. p. 150. t. 30. f. 3. (bene.)

*Nerita rufa* Brown Ill. B. C. 1827. t. 43. f. 3—6.

*Nerita rufa* Brown Enc. Brit. VI. 902.

*Natica proxima* C. B. Ad. Contr. 1850. p. 111.

*Natica proxima* Reeve Icon. f. 126. mala.

Hab. Jamaica (C. B. Ad.) St. Martin, Porto Plata, St. Jean, Cuba (Krebs) St. Thomas, Curaçao, St. Croix (Riise), Vera Cruz, Liebmann.

Spm. max. diam. 13 mm.

442. *Natica* (*Cochlis*) *lacernula* d'Orb.

T. globoso-oblonga, laevigata, fusco-rubra, suturis albescens, zona alba antice cincta; spira brevi, acuminata, anfr. quinis, subconvexis, ultimo magno; apertura oblonga; aperturae angulo posteriori calloso; umbilico calloso, longitudinaliter fissurato. Long. 13. mm.; diam. 10. mm. d'Orb.

---

\*) an figura confusa cum praecedente?

Operculum politum, anguste marginatum; margine antico crasso subliliter granuloso. (M.)

*Natica pulchella* Pfr. Arch. f. N. G. 1840. p. 254. n. 100?

*Natica lacernula* d'Orb. Cuba 1842. 2. p. 35. n. 213. t. 17. f. 23—25.

*Natica Menkeana* Phil. Conch. Cab. t. 15. f. 8.

*Natica Menkeana* Mke. Zeitschr. 1851. p. 46.

*Natica arachnoidea* Mke. in litt.

*Natica depressa* Gray. (quorund.)

var. *a* lineis rufis sparsis.

Hab. Martinique, Cuba (Sagra, Candé) Portorico (Mke.) Nassau, Portorico, Anguilla, N. Providence, Watling (Krebs) St. Thomas, St. Croix (Rüse.)

\* 443. *Natica* (*Cochlis*) *Sagraiana* d'Orb.

*T. globosa*, tenui, laevigata, albescente, lineolis fuscis longitudinaliter undulatis, confertim interruptis ornata; spira brevi, obtusa, anfractibus quatuor convexiusculis, ultimo magno, umbilico calloso, antice fissurato, apertura ovali. d'Orb.

Long. 11 mm., diam. 10 mm.

*Natica pulchella* Pfr. Arch. f. N. G. 1840. VI. 2. p. 254.?\*) non Risso.)

*Natica Sagraiana* d'Orb. Cuba 1842. p. 34. n. 212. XVII. f. 20. 22.

*Natica Sagraiana* (*N. filosa* Phil.) Weink. Mittelm. 2. p. 247.

Hab. Cuba (Sagra) but the locality erroneous according to Recluz J. Conch. III. p. 271. I have not seen any American specimen.

---

\*) *N. pulchella* *T. parva*, subglobosa, nitida, alba, lineolis longitudinalibus undatis picta; spira mammillata; anfr. 3 convexis; umbilico callo nigricante clauso. (Pfr.)

Long.  $3\frac{1}{2}$ ; diam.  $3\frac{1}{4}$  lin.

= *N. Sagraiana* d'Orb. teste Philippi.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Mörch Otto Andreas Lawson

Artikel/Article: [Synopsis molluscorum marinarum Indiarum occideitalium imprimis Insularum danicarum. 14-66](#)