

culi, ultimus antice breviter deflexus, infra suturam linearem turgidulus, periphæria magis minusve acute carinatus, basi convexus; apertura diagonalis, rhombeo-lunaris; perist. subcallosum, marginibus subparallelis, dextro recto, basali perarcuato, reflexo, versus umbilicum sensim dilatato, lamina lata adnata illum fere claudente. — Diam. maj. 26, min. 23, alt. 13 mill.

Habitat in Chersoneso taurico.

Zur Gattung *Orthalicus* Beck.

Von Dr. L. Pfeiffer.

Nehmen wir, wie es zweckmässig scheint, die Gattungen *Orthalicus* Beck, *Limicolaria* Schum. und *Perideris* Shuttl. an, und fassen in denselben die in natürlichster Verwandtschaft stehenden, einzelner Merkmale wegen bald zu *Bulimus*, bald zu *Achatina* gezählten Formen zusammen, so ist es nothwendig, in diesen engeren Gränzen die einzelnen Arten schärfer zu sondern und dabei sowohl auf den Färbungscharakter als auch namentlich auf die Localität einigen Werth zu legen. Nach diesen Grundsätzen kann ich den von Hrn. Shuttleworth aufgestellten Arten von *Orthalicus* 3 neue hinzufügen, welche bisher als Varietäten des proteischen *Bul. zebra* Auct. betrachtet worden sind. Es sind dies folgende:

1. *O. Maracaibensis* Pfr.

T. ovato-conica, solida, striatula, albida, strigis latis angulosis, griseo-violaceis, fasciisque 3 obsoletis ornata; spira conica, vertice minuto, obtusulo, castaneo; anfr. 6—7 convexiusculi, ad suturam subregulariter longe plicati, ultimus spiram subaequans, basi parum attenuatus; apertura obliqua, subacuminato-ovalis; columella alba, callosa, substrictè recedens; perist. nigro-limbatum, rectum, marginibus

callo dilute castaneo junctis, basali arcuatim in columellam transeunte. — Long. 67, diam. 34 mill. Ap. 36 mill. longa, 21 lata.

Habitat Maracaibo (Gruner).

2. *O. longus* Pfr.

Bulimus zebra β Pfr. Mon. Helic. II. p. 144.

T. oblongo-conica, solida, striata, nigro irregulariter varicosa, albido et fulvido variegata, strigis flexuosis, coerulescenti-fuscis ornata; spira elongato-conica, vertice minuto, obtusulo, castaneo; anfr. 6—6 $\frac{1}{2}$ convexi, ad suturam profundam brevissime plicatuli, supremi fusco-unifasciati, ultimus spira multo brevior, subinflatus; apertura obliqua, acuminato-ovalis, intus submargaritacea, late nigricanti-stri-gata; columella callosa, substricta, basi subtruncata; perist. rectum, nigro-limbatum, marginibus callo lato, intrante, nigro-castaneo junctis. — Long. 56, diam. 27 mill. Ap. 25 $\frac{1}{2}$ mill. longa, 15 $\frac{1}{2}$ lata.

Habitat in republica Mexicana (Hegewisch).

3. *O. fulvescens* Pfr.

Bulimus zebra γ Pfr. Mon. Helic. II. p. 144. —
Chemn. ed. nov. Bul. t. 22. f. 11.

T. ovato-conica, tenuiuscula, striatula, subunicolor griseo-fulvescens, coerulescente obsolete nebulosa, irregulariter fusco-varicosa; spira conica, vertice minuto, obtusulo; anfr. 6 $\frac{1}{2}$ convexiusculi, ad suturam breviter plicati, ultimus spira brevior, infra medium obtuse angulatus; apertura obliqua, acuminato-ovalis, intus carneo-margaritacea, varicibus perlucentibus; columella alba, filaris, superne subtorta; perist. rectum, fusco-limbatum, marginibus callo intrante, extus circumscripto, castaneo junctis. — Long. 51, diam. 24 mill. Ap. 25 mill. longa, 15 lata.

Habitat...? Ex India occidentali allatus esse dicitur.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Zur Gattung Orthalicus Beck. 186-187](#)