

Diagnoses novorum Heliceorum.

Auctore E. A. Rossmässler.

1. *Clausilia bitorquata* Friv.

T. magna, vix rimata, clavato-fusifformis, subtilissime costulato-striata, cornea; (spira?) anfractus subplanulati, ultimus perquam latus; sutura parum exsculpta, subtilis; cervix impressa concava, basi parallele fortiter et longe crenulato-bicristata, fossula excavata interposita; apertura sub-tetragono-rotundata; faux bicanaliculata; peristoma continuum, solutum, reflexum; lamella sup. flexuosa, marginem extremum attingens, inferior approximata, subhorizontaliter curvata; plica palatalis una supera, longa, antice callum palatalem levem dilatatum attingens; plica columellaris immersa; lamella spiralis lam. superam subattingens; plica lunata subsemicircularis, basi cum callo palati confluens; clausilii lamina lata, ovata. Long. circiter 28 mill. lat. 7 mill.

Habitat in Syria. (E. v. Frivaldszky).

Utrum *Clausiliae tetragonostomatis* an *rugicollis* tribui magis adnumeranda sit, e specimine uno truncato et adeso non satis liquet. Ceteroquin species quam maxime distincta.

2. *Clausilia vesicalis* Friv.

T. perforato-rimata, fusiformis, gracilis, apice longe attenuata, obtusa, sublaevis, livida, sub sutura leviter albifilosa albounifasciata; anfr. 12 planulati, ultimus deorsum attenuatus; cervix pone marginem profunde constricta, subplanulata, ante constrictionem carina acuta perpendiculari in cristam basalem brevem transiente cincta; apertura pyriformis, elongata; peristoma continuum, breviter solutum, flexuosum, albosublabiatum; lamella sup. parva, non prorsus provecta; lam. inf. alteram ad latus sinistrum excedens, valida, flexuose decedens; lam. spiralis subtilis, remota; plicae palatales duae, altera supera longa, plicam lunatam

crassam, strictiusculam attingens, altera ex hac oriunda infera brevior; plica columellaris vix emersa. Alt. 19 mill.; lat. 4 mill.

Habitat in Syria. (E. v. Frivaldszky.)

Clausilia strangulatae affinis. Nomen similitudinem cervicis cum vesica pendente emplastro vesicatorio excitata indicat.

3. *Clausilia porrecta* Friv.

T. vix rimata, fusiformis, cornea, costata, costis tubulosis, fragilibus; spira attenuata, obtusiuscula; anfractus 10 planulati, ultimus deorsum attenuatus demum in collum longum compressum, declive productus; cervix concaviusculo-planata, striata, infra bicristata, crista superiore acute compressa; apertura rotundato-pyriformis; faux coarctata, bicanaliculata; peristoma continuum, longe solutum, expansum; lamellae approximatae, supera porrecta, brevissima; infera alteram subexcedens, subhorizontaliter curvata; lamella spiralis remota; plica palatalis altera supera mediocris, altera infera incrassata brevis, cristis interposita; plica lunata parva. Alt. 16 mill.; lat. 3 mill.

Habitat in Syria. (E. v. Frivaldszky.)

Clausilia Boissieri Chrp. affinis, habitum *Cl. exaratae* refert.

4. *Clausilia fauciata* Parr.

T. punctato-rimata, fusiformis, spira gracili-attenuata, obtusiuscula, brunnea, subtiliter costulato-striata, sericina; anfr. 11—12, planiusculi; sutura subalbofilosa, parce papillifera; cervix concaviusculo-planata, bicristata, crista altera inferiore a rima ad suturam usque arcu, margini exteriori parallelo, surgente, altera superiore oblique descendente, arcum alterius subattingente; apertura pyriformi-ovata; lamella supera subtilissima, marginem non attingens, infera parum elata, vix descendens, subtilis; lamella spiralis superam attingens; plica palatalis altera supera longa, altera infera brevis e plica lunata remotissima oriunda, inter cristas posita; clau-

silium valde curvatum, lanceolatum, acutiusculum. Alt. 17—20 mill.; lat. 4 mill.

Habitat in Syria. (E. v. Frivaldszky.)

Clausilia Zelebori Rm. proxima, habitu *Cl. vesicali* persimilis, sed cervice longe diversa.

5. *Clausilia clathrata* Friv.

T. dextrorsa, rimata, turrato-fusififormis, cornea, substriata, *varicosa*, *varicibus in anfractibus ulterioribus oblique curvatis*, apice obtuso; anfr. 8, *convexi*; sutura excavata, subalbofilosa; *cervix rugoso-varicosa*, basi leviter gibba; apertura pyriformis; peristoma continuum, breviter solutum, *albolabiatum*, expansum; lamella supera parva, infera elata, flexuosa, oblique descendens; lam. spiralis valida, remotiuscula; plicae palatales *tres*, aequales; plica columellaris subemersa; clausilium bilobum. Alt. 13½; lat. 3½ mill.

Habitat in Hungaria inferiore (E. v. Frivaldszky.)

Clausilia Bielzi Parr. proxime affinis, at notis indicatis bene distincta (cfr. Malak. Bl. III. S. 197 et Zeitschr. f. d. gesamt. Naturw. 1856. Bd. VIII.).

6. *Clausilia clandestina* Parreyss.

T. subcylindrica, griseo-cornea, substriata, ad apicem obtusum parum attenuata; anfr. 9 planiusculi; *sutura subtilis simplex*; cervix subtiliter striata, deorsum convexa, basi leviter gibba; apertura rotundata; *peristoma continuum*, appressum, labiatum juxta lamellam superam brevem protractam gibbum, reflexo-patulum; lamella infera parum elata, strictiuscula, oblique descendens; plicae palatales nullae; plica lunata *remota*, strictiuscula parum expressa *suturam non attingens*, *basi breviter appendiculata* et cum plica columellari *immersa* clausilium cingens; lamellae spirales duae, profunde immersae, imperfectae, exterior postice plica obliqua cum lamella supera fere conjuncta. Alt. 13—16, lat. 3—3½ mill.

Habitat in Boeotia. (comm. cl. Dr. Roth.)

Notis indicatis a *Cl. saxicola* Parr. (cfr. Icon. f. 864) bene distincta.

7. *Helix Lángi* Parr.

T. late et aperte umbilicata, depresso suborbiculata, subtiliter striata, albida, fasciis tribus brunneis, angustis; anfractus 5 depressiusculi, lente accrescentes; spira convexiuscula; sutura mediocris; apertura perobliqua transverse ovali-rotundata; margines aliquantum conniventes simplices, exterior deflexus, columellaris breviter reflexus e lamella lata oriundus. Alt. 13; lat. 25 mill.

Habitat in monte Parnasso.

Cuidam varietati *Helicis trizonae* Z. similis, sed minime *Helici frigidae* et *insubricae* J. affinis, ut vult auctor.

Malakologische Notizen aus dem Norden und Westen von Cuba.

Von J. Gundlach.

I. Drei neue Cyclostomaceen.

1. *Cyclostoma perlatum* Gundl. — Testa perforata, cylindrico-conica, truncata, tenuis, longitudinaliter costulata, striis nonnullis incrementi irregulariter decussata, pellucida, pallide fulvida, maculis castaneis transversim ante strias incrementi positis; anfr. $7\frac{1}{2}$ (superst. $3\frac{1}{2}$) convexi; sutura remote granulis albis crenata; apertura verticalis, ovalis; peritrema subliberum, duplex, internum breviter porrectum, externum in parte columellari latius expansum, concentricè striatum. Operc. laeve, tenue, nucleo excentrico, luteo-griseum. (Chondropoma). — Long. 19 mill. (superst. 15–16), diam. 8 mill.

Habitat prope Matanzas.

Thier weisslich, Hals und Kopf mit rosenfarbigem Scheine. Auf dem Kopfe befinden sich schwärzliche Zeichnungen und vor den Fühlern ein gemeinschaftlicher V-för-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Rossmässler Emil Adolf

Artikel/Article: [Diagnoses novorum Heliceorum. 38-41](#)