

5. *M. Weddellii* Hupé (p. 93. pl. 20. f. 2) von Santa Anna de Chiquitos in Brasilien.

Den Schluss des Bandes bildet noch ein Verzeichniss der beobachteten Echinodermen, Acalephen mit 2 Tafeln.

Journal de Conchyliologie VI. (2e sér. II. Vgl. Malak. Bl. 1858. S. 80—84.)

Vierte Lieferung. Antedatirt December 1857. S. 305—408 mit 4 Tafeln.

— Bemerkung über das Thier des *Onustus trochiformis* Born; von O. A. L. Mörch (S. 305—309. t. 13. f. 1—3). Gegen die Beibehaltung des nur aus Humphrey's Kataloge entlehnten Namens *Onustus* erklärt sich Hr. Fischer in einer Note mit Recht.

— Bemerkung über den Aufenthalt und die Beschaffenheit der Respirationsorgane der *Auricula myosotis*; von Mittre. (S. 310—327.) Beweis, dass dieselbe zu den Lungenschnecken gehört.

— Anatomische Bemerkungen über wenig bekannte Mollusken; von Fischer. (Forts. S. 327—339. pl. 13. t. 4. 5.) §. 26—31. Ueber *Sanguinolaria*, *Capsa*, *Amphidesma*.

— Beschreibung einer neuen *Kellia* von der französischen Küste und ihres Weichthieres; von Recluz. (S. 340—347. t. 12. f. 4. 5): *Kellia Cailiaudi*.

— Beschreibung eines neuen *Fossarus*; von Baudon. *F. Lanoëi* (p. 348.)

— Supplement zum Verzeichnisse der die Küsten Frankreichs bewohnenden Seemollusken; von Petit de la Saussaye. (S. 350—368.) Die Arten der Gattungen *Teredo*, *Xylophaga*, *Pholas*, *Solecurtus*, *Thracia*, *Lyonsia*, *Lavignon*, *Mactra*, *Erycina*, *Syndosmya*, *Corbula*, *Saxicava*, *Petricola*, *Tellina*, *Lucina*, *Nucula*, *Modiola*, *Mytilus*, *Lima*, *Pecten*, *Spondylus*, *Ostrea*, *Argyope* werden mit berichtigter Synonymie eingeordnet.

— Zusatz zu der Konchyliologie von Algier; von Morelet. (Forts. S. 369—376.) Beobachtungen von Grasset auf einer Reise nach der Oase von El-Aghouat am nördlichen Rande der Sahara. *Helix Massylaeu Mor.* ward im Gebiete der Ouled-Sassi nicht weit von Constantine gefunden. — *H. Bertieri* wird genauer beschrieben. Neu: *Helix modica Mor.* (p. 373. pl. 12. f. 8. 9.) und *H. Hippo-nensis* (p. 374. pl. 12. f. 6. 7).

— Beschreibung neuer Konchylien aus den oberen Lagen der Tertiärbildungen; von Mayer. (Schluss.) 9. *Tapes Bronni* p. 376, *Pecten Puymoriae* p. 377, *Chenopus Hupei* p. 378, *Nautilus Aquensis* p. 379. Dazu Taf. 14 Abbildung früher beschriebener Arten: f. 1: *Arca helvetica*; f. 2. 3: *Ostrea Dellosii*; f. 4: *Tapes Astensis Bon.*; f. 5. 6: *Lutraria helvetica*; f. 7. 8: *Arca Okeni*.

— Beschreibung einer neuen Art; von Crosse: *Conus Chevui* p. 381. pl. 11. f. 3. 4.

— Beschreibung neuer Arten; von Fischer: *Osteodesma Orbignyi* p. 382. pl. 11. f. 7. 8; *Fissurella Schrammii* p. 383. pl. 11. f. 5. 6; *Cochlodesma Cumingiana* p. 384. pl. 10. f. 3—5.

— Beschreibung neuer Arten; von Bernardi: *Conus Pazü* p. 385. pl. 11. f. 1. 2; *Fusus arthriticus* p. 386. pl. 12. f. 3; *Circe Robillardi* p. 387. pl. 11. f. 9.

— Beschreibung neuer Arten; von Lorois: *Terebra Bermonti* p. 389. pl. 12. f. 2.

— Bibliographie. Bergh Anat. Untersuch. der Fionia atlantica (F.); Alderia Scaldiana Nyst.; Grateloup essai sur la nourriture etc. des Mollusques. Pfr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Journal de Conchyliologie 171-172](#)