

spiriplana Oliv. zu bezeichnen. Olivier gibt als Vaterland seiner Art nur die Inseln Creta (?) und Rhodus; Roth führt zwar auch die Insel Rhodus an, wahrscheinlich aber nur auf Olivier's Autorität, da seine Beschreibung und Exemplare nur zu der Form von Jerusalem gehören. Leider kann ich Olivier's Beschreibung jetzt nicht vergleichen, aber nach der Abbildung, welche ich vor mir habe, scheint mir *Helix Malziana* vielmehr die ächte *spiriplana* zu sein, mit welcher sie in Grösse, Windungsverhältnissen und Mündungsform genau übereinstimmt. Es ist mir kaum denkbar, dass Uebergangsformen von der *Malziana* zu der in zahlreichen Exemplaren mir vorliegenden Roth-schen *spiriplana* vorhanden sein sollten, und wenn Olivier's Text eben so gut auf die mir bisher ganz unbekannte und gewiss sehr seltne *Malziana* passen sollte, als die Abbildung, dann müsste sie den alten Namen wieder erhalten und jene jetzt in den Sammlungen so häufige Schnecke einen neuen erhalten. Nur durch Vergleichung der *Helix Malziana* mit Olivier's Originaltext wird sich diese Frage entscheiden lassen. Bis dahin möge der von Herrn Parreyss gegebene Name der hübschen Art verbleiben.

Beschreibung neuer Heliceen *).

37a. *Helix trochiscus* Pfr.

T. imperforata, conica, solidula, laevigata, nitidissima, pellucida, cornea; spira convexo-conica; sutura submarginalis; anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus rotundatus, non descendens; apertura subverticalis, lunaris; perist. simplex, rectum, marginibus remotis, columellari brevi, substrieto, calloso-subinocrassato. — Diam. maj. 5, min. $4\frac{1}{2}$, alt. $4\frac{1}{4}$ mill.

Habitat in insulis Aroo.

*) Die vorgesetzten Nummern bezeichnen die Stelle, welche die Arten in meiner Mon. *Helic.* IV. einnehmen müssen. Pfr.

248 a. *Helix Dohrniana* Pfr.

T. perforata, depressa, suborbicularis, tenuiuscula, sublaevigata, parum diaphana, lutescenti-grisea; spira breviter conoidea, vertice minuto, obtuso; anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, regulariter accrescentes, ultimus non descendens, supra medium obsolete subangulatus, basi vix convexior, nitidior; apertura fero verticalis, transverse lunaris; perist. simplex, rectum, margine columellari declivi, levissime arcuato, ad perforationem reflexiusculo. — Diam. maj. $31\frac{1}{2}$, min. 28, alt. 15 mill.

Hab. Siam.

265 a. *Helix subcornea* Pfr.

T. subclause perforata, depressa, tenuis, laevigata, albido-cornea; spira vix conoideo-elevata, vertice subtili; sutura filomarginata; anfr. $7\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus vix latior, basi convexior; apertura verticalis, auriformi-lunaris; perist. simplex, rectum, margine columellari longe declivi, subincrassato. — Diam. maj. $13\frac{2}{3}$, min. $12\frac{1}{2}$, alt. 6 mill.

Hab. Siam.

Persimilis *H. resplendenti* Phil.; differt praesertim statura, numero anfractuum, etc.

344 a. *Helix Mouhoti* Pfr.

T. perforata, orbiculato-depressa, tenuiuscula, minute costulato-striata et superne lineis spiralibus impressis decussata, superne pallide cinnamomea, basi nitida, corneo-albida; spira convexa; sutura rufulo-marginata; anfr. 6 convexiusculi, lente accrescentes, ultimus non descendens, subtus convexior; apertura obliqua, lunaris; perist. simplex, rectum, margine columellari leviter arcuato, ad perforationem apertam triangulatim reflexo. — Diam. maj. 26, min. 23, alt. 14 mill.

Hab. Siam.

Differt ab affinibus *H. ceylanica* et *semipartita* anfractibus lente accrescentibus.

419 a. *Helix Paradensis* Pfr.

T. anguste umbilicata, depresso-turbinata, solidula, superne arcuato-striata, lineisque spiralibus sub lente conspicuis sculpta, lutescenti-cornea; spira conoidea, vertice minuto; anfr. 5 convexiusculi, ultimus latus, rotundatus, subitus radiato-striatus, nitidior; apertura obliqua, rotundato-lunaris, intus submargaritacea; perist. simplex, rectum, marginibus vix convergentibus, columellari superne subdilatato. — Diam. maj. 20, min. 17, alt. 12 mill.

Habitat Parada reipublicae mexicanae. (Sallé.)

423 a. *Helix mendicaria* Pfr.

T. medioeriter umbilicata, conoideo-semiglobosa, solidula, striata et sub lente breviter pilosa, cornea; spira conoidea, vertice subtili, nitido; anfr. $4\frac{1}{4}$ turgidi, ultimus vix descendens; apertura parum obliqua, lunato-subcircularis; perist. simplex, rectum, marginibus convergentibus, columellari vix dilatato, non reflexo. — Diam. maj. 8, min. 7, alt. $4\frac{2}{3}$ mill.

Hab. in intimis regni Tunetani. (Tristram.)

517 a. *Helix Carmeliensis* Pfr.

T. anguste umbilicata, depressa, tenuis, sublaevigata, pellucida, cornea, rufo indistincte radiata; spira convexa; anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, lente accrescentes, ultimus rotundatus, non descendens; apertura obliqua, lunaris; perist. simplex, rectum, marginibus distantibus, columellari superne vix dilatato. — Diam. maj. $3\frac{1}{4}$, min. 3, alt. vix 2 mill. (Mus. Cuming. et Coll. Pfr. nr. 1222.)

Hab. in monte Carmel.

526 a. *Helix Batesi* Pfr.

T. umbilicata, depressa, tenuis, dense et oblique pli-
catula, cornea, pliculis albidis; spira convexa, parum elata;
anfr. 5 convexiusculi, regulariter accrescentes, ultimus non
descendens, subdepressus, basi convexior; umbilicus latus,
 $\frac{1}{4}$ diametri subaequans; apertura diagonalis, rotundato-
lunaris; perist. simplex, rectum, margine basali arcuato, ad

insertionem vix patente. — Diam. maj. 11, min. $9\frac{1}{2}$, alt. 5 mill.

Hab. ad fluvium Amazonum superiorem. (Bates.)

531a. *Helix Turneri* Pfr.

T. angusto et clause umbilicata, depressa, subdiscoidea, tenuiuscula, conferte plicato-costata, diaphana, nitidula, corneo-lutescens, rufo-variegata et ad suturam distincte maculata; spira vix elevata; sutura denticulata; anfr. 4 convexiusculi, regulariter accrescentes, ultimus subdepressus, non descendens, loco umbilici lamina vitrea obtectus; apertura fere diagonalis, subtriangulari-lunaris; perist. simplex, rectum, marginibus distantibus, supero antrorum arcuato, basali medio denticulo albo munito, ad insertionem subdilatato. — Diam. maj. $7\frac{1}{4}$, min. $6\frac{1}{4}$, alt. 3 mill.

Hab. in Nova Caledonia.

694a. *Helix liratula* Pfr.

T. umbilicata, trochiformis, tenuiuscula, striata et liris filiformibus subconfertis cincta, diaphana, oleoso-micans, pallide corneo-lutescens; spira conica, apice obtusa; sutura impressa; anfr. $7\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus angulatus, non descendens, basi laevior, convexior; apertura vix obliqua, subangulato-lunaris; perist. simplex, rectum, margine columellari declivi, juxta umbilicum perangustum subdilatato. — Diam. maj. 6, min. $5\frac{1}{2}$, alt. 4 mill.

Hab. in insula Ceylon. (Thwaites.)

725a. *Helix Gassiesi* Pfr.

T. umbilicata, discoidea, carinata, tenuius, arcuato-striata et lineis impressis obliquis sub lente decussatula, nitida, lutescens, flammis crebris castaneis fulgurata; spira immersa; anfr. 4 convexiusculi, rapide accrescentes, ultimus magnus, utrinque convexior, medio subacute carinatus; apertura obliqua, subtriangulari-lunaris; perist. simplex, acutum, marginibus conniventibus. — Diam. maj. $8\frac{1}{3}$, min. $7\frac{1}{3}$, alt. 3 mill.

Hab. in insula Erromanga, Nov. Hebrid. (Turner.)

906 a. *Helix Tristrami* Pfr.

T. late umbilicata, perdepressa, acute carinata, tenuis, oblique plicato-striata, opaca, sordide albida, corneo obsolete variegata; spira vix elevata; sutura carina leviter exserta marginata; anfr. 5 planiusculi, sensim accrescentes, ultimus infra carinam compressam, crenulatam convexus, antice non descendens; apertura obliqua, subsecuriformis; perist. rectum, intus sublabiatum, margine supero antrorum arcuato. — Diam. maj. 12, min. $10\frac{1}{2}$, alt. 4 mill.

Hab. in regno Tunetano. (Tristram.)

1124 a. *Helix Nagporensis* Pfr.

T. latissime umbilicata, deppressa, tenuiuscula, oblique striata, opaca, carneo-albida; spira medio vix prominula; anfr. 4 vix convexiusculi, ultimus subtus vix latior, antice deflexus et subtus subconstrictus; apertura perobliqua, transverse ovalis; perist. tenue, marginibus convergentibus, supero recto, basali breviter reflexo. — Diam. maj. 10, min. 8, alt. 4 mill.

Hab. Nagpore Indiae. (Jerdon.)

1148 a. *Helix Batchianensis* Pfr.

T. angustissime umbilicata, conoidea, solida, oblique striata, fusca; spira convexo-conoidea, apice acutiuscula; sutura levis, carinato-marginata; anfr. 7, supremi plani, sequentes convexiusculi, ultimus carinatus, non descendens, basi profunde excavatus; apertura diagonalis, rotundato-lunaris; perist. rectum, marginibus distantibus, dextro subsimplice, basali incrassato, ad insertionem flexuose ascendente. — Diam. maj. $20\frac{1}{2}$, min. $18\frac{1}{2}$, alt. $11\frac{1}{2}$ mill.

β . Major, anfr. $8\frac{1}{2}$, ultimo infra carinam praecedentis recedente. — Diam. maj. $23\frac{1}{3}$, min. 22, alt. 14 mill.

Hab. in insula Batchian. (Wallace.)

Habitu similis *H. Troilo Gould*, basi excavata et umbilico angustissimo praecipue discrepans.

1313 a. *Helix Bougainvillei* Pfr.

T. imperforata, globoso-conoidea, solidiuscula, striatula,

irregulariter malleata et sulcis nonnullis spiralibus notata, nitida, saturate castanea; spira conoidea, vertice subtili, obtusulo; sutura pallide marginata; anfr. 5 modice convexi, regulariter accrescentes, ultimus rotundatus, peripheria obtuse angulatus; columella lata, oblique substricte descendens; apertura diagonalis, rotundato-lunarum, intus nitide coerulescens; perist. albo-callosum, breviter expansum, marginibus callo crassiusculo junctis, dextro regulariter arcuato.

— Diam. maj. $62\frac{1}{2}$, min. 51, alt. 39 mill.

Hab. in insula Bougainvillei.

1549a. *Helix aequatoria* Pfr.

T. imperforata, conoideo-depressa, solida, striatula et subtilissime punctato-granulata, subcarinata, saturate castanea; spira convexo-conoidea; anfr. 5 convexiusculi, ultimus antice deflexus, rotundatus, turgidus; apertura peroobliqua, sinuato-lunarum; perist. fusco-carneum, incrassatum, reflexum, marginibus callo funiculari junctus, supero arcuato, intus calloso (callo ad dextram abrupte desinente), dextro acute unidentato, basali dilatato, subappresso, intus medio tuberculo valido compresso munito. — Diam. maj. 38, min. 32, alt. 20 mill.

Hab. in republica Aequatoris. (Fraser.)

1631a. *Helix pudica* Pfr.

T. anguste umbilicata, trochiformis, tenuiuscula, striatula, superne striis confertis antrorum descendenteribus, subtus striis subconcentricis decussatula, lutescenti-carnea; spira conica, sursum rubescens, apice obtusula; sutura levata; anfr. 5 vix convexiusculi, ultimus non descendens, medio subacute carinatus, basi convexior, prope carinam castaneo-unifasciatus, antice tumidulus; apertura peroobliqua, rotundato-subrhombea; perist. subroseo-callosum, margine supero expansiusculo, basali flexuoso, reflexo, supra umbilicum dilatato, prope insertionem intus nodulo unico munito. — Diam. maj. 22, min. 19, alt. 14—15 mill.

Hab. in insula New-Briton.

1646 a. *Helix acmella* Pfr.

T. subobtecte perforata, turbinata, solidula, laevigata, nitida, lutea, sursum pallidior; spira regulariter turbinata, vertice minutissimo, acuto; anfr. 6 convexi, ultimus non descendens, basi planior; apertura diagonalis, sub-quadangulari-ovalis; perist. album, reflexum, margine dextro subflexuoso, columellari longe adnato, umbilicum canaliformem fingente. — Diam. maj. 26, min. 22, alt. 25 mill.

Hab. in insulis Admiralitatis.

1812 a. *Helix Eutropis Shuttleworth*
in Mus. Cuming.

T. umbilicata, lenticularis, solida, plicis validis obliquis utrinque sculpta, griseo-virens; spira breviter conoidea; sutura late carinato-marginata, crenata; anfr. $5\frac{1}{2}$, superne vix convexiusculi, ultimus peripheria acute filocarinatus, superne convexior, basi inflatus; umbilicus mediocris, vix pervius; apertura perobliqua, rotundato-lunaris, ad carinam subangulata; perist. vix callosum, marginibus approximatis, dextro expansiusculo, basali reflexo. — Diam. maj. 14, min. 12, alt. 7 mill.

Habitat . . . ?

1831 a. *Helix Isis* Pfr.

T. umbilicata, depressa, solidula, striatula, unicolor castanea; spira vix elevata; anfr. 5 vix convexiusculi, sensim accrescentes, ultimus antice subdeflexus, peripheria obsoletissime angulatus, subitus convexior; apertura obliqua, late lunaris, intus submargaritacea; perist. album, marginibus vix convergentibus, supero subhorizontali, expanso, basali late reflexo, ad insertionem breviter ascendentem, umbilicum mediocrem lamina dilatata semioccultante. — Diam. maj. 45, min. 38, alt. 19 mill.

Hab. in insulis Admiralitatis.

1852 a. *Helix hetaera* Pfr.

T. mediocriter umbilicata, conoideo-depressa, tenuiuscula,

oblique irregulariter rugulata et undique minute granulata, pallide lutescens, fasciis 3 rufis, 1 suturali, 2 approximatis periphericis cincta; spira breviter conoidea; anfr. 6 modice convexi, lente accrescentes, ultimus antice vix descendens; apertura obliqua, lunaris, intus submargaritacea; perist. fusco-carneum, breviter reflexum, juxta umbilicum dilatum. — Diam. maj. 19, min. 16, alt. $10\frac{1}{2}$ mill.

Habitat?

1860 a. *Helix occulta* Pfr.

T. anguste umbilicata, globoso-depressa, tenuis, sub lente undique minutissime granulata, fuscula; spira vix elevata; anfr. 4 convexiusculi, ultimus latus, antice deflexus et subconstrictus, basi ventrosior; apertura magna, obliqua, lunato-ovalis; perist. albo-callosum, marginibus approximatis, dextro expanso, basali reflexo, supra umbilicum dilatato. — Diam. maj. 12, min. 10, alt. 7 mill.

Hab. in insulis Aroo.

Differt ab affini *H. brevipila* anfractu ultimo lato, umbilico angustiore, apertura magna, subovali, peristomate calloso.

1861 a. *Helix albicostis* Pfr.

T. sublate umbilicata, depressa, tenuis, granulato-rugosa et pilis brevibus obsita, cornea, costulis obliquis albidis munita; spira parum elevata; anfr. 4 convexiusculi, ultimus superne subangulatus, supra angulum leviter sulcatus, antice deflexus; apertura perobliqua, ovalis; perist. tenue, marginibus fere contiguis, supero expansiusculo, basali breviter reflexo. — Diam. maj. $9\frac{1}{2}$, min. 8, alt. $4\frac{1}{3}$ mill.

Habitat Ahmednuggur Indiae.

1952 a. *Helix leucotropis* Pfr.

T. anguste umbilicata, depressa, solidula, conferte stria-tula, nitidula, carnea; spira breviter conoidea; sutura albo-marginata; anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus carina compressa, acuta, alba munitus, antice vix descendens, basi

convexior; apertura obliqua, subrhomboe-lunaris; perist. tenue, marginibus convergentibus, supero breviter expanso, basali reflexo, ad insertionem dilatato. — Diam. maj. 18, min. 15, alt. 8 mill.

Hab. in insulis Aroo. (Wallace.)

1952a. *Helix caseus* Pfr.

T. umbilicata, depressa, tenuiuscula, irregulariter striata et sub lente minutissime granulata, diaphana, albido-cornea vel pallide rufescens; spira vix elevata; sutura impressa; anfr. $4\frac{1}{2}$ planiusculi, ultimus superne obtuse carinatus, antice deflexus, basi turgidus, circa umbilicum conicum angulatus; apertura diagonalis, subelliptica; perist. album, undique sublate reflexum, marginibus approximatis, basali leviter arcuato, juxta umbilicum dilatato. — Diam. maj. 18, min. 15, alt. 9 mill.

Hab. Siam.

1991a. *Helix Livesayi* Pfr.

T. umbilicata, lenticularis, carinata, solidiuscula, capillaceo-striata et striis spiralibus obsolete granulata, sericea, corneo-albida, fasciis castaneis superne 2, basi unica ornata; spira conoidea, obtusa; sutura albomarginata; anfr. 5 convexiusculi, ultimus carina acuta, prominente, alba munitus, versus aperturam superne convexior, inde angustatus, subito deflexus, subtus scrobiculatus; apertura fere horizontalis, transverse subrhomboe-ovalis; perist. continuum, album, expansum et reflexum, margine basali intus valide unidentato, tum umbilicum angustum semitegente. — Diam. maj. 25, min. 21, alt. 10 mill.

Hab. in insulis Philippinis.

Proxime affinis *H. scrobiculatae*, sed sculptura bene distincta.

26a. *Streptaxis sinuosa* Pfr.

T. profunde arcuato-rimata, oblique oblonga, tenuiuscula, laevigata, nitida, vitreo-albida; spira subconoidea,

vertice valde excentrico, minuto; anfr. $5\frac{1}{2}$ convexusculi, ad suturam striatuli, penultimus gibbosus, ultimus antrorum aberrans, loco umbilici profunde excavatus; apertura diagonalis, late lunaris, lamina parva linguaeformi parietali coarcata; perist. flexuosum, callosum, reflexum, margine dextro superne tenui, sinuoso. — Diam. maj. $8\frac{1}{2}$, min. $6\frac{1}{3}$, alt. 5 mill.

Hab. Cochinchina.

34 a. *Streptaxis eburnea* Pfr.

T. oblique perforata, subglobosa, superne minute striata, eburneo-albida; spira convexo-conica; anfr. $6\frac{1}{2}$ parum convexi, $1\frac{1}{2}$ ultimi antrorum deviantes, ultimus inflatus, laevigatus; apertura perobliqua, subtriangulari-lunaris, dente linguaeformi parietali coarcata; perist. callosum, album, expansum et reflexum, margine supero intus dente 1 acuto munito. — Diam. maj. 11, min. 9, alt. 7 mill.

Hab. Cochinchina.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Beschreibung neuer Heliceen 231-240](#)