p. 419. t. 40. f. 4, und Helix (Rhagada) Bordaensis n. sp. p. 419. t. 40. f. 3.

Edg. A. Smith. Descriptions of twelv new Species of shells p. 478—485 mit t. 48.

Sind folgende Arten neu beschrieben: Conus consanguineus n. sp. p. 478. t. 48. f. 1, unbekannten Fundortes; Conus neptunoides n. sp. p. 479. t. 48. f. 2 von Australien; Conus Taylorianus n. sp. p. 480. t. 48. f. 3 von Australien (?); Conus albospira n. sp. p. 480. t. 48. f. 4 unbekannten Fundortes; Terebra Mariesi n. sp. p. 480. t. 48. f. 5 von Japan; Trophon Stuarti n. sp. p. 481. t. 48. f. 6 von der Vancouver-Insel; Latirus Nagasakiensis n. sp. p. 482. t. 48. f. 7 von Japan; Cypraea decipiens n. sp. p. 482. t. 48. f. 8, 8 a von Nordaustralien; Turbo (Pomaulax?) Taylorianus n. sp. p. 483. t. 48. f. 9 unbekannten Fundortes; Liotia crassibasis n. sp. p. 484. t. 48. f. 10 unbekannten Fundortes. Paludina Spekei n. sp. p. 484. t. 48. f. 11 von Ostafrika; Helix (Ampelita) Percyona n. sp. p. 485. t. 48. f. 12—12a von Madagascar.

Journal de Conchyliologie. XX. 1880. Heft I.

A. Morelet. La Faune malacologique du Maroc. en 1880. p. 5—83. — Wird später eingehender besprochen werden.

P. Fischer. Sur les conditions d'existence de l'Ostrea angulata Lam. p. 83—86. — Die portugiesische Auster ist 1866 in den Austernbänken von Südwest-Frankreich eingeführt worden und hat sich dort acclimatisirt. Diese Auster Ostrea angulata hält sich aber nur in seichterem Wasser in der Uferzone, während Ostrea edulis L. bis in die Zone der Nulliporen 28—72 m. Tiefe und Ostr. cochlear Poli gar bis zur Zone der Brachiopoden und Corallen 45—184 m. Tiefe hinabsteigt.

D. Oehlert. Les Brachiopodes Siluriens de la Bohème, d'apres les travaux de M. Barrande. p. 86—95.

Enthält eine Besprechung der von letzterem Autor im genannten Betreff publicirten Werke.

R. Tournouer, Conchyliorum Fluviatilium fossilium, in stratis tertiariis superioribus Rumaniae collectorum novae species. p. 96—100.

Der Autor beschreibt 7 neue Arten und eine neue Varietät einer schon bekannten Species, die von Herrn Porumbaru von Bukarest gesammelt sind; sie stammen sämmtlich aus Tertiärsanden der Umgebung von Crajova, District Doljiu, in Westrumänien. — Die Arten sind: Paludina Crajovensis n. sp. p. 96; Emmericia Rumana n. sp. p. 97; Melanopsis Rumana n. sp. p. 97; Unio Crajovensis n. sp. p. 97; Unio Stachei Neum. var. nov. crassiplicata p. 98; Unio Iconomianus n. sp. p. 98; Unio Porumbari n. sp. p. 99 und Unio Jiulensis n. sp. p. 99.

Bibliographie. p. 100—105. Dr. W. Kobelt, Iconographie der Land- und Süsswassermollusken etc. Bd. VII, Lfg. 1—3. — J. G. Hidalgo. Moluscos del Viaje al Pacifico, verificado de 1862—65 por una Comision de Naturalistas enviada por el Gobierno Español. Parte tercera. — George W. Tryon. Manual of conchology structural and systematic, with illustrations of the species. part. IV. — E. Danglure et A. Bioche. Table generale et analytique des vol. XXI—XXIX de la deuxieme serie (1864—1872) du Bulletin de la soc. géologique de France. — Dr. W. Kobelt. Synopsis novorum generum, specierum et varietatum Molluscorum viventium testaceorum anno 1878 promulgatorum.

Necrologie. Prof. Paul Gervais; Dr. J. C. Chenu.

Nouvelles.

Heft II. D. Oehlert. La position systematique des Brachiopodes d'après les travaux de M. Morse. p. 109—135. Eine ziemlich umfangreiche Arbeit über die Stellung der Brachiopoden im System, welche sich über alle Organe der Thiere ausspricht.

H. Crosse. Sur l'identité des genres Hainesia, Dacrystoma und Mascaria. p. 135—140. Nach kritischer Betrachtung der genannten 3 Genera kommt der Autor zum Schlusse, dass dieselben unter dem ältesten Namen „Hainesia Pfr. 1856" zu vereinigen seien. Das Genus Hainesia, nachdem Gen. Mascaria Angas 1878 völlig synonym mit derselben ist, theilt sich in 2 Sectionen: 1. Hainesia s. str. mit 2 Arten; 2. Dacrystoma Crs. et Fisch. 1871 mit 2 Arten. — H. Crosse. Description du nouveau genre Pyrgophysa. p. 140—142. Der Autor giebt Beschreibung und Abbildung der schon 1879 publicirten Pyrgophysa Mariei. p. 141. t. 4. f. 5. — H. Crosse, Descriptions de Mollusques inédits, provenant de la Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle Bretagne. p. 142—149. Werden beschrieben und abgebildet: Planorbis Rossiteri Crosse (1871) p. 142. t. 4. f. 4; Schismope Morleti Crosse p. 144. t. 4. f. 3; Sinusigera Caledonica Crosse p. 146. t. 4. f. 2; Voluta Rückeri Crs. var. ceraunia p. 148. t. 4. f. 1. — H. Crosse, Diagnoses Molluscorum novorum, in insula Nossibé dicta et in provincia Paraensi collectorum. p. 149—150. Neu beschrieben: Geostilbia Mariei Crs. p. 149; Geostilbia Plandiana Crs. p. 149; Ancylus modestus Crs. p. 150.

L. Morlet, Supplement à la Monographie du genre Ringicula Desh. p. 150—181. Der Nachtrag zu der in früheren Jahren erschienenen Monographie des Gen. Ringicula aus der Feder desselben

Autors enthält folgende neubeschriebene Arten: 1. recente: Ringicula Mariei n. sp. p. 152 von Nossibé; Ring. Salleana n. sp. p. 153 vom Cap Breton; Ring. Caledonica n. sp. p. 154. t. 5. f. 1 und Ring. Noumeensis n. sp. p. 155. t. 5. f. 3, beide von Neucaledonien; Ring. Oehlertiae n. sp. p. 156. t. 5. f. 4 von China und Japan; R. Passieri n. sp. p. 157. t. 5. f. 5 vom Cap Breton; R. pulchella Jeffr. p. 158. t. 5. f. 6 von Irland; R. Terquemi n. sp. p. 159. t. 5. f. 7 von Smyrna. 2. fossile: R. Cossmanni n. sp. p. 164. t. 5. f. 8 unteres und mittleres Eocaen von Abbecourt (Oise); R. Dugasti n. sp. p. 165. t. 5. f. 6 mittleres Eocaen von Beauchamp. (Seine-et-Oise); R. Raincourti n. sp. p. 166. t. 6 f. 3 mittleres Eocaen (Dept. Seine-et-Oise); R. Bardini n. sp. p. 167. t. 6. f. 1 mittleres Miocaen (Dept. Maine-et-Loire); R. Hermitei n. sp. p. 168. t. 6. f. 4 mittleres Miocän, ebendort: R. Munieri n. sp. p. 169. t. 6. f. 5 mittleres Miocän von Thorigné (Maine-et-Loire); R. Almerae n. sp. p. 170. t. 6. f. 6 oberes Miocän, Prov. Barcelona; R. Mayeri n. sp. p. 172. t. 6. f. 7 oberes Miocän (Dept. Landes); R. Douvillei n. sp. p. 173. t. 6. f. 2 unteres Pliocän bei Cannes; R. Baudoni n. sp. p. 174. t. 6. f. 8 unteres Pliocän von Asti; R. Depontaillieri n. sp. p. 175. t. 6. f. 9 unteres Pliocän von Cannes. — Der Schluss giebt Notizen über die Vertheilung der 55 fossilen europäischen Ringicula-Arten nach den Horizonten, in welchen sie gefunden worden und nach Gruppen. — Ein alphabetisch geordnetes Namensverzeichniss der (23) recenten und 55 fossilen Arten bildet das Ende der Arbeit. — G. Vasseur, Diagnoses molluscorum fossilium novorum. p. 182—183. Neu beschrieben: Gen. nov. Velainella p. 182 mit Velain. columnaris n. sp. p. 182; Gen. nov. Goniocardium p. 182 mit Gonioc. Heberti n. sp. p. 183, beide Arten p. Saffré (Loire-Inferieure). — E. Munier-Chalmas, Diagnosis

Generis novi molluscorum Cephalopodorum fossilis. p. 183—184. Neu aufgestellt. Gen. nov. Vasseuria p. 183 auf Vaisseuria occidentalis Mun. Chalm. von Saffré (Eocän).

Bibliographie p. 184—205. Species général et Iconographie des Coquilles vivantes, comprenant la collection du Muséum d'hist. nat. de Paris; par S. Kiéner, continué par le docteur P. Fischer. — Livr. 150—156. — G. W. Tryon. Manual of Conchology sructural and systematic; with illustrations of the species. Part. V. VI. — Systemat. Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz. Sect. 86. 87. 88. — F. Fontannes. Études stratigraphiques et palaeontologiques pour servis à l'étude de la periode tertiaire dans le Bassin du Rhone. — A. Granger, Catalogue des Mollusques testacés observé sur le littoral de Cette. — Herm. Strebel und Dr. G. Pfeffer, Beitrag zur Kenntniss der Fauna Mexicanischer Land- und Süsswasser-Conchylien. Th. IV. — Marq. de Monterosato, Notizie intorno ad alcune Conchiglie delle coste d'Africa. — Marq. de Monterosato, Conchiglie della Zona degli Abissi. — E. A. Smith, Zoology of Kerguelen Island; Mollusca. — Dr. Th. Studer, Die Fauna von Kerguelensland; Verzeichniss der bis jetzt auf Kerguelensland beobachteten Thierspecies nebst kurzen Notizen über ihr Vorkommen und ihre zoographischen Beziehungen. — Nouvelles 205—206.

Heft III. — Alb. Vayssiere; Note sur les coquilles des differentes especes de Pleurobranches du golf de Marseille. p. 205—216. Es werden die Schalen der im genannten Golf vorkommenden Arten beschrieben und abgebildet als: Pleurbranchus aurantiacus Risso p. 206. t. 7. f. 1, 1a. Pl. plumula Mtg. p. 208. t. 7. f. 2, 2a; Pl. testudinarius Contr. p. 209. t. 7. f. 3, 3a; Pl. membranaceus Mtg. p. 211.

t. 7. f. 4, 4a und Pl. Monterosati Vayss. p. 212. t. 5. 5a—6; von letzterer Art ist auch das Thier beschrieben. — D. Oehlert, Position systematique des Brachiopodes d'après M. Dall. p. 216—234. — Der Autor bespricht, anreihend an seine oben angeführten Betrachtungen, die systematische Behandlung der Brachiopoden nach M. Dall. — P. Fischer. Montruosité sénestre d'une Telline. p. 234—235. Eine links gewundene Tellina plicata Val. von Neu-Caledonien wird beschrieben. — Marq. S. de Folin, Un nouveau Mollusque trouvé dans les alluvions du Rhône. — Der Autor stellt auf eine kleine in den Anschwemmungen der Rhone gefundene Schnecke ein neues Gen. Locardia, p. 236 mit Loc. apocrypha n. sp. p. 237. t. 10. f. 5 auf. Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich in derselben eine Species der 1876 von mir aufgestellten Gen. Vitrella (Deutsche Excurs. Moll. Fauna p. 334) erblicke. — P. Fischer. Sur la classification des Mollusques. p. 238—240. Der Autor theilt die Mollusken in 5 Classen ein, die sich wie folgt gruppiren: Meroblastea, 1. Cl. Cephalopoda; Holoblastea, und zwar I. Cl. Glossophora: 2. Cl. Pteropoda, 3. Cl. Gastropoda 4. Cl. Scaphopoda, II. Aglossa, 5. Cl. Pelecypoda. — Professeur E. Bayle. Liste rectificative de quelques noms de genres. p. 240—251. — Der Autor wählt neue Namen für Genera, die von verschiedenen Autoren in verschiedener Weise augewendet werden. Diese Genera sind: 1) Magellania Bayle p. 240 für Waldheimia King von Brullé, Typus Terebratula flavescens Lam.; 2) Mühlfeldtia Bayle p. 240 für Megerlia King von Rob. Desovidy, Typ. Anomia truncata L.; 3) Sycum Bayle p. 240 für Liostoma Swains, Typ. Fusus belliformis Lam.; das Gen. ist durch Lacepéde bei den Fischen eingeführt worden; 4) Macrochilina Bayle p. 241 für

Macrocheilus Phillips non Hope = Duncania Bayle non de Koninck. 5) Norrisia Bayle p. 241 für Trochiscus Sow. non Heyden, non Held, T. Norrisia Norrisi Sow. 6) Scobina Bayle p. 242 für Pholas H. et A. Adams non Lang et non Klein, T. Scob. costata L. Dann folgen Namen für 30 Species des Gen. Cerithium, die ebenfalls doppelt vorkommen.

J. Depontaillier. Note sur l'Aplysia? grandis Phil. et Aplysia deperdita Phil. p. 251—255. Beide Arten gehören nicht in das Genus Aplysia. — R. Tournouer. Description d'un Ostrea fossile de la molasse miocène de Forcalquier (Basses-Alpes). p. 256—257. — Beschrieben und abgebildet: Ostrea Sellei Fisch. et Tourn. p. 256. t. 8. f. 5—7.

Bibliographie. p. 257—284. M. Paulucci, Excursione scientifica nella Calabria 1877—78. Fauna Malacologica specie terrestri e fluviatili enumerate e descritte. — P. Fagot, Histoire malacologique des Pyrenées françaises. 1. Pyrenées orientales. — F. Fontannes, Diagnoses de quelques espèces nouvelles de Calcaires du château de Crussol (Ardèche). — D. Juan Martorelli y Penna. Apuntes arquelogicos de D. Francisco Martorell y Penna ardenados por Salvador Saupere y Miquel. — A. F. Marion. Deux jours de draguages dans le golfe d'Alger. — J. B. Gassies. Faune Conchyliologique terrestre et fluvio-lacustre de la Nouvelle Caledonie. — Louis Brevière. Catalogue des Mollusques testacés, terrestres et fluviatiles, observés dans le département de la Nièvre. — George W. Tryon. Manual of conchology structural and systematic, with Illustrations of the species. — Edgar A. Smith. Description of new species of South-American Helicidae in the British Museum; On the shells of Lake Nyassa and on a few marine species from Mozambique; On a

collection of marine shells from the Andaman Islands; On a collection of Mollusca from Japan. — George French Angas. Description of six species of bivalve shells in the Coll. of Sylv. Hanley and of a Helix of the Solomon Islands; — Descr. of ten spec. of marine shells from the prov. of South-Australia; — A. List. of additional Species of mar. Mollusca to be includet in the Fauna of the Province of South-Australia; — Descr. of ten new spec. of Axinaea and Pectunculus in the Coll. of Mr. Sylv. Hanley and T. L. Taylor; — On the Terrestrial Mollusca collected in Costa-Rica by the late Dr. H. A. M. Gabb. — J. G. Hydalgo. Moluscos marinos de España, Portugal y los Baleares. — Art. Bofill. Catalogo de los Moluscos testaceos terrestres del Llano de Barcelona. — Dr. W. Kobelt u. H. C. Weinkauf. System. Conchylien-Cab. neue Ausgabe. Sect. 89. Cypraea 2; Sect. 90. Pyrula et Fusus 3; Sect. 91. Melania 3 et. Paludomus 2. — Letter 1—3 to C. P. Patterson Supt. coast Survey from Alex. Agassiz, on the dredging operations of the U. S. coast. Survey Steamer Blake. — H. C. Weinkauf. Beiträge zur Classification der Pleurotomen; — Catalog der Arten des Gen. Pleurotoma, s. st; Catalog der Gattung Oliva; — Catalog der Gattung Marginella Lam. — W. Kobelt. Zusätze und Berichtigungen zu meinem Catalog der im europäischen Faunengebieten lebende Binnenchonchylien. — Nouvelles p. 284—286.

Heft IV. — P. Fischer. Faune malacologique de la vallée du Mont Dore p. 289—299. Der Verfasser zählt 26 Arten aus dem Thale des Mt. Dore (Poy de Dôme) auf, darunter nur 4 Species Wassermollusken. — P. Fischer. Cas d'albinisme chez le Limax maximus. p. 299—300. Beschreibung eines albinen L. maximus von Savigny-sur-Orge (Seine-et-Oise). — John Brazier. Localités des îles

Australiennes, des îles Salomon et d'autres îles de la mer du Sud. p. 300—320. Der Autor giebt von 18 Species auf den genannten Localitäten vorkommenden Arten Landschnecken die genauen richtigen Fundorte an, da die Angaben über selbe nach Cuming's Sammlungen etc. unrichtig sind. — H. Crosse, Description d'une nouvelle èspèce de Neritina d'Espagne. p. 320—322. — Neritina Hidalgoi n. sp. p. 320. t. 11. f. 2 mit Varietät von Jativa Prov. Valencia. — S. G. Hidalgo, Description d'une nouvelle espèce de Chilina. p. 322—323. — Chilina Portillensis n. sp. p. 322. t. 11. f. 1 von Portillo in den Cordilleren in 4000 m. Höhe. — H. Crosse, Note sur quelques monstruosités accidentelles du Bulimus fibratus Martyn de la Nouvelle-Calédonie. p. 323—325. Der scalare Bulimus ist abgebildet (t. 11. f. 3 a, b) und beschrieben. — J. B. Gassies, Description d'espèces inédites ou non encore figurées, provenant de la Nouvelle-Calédonie. p. 325—329. Abgebildet und beschrieben: Helix oriunda Gass. p. 325. t. 10. f. 2; Hel. Yahouensis Gass. p. 326. t. 10. f. 1; Bulimus senilis Gass. var. sinistrorsa p. 327. t. 10. f. 3; Melampus caledonicus Gass. p. 328. t. 10. f. 4. — H. Crosse, Note sur le Parmacella Valenciennesi, suivie d'un Catalogue des espèces du genre actuellement connues. p. 329—345. — Crosse giebt eine Beschreibung des Thieres mit Abbildung t. 9. f. 1. 1a. und b., (ohne auf die Anatomie desselben einzugehen). Dieser folgen Bemerkungen über die geographische Vertheilung der Arten. Die Liste der bis jetzt bekannten Arten zählt 11 recente und 2 fossile auf, von denen 2 in Indien, 3 auf den Canaren, 3 in Afrika, 3 in Europa leben. Die fossilen Arten kommen im Pliocaen Südfrankreichs vor. — P. Fischer, Note sur le genre Carolia p. 345—354. Der Autor be-

schreibt die fossile Carolia placunoides Cantr. p. 346. t. 12. f. 1—5., und zählt zum Schlusse die 2 bekannten Arten des Genus auf.

E. Bayle, Note additionelle, (zu Aufsatz desselben Autors p. 240.) p. 754. Fügt zur Liste der mit Namensänderung bedachten Cerithien eine weitere zu. — L. Morlet, Diagnoses Molluscorum novorum. p. 355. — Neue Arten: Planorbis Bollandi n. sp. p. 355. Amnicola Pesmei n. sp. p. 355., beide subfossil in Algier. — H. Douvillé, Sur la forme de l'ouverture de l'Ammonites pseudo-anceps. p. 355—362. Der Autor kommt nach eingehenden Erörterungen zu dem Schlusse, dass die Ammoniten Dibranchiate Cephalopoden waren, und dass die Thiere in der Kopfpartie grosse Analogie mit den Argonanten hatten.

Bibliographie, p. 362—374. — G. W. Tryon, Manual of Conchology. partie VIII. — E. A. Smith, On the shells of. Tanganyika and of the Neighbourhood of Ujiji, Central-Africa. — F. W. Hutton, Manual of the New Sealand Mollusca. A. systematic and descriptive Catalogue of the marine and Land Shells and of the Soft Mollusks and Polyzoa of New Sealand and the adjacent Islands. — W. G. Burney, On the jaw and lingual dentation of certain terrestrial Mollusks. — Marg. L. de Folin, On the Mollusca of H. M. S. Challenger Expedition; the Caecidae, comprising the genera Parastrophia, Watsonia and Caecum. — W. Kobelt. Iconographie der Land- und Süsswasser-Mollusken Bd. VII. Lfg. 4—6. — W. Kobelt, Catalog der Gattung Murex Lam. — New Zealand Count. Internationale Exhibition Sydney 1879. Appendix tc. Official Catalogue. — A. E. Craven, Observation sur l' Helix ligulata Fér. de Madras. — A. E. Craven, Quelques observations sur l'Hyalaea tridentata Lam.

Nouvelles p. 375—376.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Malakozoologische Blätter

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: NF_5_1882

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Journal de Conchyliologie. XX. 1880. 14-23