

Bulletino della società malacologica italiana, VI. 1880. N. Tiberi, Cefalopodi, Pteropodi, Eteropodi viventi nel mediterraneo e fossili nel terreno terziario italiano con aggiunte e correzione, p. 5—49. — Es wurden die sämmtlichen Arten der genannten Familien aufgezählt, die im Mittelmeer leben oder in italienischen Tertiärablagerungen beobachtet wurden. — March. di Monte rosato. Conchiglie della zona degli abissi, p. 50—82. Der Autor giebt eine Liste von 121 Arten, welche sich in einer Tiefe von ca. 300 m. zwischen Palermo und Ustica finden. — Casto de Stefani. Una Lartetia Italiana, p. 83—84. — Neu beschrieben: Lartetia cornucopia, p. 84 (latein. Diagnose) vom Fluss Arbia bei Siena; es ist die erste in Italien beobachtete Art des bisher nur aus Frankreich bekannten Genus. — Gius. Brugnone, Le conchiglie pliocenice delle vicinanze di Caltanissetta, p. 85—159. Der Verfasser zählt eine grosse Anzahl von Arten mariner, fossiler Conchylien auf, die er in den Pliocaen-Ablagerungen der Umgegend von Caltanissetta, im centralen Theile von Sicilien gesammelt hat. Neu beschriebene Arten sind: *Nassa planistria* n. sp. p. 106. t. 1. f. 3.; *Nassa angulata* Broc. var. *scabrella* n. p. 107; *Nassa minutissima* n. sp. p. 107. t. 1. f. 4.; *Drillia sejuncta* Bell. var. *n. opima* p. 111. t. 1. f. 5.; *Lachesis retifera* n. sp. p. 111. t. 1. f. 6.; *Mangelia rugulosa* Phil. var. *n. sublaevis* p. 113. t. 1. f. 7.; *Mangelia angusta* Jan var. *n. pumila* p. 113.; *Mangelia agilis* n. sp. p. 114. t. 1. f. 8. *Raphitoma nodulosa* n. sp. p. 114. t. 1. f. 9.; *Raphitoma tenuicosta* Brugn. var. *n. tumidula* p. 115.; *Raphitoma harpuloides* Brug. var. *n. rotundigryra* p. 115.; — *Marginella miliaria* L. var. *n. inflata* p. 116.; *Natica Josephinia* Risso var. *n. elata* p. 118.; *Odostomia raristriata* n. sp. p. 118. t. 1. f. 12.; *Turritella breviata* n. sp. p. 122. *Scalaria*

subtreveliana n. sp. p. 124. t. 1. f. 13.; Scalaria frondiculaeformis n. sp. p. 124. t. 1. f. 14; Scalaria alata n. sp. p. 124. t. 1. f. 15; Scalaria carinulata n. sp. p. 125. t. 1. f. 16. Rissoa cimex L. var. n. clathrato — granosa p. 127. — Rissoa asperula n. sp. p. 127. t. 1. f. 17.; Crepidula scabrestriata n. sp. p. 130. t. 1. f. 18.; Ostrea Sabbucinae n. sp. p. 135. t. 1. f. 19.; Modiola modiolus L. var. n. retusa p. 138; Lepton elongatum n. sp. p. 146. t. 1. f. 20; Cardita subtrigona n. sp. p. 148. t. 1. f. 21; Venus libellus Rayn. var. n. parvula p. 149. t. 1. f. 22. — M. Paulucci, Fauna italiana Comunicazioni malacol. art. V. Revista delle specie appartenenti ai generi *Sphaerium* Scop., *Calyculina* Cless., *Pisidium* Pfr. e Loro, distribuzione geographica p. 159—181. — N. Tiberi, J. molluschi nudibranchi del Mediterraneo p. 182—242. Der Verfasser zählt die im Mittelmeere beobachteten Nudibranchiata auf, und fügt den einzelnen Arten die vollständige Synonymie, sowie die ihm bekannt gewordenen Fundorte bei. Zahlreich eingestreute Bemerkungen enthalten nur Erläuterungen über die Synonymie. Neu aufgestellt wird das Genus *Costaea* Tib. p. 231 (mit *Aeolis affinis* Delle Chiaje und *Aeolis digitata* Costa). — March. di Monterosato; Nota sopra alcune conchiglie coralligene del Mediterraneo, p. 243—259. Der Autor zählt 19 Species mariner Conchylien auf, die sich in der „zona coralligena“ finden. — P. Strobel, Lettera al Secretario della soc. malac. italiana; Aggiunte et Rettifiche, p. 260—264. Strobel theilt mehrere neue Fundorte einer Anzahl Arten mit, die zu der Arbeit G. B. Adami, Moll. terr. c. fluv. viv. nella valle dell’ Oglio, Padova 1876 einzufügen sind. — Dann folgt eine Berichtigung bezüglich *Camp. crinita* in Brusina Monogr. delle Campylaea della Dalmazia e Croatia und bezüglich der Rivista della

specie appart. ai generi *Sphaerium* etc. della March. Paulucci. — Dr. Dante Pantanelli. Conchiglie plioceniche di Pietrafitta in prov. di Siena, p. 265—276. Nach einer durch die graphische Skizze veranschaulichten Darstellung der Fundstelle zählt der Autor die bei Pietrafitta gesammelten pliocänen marinen Conchylien auf, unter denen folgende Arten neu beschrieben werden. *Pisania minutissima* n. sp. p. 271. *Columbella perlonga* n. sp. p. 272; *Homotoma Libbianensis* n. sp. p. 273; *Pyrgulina Victoriae* n. sp. p. 275; *Alvania Libbianensis* n. sp. p. 275.

---

The Quarterly Journal of Conchology.  
London. Vol. I. Nro. 9.\*)

W. G. Blatch. Notes on the Occurrence of rare and local shells in unrecorded Localities; p. 129—131. — Enthält Mittheilungen über *Zonites excavatus* var. *citrina* Fér.; *Helix aspersa* var. *exalbida* Mke.; *Helix cantiana* Mont., *Helix fusca* Mont., *Claus. Rolphi* Gr. und *Claus. rugosa* var. *albida* Jeffr. = J. T. Marshall. Species versus varieties. p. 131—133. Enthält Betrachtungen über das Verhältniss von Art und Varietät.

C. P. Gloyne. Note on the identity of various european Helicidae p. 133. — Erklärt *Azeca Nouletiana* Dup. und *Mabilleana* Fagot für Var. von *Az. tridens*; *Claus. nigricans* für identisch mit *rugosa* Drp.; *Caecil. acicula* für identisch mit *Cael. Liesvillei* Bgt. und *anglica* Bgt.; *Helix nubigena* Charp als Var. von *H. carascalensis* F.; *Bulim. niso* Pfr. als Var. von *Bul. quadridens* Müll. — G. F. R. Angas, Remarks on the south australian Helices, with a notice of all the species known up to the present

---

\*) Die vorhergehenden Nrn. des I. Bds. sind uns leider nicht zugekommen. Wir werden selbe später gelegentlich besprechen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [NF\\_5\\_1882](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Bulletino della societa malacologica italiana, VI. 1880. 24-26](#)