

Länder. Die Species sind nicht nach den verschiedenen Ländern getrennt, sondern folgen sich in fortlaufender Liste.

Neu beschrieben werden: *Vitrina Reiteri*, p. 102; *Buliminus Reiteri* Mts., p. 106; *Pupa truncatella* var. *biarmata*, p. 109.

Es sind im Ganzen 67 Arten, von denen 14 aus Südcroatien, 51 aus Süddalmatien, 10 aus dem westlichen Montenegro stammen.

Joseph Bakowsky, *Glina Dyluwialna we lwowie i ney b lizszej okolicy*. Lemberg 1881.

Die in polnischer Sprache verfasste Studie über die Vorkommnisse an Fossilien in galizischen Lössablagerungen zählt die Conchylien, sowie die Reste kleiner Säugethiere auf, welche sich in denselben vorfinden. Es sind dieselben Arten, die den Löss Deutschlands charakterisiren, nur findet sich überall *Helix hispida* mit ihrer var. *septentrionalis* Cless., während *Hel. sericea* vollständig fehlt. —

C. F. Ancy; *Sur la Faune conchyliologique terrestre du pays des Somalis*. Estratto dal *Naturalista Siciliano*. Anno I, Nro 9.

Der Verfasser zählt 4 *Buliminus*-arten auf, welche sich im Lande der Somalis nach den Sammlungen des Herrn M. G. Revoil finden. Neu beschrieben werden: *Buliminus (Petraeus) Revoili* Brgt. p. 2; und *Bul. (Rachis) Moreletianus* p. 2., beide aus den Gebirgen der Gonzalis-Ouarsanguelis-Thäler von Darror und Karkar stammend.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [NF_6_1883](#)

Autor(en)/Author(s): Bakowsky Joseph

Artikel/Article: [Glina Dyluwialna we lwowie i ney b lizszej okolicy. 159](#)