

p. 220 t. 1, f. 5 a, b; *Cypraea subexcisa* Braun und *Cypraea Meyeri* n. forma p. 222, t. 1, f. 6 a—b und 7 a—b.

M. Alfred de Saint-Simon, *Etude des Helix du groupe de l'Hel. elegans*. Toulouse 1882.

Der Verfasser kritisiert die Arten der Gruppe der *Helix elegans*, beschreibt von den meisten die Anatomie der Thiere und namentlich deren Zungenbewaffnung, und vergleicht die nahestehenden Arten. Derselbe will *Helix terrestris* Bourq für von *Hel. elegans* Drp. verschiedene Art annehmen und beschränkt die erstere auf Algerien und Tunis, die letztere auf Südfrankreich etc. Die fleissige Studie bietet viel Interessantes und Bemerkenswerthes.

Dr. Simroth, die deutschen Nacktschnecken, besonderer Abdruck aus den Berichten der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig 1883.

Die so sehr in Färbung wechselnden Nacktschnecken liegen noch immer ziemlich im Argen, da ihre Bestimmung nach äusseren Merkmalen stets unsicher bleibt. Der Verfasser hat sich nun die Mühe genommen, die anatomischen Verhältnisse derselben zu untersuchen. Die kurzen Mittheilungen hierüber bieten sehr viel des Interessanten und geben Anhaltspunkte zur sicheren Bestimmung der Arten. — Vorzugsweise ist es der Darm, welcher für die Genera und Arten bestimmte Unterscheidungsmerkmale liefert. Dagegen wird den Radulazähnen wegen ihrer Gleichförmigkeit die Möglichkeit einer auf sie gegründeten Eintheilung abgesprochen. Wir können die interessante Studie unseren Lesern auf's Beste empfehlen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [NF 7 1885](#)

Autor(en)/Author(s): Saint-Simon M.A. de

Artikel/Article: [Etüde des Helix du groupe de l Hel. elegans. Toulouse 1882. 163](#)