

MÜRTER, R. (1988): Vergleichende Untersuchungen zur Faunistik und Ökologie der Lepidopteren in unterschiedlich strukturierten Waldflächen im Kottenforst bei Bonn — Neue Entom.Nachr., 21: 64-65, Marktleuthen

SCHULZE, W. (1984): Die neue *Mesapamea secalella* REMM, 1983 auch in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen (Lep.: Noctuidae) (vorläufige Mitteilung) — Mitt.Arbeitsgem.ostwestf.-lipp.Ent., 2 (30): 86, Bielefeld

(Fortsetzung folgt)

Über die Verbreitung von *Opigena polygona* DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775 im Rheinland (Lep., Noctuidae)

von Willibald Schmitz, Mutzer Heide 29, 5060 Bergisch Gladbach

Diese, in der Rheinprovinz in starker Ausbreitung befindliche Art, konnte 1989 wieder an einigen weiteren Stellen (z.T. in Anzahl) nachgewiesen werden.

In Kaisersesch, Kreis Mayen/Eifel wurden am 11.7. u. 3.8. insgesamt elf Falter an Licht und Köder beobachtet (NIPPEL u. W.SCHMITZ). Am 29.7. fand ich einen Falter am Taubenberg bei Sötenich am Köder. Dies ist der Erstrnachweis für die Nordeifel. Weitere fünf Falter kamen am 28.7. (GOERGENS), 4.8., 18.8. und 30.8. in Karden/Mosel an Licht und Köder (GOERGENS u. W.SCHMITZ).

Die gegenwärtige Verbreitung von *Opigena polygona* DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775 im Rheinland stellt sich wie folgt dar:

Ältere Meldungen lagen bereits vom Nahe- und Mittelrheingebiet vor (STAMM 1981). SWOBODA & KINKLER (1989) ergänzten diese bis zum Jahre 1981 und erstellten eine Verbreitungskarte (S. 265). Über einen Fund in Rosbach/Sieg berichteten KINKLER, SCHMITZ, NIPPEL & SWOBODA (1979). Spätere Funde sind:

Dörscheid	31.7.82	KINKLER
Karden	18.9.82	"
Lahnstein (NSG Koppelstein)	21.9.85	W.SCHMITZ
Altenahr	23.8.87	FÖRSTER, SCHAUB u. B.SCHMITZ (KINKLER 1989 a)

Altenahr	1.9.87	FÖRSTER, SCHAUB u. B.SCHMITZ (KINKLER 1989 a)
Kamp-Bornhofen	6.9.88	GOERGENS (KINKLER 1989 a)
Kaisersesch	3.10.88	NIPPEL (KINKLER 1989 b)

Eine Zusammenfassung der *O. polygona*-Funde in Westfalen bringen ROBENZ, SCHAEFER & WEIGT (1982).

Diese Zusammenstellung soll als Anregung dienen, in Zukunft besonders auf die Art zu achten und so die Kenntnisse über die Verbreitung zu vervollständigen.

Literatur:

KINKLER, H., SCHMITZ, W., NIPPEL, F. & SWOBODA, G. (1979): Die Schmetterlinge des Bergischen Landes IV. Teil: Die Eulenschmetterlinge (II) -- Jber.naturwiss.Ver. Wuppertal, 32: 98, Wuppertal

KINKLER, H. (1989 a): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 1. Zusammenstellung -- Melanargia, 1: 11, Leverkusen

KINKLER, H. (1989 b): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 2. Zusammenstellung -- Melanargia, 1: 24, Leverkusen

ROBENZ, W., SCHAEFER, J. & WEIGT, H.-J. (1982): Lepidoptera Westfalica, Noctuoidea 64. Familie: Noctuidae, Subfamilie: Noctuinae -- Abh.Westf.Mus.Naturk., 44 (4): 34, Münster

STAMM, K. (1981): Prodrromus der Lepidopteren-Fauna der Rheinlande und Westfalens - Selbstverlag Solingen

SWOBODA, G. & KINKLER, H. (1989) (im Druck): Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, NOCTUIDAE LATREILLE 1809 -Unterfamilie Noctuinae- (Fundortlisten und Verbreitungskarten) -- Schr.reihe Arbeitsgem.rhein.-westf.Lepidopterol., 1: 264-265, Düsseldorf

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Schmitz Willibald

Artikel/Article: [Über die Verbreitung von *Opigena polygona* DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775 im Rheinland \(Lep., Noctuidae\) 46-47](#)