

Bemerkenswerte Käfernachweise (Coleoptera) im Nahetal zwischen Monzingen und Langenlonsheim

Joachim Böhme & Wilhelm Höhner

In der Vergangenheit wurden im Nahe-Tal von uns eine Reihe von Exkursionen durchgeführt. Bemerkenswerte Nachweise sollen nachstehend mitgeteilt werden. Bei der Auswahl der Arten diene als Orientierung die "Käferfauna der Rheinprovinz" von KOCH (1968). Einige Arten gelten in den Wärmehügeln des Rheinlandes spätestens seit dem 3. Nachtrag zur "Käferfauna der Rheinprovinz" als häufiger. Da viele diese Arten im übrigen Deutschland seltener sind oder nicht vorkommen, werden sie in einigen Fällen mit aufgelistet. Die Nomenklatur folgt dem "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998).

Cicindela silvicola DEJ., 1822: Bad Münster-Traisen, HÖHNER, 23.IV.94, 1 Ex. in einem Steinbruch.

Leistus spinibarbis (F., 1775): Bad Münster-Traisen, HÖHNER, 2.XI.94, 1 Ex. unter Stein.

Bembidion inustum DUVAL, 1857: Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 1 Ex. Laubholz, anfliegend.

Bembidion octomaculatum (GOEZE, 1777): Langenlonsheim, Naheau, BÖHME, 20.V.89, 2 Ex. an einem Tümpelrand.

Harpalus signaticornis (DUFT., 1812): Schloßböckelheim, HÖHNER, 23.IV.94, 1 Ex. unter Stein.

Harpalus tenebrosus DEJ., 1829: Bad Münster-Traisen, BÖHME, 23.IV.94, 1 Ex. in einem Steinbruch unter Stein (NÜSSLER det.).

Harpalus honestus (DUFT., 1812): Bad Münster-Traisen, BÖHME, 23.IV.94, 1 Ex. in einem Steinbruch unter Stein.

Harpalus serripes (QUENSEL, 1806): Bad Münster a.St., Rotenfels, BÖHME, 28.IV.93, 1 Ex. auf Weg laufend.

Ophonus sabulicola (PANZ., 1796): Bad Münster-Traisen, BÖHME, 23.IV.94, 1 Ex. in einem Steinbruch unter Stein.

- Ophonus ardosiacus* LUTSHNIK, 1922: Schloßböckelheim, BÖHME, 23.IV.94 und 28.V.98, je 1 Ex. unter Stein (PERSOHN det.).
- Poecilus kugelanni* (PANZ., 1797): Bad Münster a.St., Rotenfels, BÖHME, 28.IV.93, 1 Ex. auf Weg laufend.
- Amara sabulosa* (SERV., 1821): Bad Münster-Traisen, HÖHNER, 27.VIII.94, 5 Ex. unter Stein. - Schloßböckelheim, HÖHNER, 15.V.93, 3 Ex. im Ruderangelände.
- Licinus cassideus* (F., 1792): Schloßböckelheim, HÖHNER, 27.VIII.94, 5 Ex. unter Stein.
- Lebia cruxminor* (L., 1758): Schloßböckelheim, HÖHNER, 24.IV.95, 1 Ex. von *Quercus*-Ästen.
- Cymindis axillaris* (F., 1794): Bad Münster-Traisen, BÖHME & HÖHNER, 23.IV.94, je 1 Ex. in einem Steinbruch unter Stein und HÖHNER, 2.XI.94, 1 Ex. unter Stein.
- Lionychus quadrillum* (DUFT., 1812): Monzingen, Nahe, HÖHNER, 29.V.93, 3 Ex. im Uferschotter.
- Microlestes maurus* (STURM, 1827): Schloßböckelheim, BÖHME, 23.IV.94, 1 Ex. unter Stein.
- Ochthebius gibbosus* GERM., 1824: Schloßböckelheim, Nahe, BÖHME, 8.III.97, 1 Ex. im Hochwassergenist (HOFFMANN det.).
- Cercyon sternalis* SHP., 1918: Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 1 Ex. an einem Tümpelrand.
- Atholus corvinus* (GERM., 1817): Schloßböckelheim, HÖHNER, 5.V.95, 1 Ex. aus Traubentrester.
- Choleva cisteloides* (FRÖL., 1799): Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 1 Ex. an Laubholz anfliegend.
- Proteinus crenulatus* PAND., 1867: Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 2 Ex. im Autokescher.
- Anthophagus praeustus* MÜLL., 1821: Monzingen, HÖHNER, 8.VI.95, 1 Ex. am Feldrand gekeschert.
- Ochthephilus omalinus* (ER., 1840): Oberhausen, Nahe, BÖHME, 27.IV.95, 1 Ex. am Ufer (VOGEL det.).
- Stenus subaeneus* ER., 1840: Schloßböckelheim, HÖHNER, 5.IV.95, 1 Ex.
- Achenium depressum* (GRAV., 1802): Schloßböckelheim, BÖHME, 23.IV.94, 1 Ex. unter Stein.
- Leptacinus sulcifrons* (STEPH., 1833): Schloßböckelheim, HÖHNER, 5.V.95, 1 Ex. aus Traubentrester.

- Xantholinus semirufus* (RTT.) STEEL, 1950: Schloßböckelheim, HÖHNER, 27.VIII.94, 1 Ex. unter Stein.
- Emus hirtus* (L., 1758): Schloßböckelheim, HÖHNER, 20.V.95, 2 Ex. aus Traubentrester.
- Staphylinus caesareus* CED., 1798: Bad Münster-Traisen, HÖHNER, 23.IV.94, 1 Ex. in einem Steinbruch.
- Atheta hybrida* (SHP., 1869): Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 1 Ex. im Autokescher (VOGEL det.).
- Drilus concolor* AHR., 1812: Schloßböckelheim, HÖHNER, 30.V.94, 1 Ex. am Feldrand gekeschert.
- Drilus flavescens* OL., 1790: Schloßböckelheim, HÖHNER, 8.VI.95, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Cordylepherus viridis* (F., 1787): Schloßböckelheim, HÖHNER, 29.V.93, 1 Ex. gekeschert.
- Nemosoma elongatum* (L., 1761): Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 1 Ex. aus Borkenkäferfalle.
- Agriotes sordidus* (ILL., 1807): Schloßböckelheim, BÖHME, 23.IV.94, 1 Ex. unter Stein (SCHIMMEL det.).
- Adrastus montanus* (SCOP., 1763): Schloßböckelheim, HÖHNER, 17.VII.93, 1 Ex. am Feldrand gekeschert.
- Zoroachros dufouri* (BUYSS., 1851): Monzingen, Nahe, HÖHNER, 29.V.93, 10 Ex. im Uferschotter.
- Cardiophorus vestigialis* ER., 1840: Bad Münster-Traisen, HÖHNER, 23.IV.94, 1 Ex. von *Quercus*-Ästen.
- Anthaxia semicuprea* KÜST., 1851: Schloßböckelheim, HÖHNER, 15.V.93, 2 Ex. auf *Crataegus* sp. - Sobernheim-Boos, Heimberg, HÖHNER, 29.V.93, 2 Ex. von toten Ästen geklopft.
- Anthaxia mendizabali* COBOS, 1965: Schloßböckelheim, HÖHNER, 8.VI.95, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Cylindromorphus filum* (GYLL., 1817): Schloßböckelheim, HÖHNER, 8.VI.95, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Meligethes flavimanus* STEPH., 1830: Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 1 Ex. im Autokescher - Oberhausen, BÖHME, 27.IV.95, 1 Ex. auf *Prunus spec.* (JELINEK det.).
- Meligethes anthracinus* BRIS., 1863: Niederhausen, BÖHME, 28.IV.93, 1 Ex. auf *Isatis tinctoria*.

- Meligethes distinctus* STURM, 1845: Schloßböckelheim, HÖHNER, 30.V.94, 2 Ex. am Feldrand gekeschert und 8.VI.95, 5 Ex. auf *Polygala amara*.
- Brachypterolus linariae* (STEPH., 1830): Schloßböckelheim, HÖHNER, 20.V.95, 1 Ex. gekeschert.
- Brachypterolus vestitus* KIESW., 1850: Schloßböckelheim, HÖHNER, 29.V.93, 1 Ex. auf *Salvia pratensis*.
- Rhizophagus cribratus* GYLL., 1827: Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 1 Ex. Laubholz, anfliegend.
- Atomaria rhenana* KR., 1853: Schloßböckelheim, Nahe, BÖHME, 8.III.97, 1 Ex. im Hochwassergenist.
- Atomaria gravidula* ER., 1846: Oberhausen, Nahe, BÖHME, 27.IV.95, 2 Ex. am Ufer.
- Phalacrus championi* GUILLB., 1892: Schloßböckelheim, HÖHNER, 24.IV.95, 1 Ex. auf blühendem Feldahorn.
- Olibrus bisignatus* (MENETR., 1849): Schloßböckelheim, BÖHME, 28.V.98, 1 Ex. auf *Pyrus communis*.
- Leptophloeus alternans* (ER., 1846): Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 1 Ex. im Autokescher.
- Hyperaspis campestris* (HBST., 1783): Schloßböckelheim, BÖHME, 28.V.98, 1 Ex. auf *Pyrus communis* und HÖHNER, 17.VII.93, 1 Ex. am Feldrand gekeschert.
- Xylopertha retusa* (OL., 1790): Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 1 Ex. im Autokescher.
- Dryophilus anobioides* CHEVR., 1832: Schloßböckelheim, HÖHNER, 24.IV.95, 1 Ex. von *Quercus*-Ästen.
- Ochina latreillei* (BON., 1809): Schloßböckelheim, BÖHME, 28.V.98, 1 Ex. von abgestorbenem *Pyrus*-Ast.
- Anaspis varians* MULS., 1856: Schloßböckelheim, HÖHNER, 16.V.92, 2 Ex. gekeschert.
- Omonadus bifasciatus* (ROSSI, 1792): Schloßböckelheim, HÖHNER, 5.V.95, 5 Ex. aus Traubentrester.
- Mordellistena pseudopumila* ERM., 1963: Schloßböckelheim, HÖHNER, 8.VI.95, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Lagria atripes* MULS.GUILLB., 1855: Schloßböckelheim, BÖHME, 28.V.98, 1 Ex. auf *Pyrus communis*.
- Omophlus lepturoides* (F., 1787): Schloßböckelheim, HÖHNER, 16.V.92, 1 Ex. gekeschert und 20.V.95, 1 Ex. auf blühendem Weißdorn.

- Alphitophagus bifasciatus* (SAY, 1823): Schloßböckelheim, HÖHNER, 5.V.95, 1 Ex. aus Traubentrester.
- Trox perlatus* (GOEZE, 1777): Schloßböckelheim, HÖHNER, 20.V.95, 1 Ex. aus Traubentrester.
- Onthophagus verticicornis* (LAICH., 1781): Schloßböckelheim, HÖHNER, 5.V.95, 1 Ex. aus Traubentrester.
- Pleurophorus caesus* (CREUTZ., 1796): Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 1 Ex. im Autokescher.
- Oxythyrea funesta* (PODA, 1761): Schloßböckelheim, HÖHNER, 8.VI.95, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Anoplodera sexguttata* (F., 1775): Schloßböckelheim, HÖHNER, 15.V.93, 1 Ex. auf *Crataegus* sp.
- Dorcadion fuliginator* (L., 1758): Bad Münster a.St., Rotenfels, BÖHME, 28.IV.93, 3 Ex. auf Weg laufend (ohne Beleg) und HÖHNER, 30.V.94, 1 Ex. auf Weg laufend (ohne Beleg).
- Calamobius filum* (ROSSI, 1790): Monzingen, HÖHNER, 8.VI.95, 1 Ex. am Feldrand gekeschert - Schloßböckelheim, HÖHNER, 29.V.93, 10 Ex. gekeschert.
- Agapanthia cardui* (L., 1767): Schloßböckelheim, HÖHNER, 16.V.92, 1 Ex. gekeschert und HÖHNER, 17.V.94, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Phytoecia pustulata* (SCHRK., 1776): Monzingen, HÖHNER, 17.V.94, 1 Ex. auf *Rumex obtusifolius* - Schloßböckelheim, HÖHNER, 5.V.95, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Phytoecia coerulescens* (SCOP., 1763): Schloßböckelheim, HÖHNER, 29.V.93, 1 Ex. auf *Salvia pratensis*.
- Labidostomis humeralis* (SCHNEID., 1792): Schloßböckelheim, HÖHNER, 20.VI.94, 1 Ex. auf *Stachys recta*.
- Labidostomis lucida* (GERM., 1823): Schloßböckelheim, HÖHNER, 20.VI.94, 1 Ex. auf *Stachys recta* und 8.VI.95, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Lachnaia sexpunctata* (SCOP., 1763): Schloßböckelheim, HÖHNER, 17.V.94, 1 Ex. von *Quercus*-Ästen.
- Smaragdina affinis* (ILL., 1794): Schloßböckelheim, HÖHNER, 30.V.94, 1 Ex. am Feldrand gekeschert.
- Coptocephala rubicunda* (LAICH., 1781): Schloßböckelheim, HÖHNER, 4.VIII.93, 1 Ex. am Feldrand gekeschert.
- Cryptocephalus chrysopus* GM., 1788: Schloßböckelheim, BÖHME, 28.V.98, 1 Ex. geklopft und HÖHNER, 30.V.94, 1 Ex. am Feldrand gekeschert.

- Chrysolina cerealis* (L., 1767): Schloßböckelheim, HÖHNER, 15.V.93, 1 Ex. gekeschert.
- Calomicrus circumfusus* (MARSH., 1802): Schloßböckelheim, HÖHNER, 20.VI.94, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Aphthona herbigrada* (CURT., 1837): Schloßböckelheim, HÖHNER, 27.VIII.94, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Longitarsus curtus* (ALL., 1860): Schloßböckelheim, HÖHNER, 27.VIII.94, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Longitarsus brisouti* HKTR., 1912: Schloßböckelheim, HÖHNER, 16.V.92, 29.5.93 und 20.V.95, je 1 Ex. gekeschert.
- Longitarsus dorsalis* (F., 1781): Schloßböckelheim, HÖHNER, 16.V.92, 7 Ex. und 15.V.93, 1 Ex. gekeschert.
- Longitarsus quadriguttatus* (PONT., 1765): Schloßböckelheim, HÖHNER, 17.VII.93, 1 Ex. an einem Feldrand gekeschert und 29.V.93, 4 Ex. sowie 20.VI.94, 1 Ex. gekeschert.
- Longitarsus minusculus* (FOUDR., 1860): Schloßböckelheim, HÖHNER, 29.V.93, 1 Ex. gekeschert.
- Altica lythri* AUBÉ, 1843: Odernheim, BÖHME, 27.IV.95, 1 Ex. vom Teichufer (DÖBERL det.).
- Altica longicollis* (ALLARD, 1860): Schloßböckelheim, HÖHNER, 5.V.95, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Dibolia depressiuscula* LETZN., 1846: Schloßböckelheim, HÖHNER, 17.VII.93, 3 Ex. am Feldrand gekeschert.
- Psylliodes thlaspi* FOUDR., 1860: Schloßböckelheim, HÖHNER, 20.VI.94, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Psylliodes instabilis* FOUDR., 1860: Schloßböckelheim, HÖHNER, 15.V.93, 6 Ex. gekeschert, 27.VIII.94 und 5.V.95, je 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Hypocassida subferruginea* (SCHR., 1776): Schloßböckelheim, HÖHNER, 24.IV.95, 1 Ex. von *Quercus*-Ästen.
- Spermophagus sericeus* (GEOFFR., 1785): Schloßböckelheim, HÖHNER, 15.V.93, 1 Ex. gekeschert.
- Bruchidius varius* (OL., 1795): Schloßböckelheim, HÖHNER, 4.VIII.93, 2 Ex. am Feldrand gekeschert.
- Urodon conformis* SUFFR., 1845: Schloßböckelheim, HÖHNER, 20.VI.94, 5 Ex. auf *Reseda luteola*.

- Phaeochrotes cinctus* (PAYK., 1800): Schloßböckelheim, HÖHNER, 29.V.93, 1 Ex. von trockenen Ästen.
- Enedreutes sepicola* (F., 1792): Schloßböckelheim, HÖHNER, 16.V.92, 3 Ex. gekeschert.
- Choragus horni* WOLFR., 1930: Schloßböckelheim, HÖHNER, 29.V.93, 4 Ex. von trockenen Ästen.
- Xyleborus germanus* (BLANDF., 1894): Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 2 Ex. an Laubholz anfliegend.
- Rhychites bacchus* (L., 1758): Oberhausen, BÖHME, 27.IV.95, 1 Ex. auf *Pyrus communis*.
- Squamapion flavimanum* (GYLL., 1833): Schloßböckelheim, HÖHNER, 27.VIII.94, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Exapion formaneki* (WAGN., 1929): Schloßböckelheim, HÖHNER, 4.VIII.93, 1 Ex. am Feldrand gekeschert.
- Aizobius sedi* (GERM., 1818): Schloßböckelheim, HÖHNER, 30.V.94, 2 Ex. auf *Sedum acre*.
- Cyanapion columbinum* (GERM., 1817): Schloßböckelheim, HÖHNER, 29.V.93, 1 Ex. gekeschert.
- Trachyploeus asperatus* BOH., 1843: Monzingen, HÖHNER, 17.V.94, 1 Ex. auf *Sedum album*.
- Lixus iridis* OL., 1807: Monzingen, HÖHNER, 17.V.94, 1 Ex. auf *Rumex obtusifolius* und 29.V.93, 4 Ex. auf Umbellifere.
- Lixus angustatus* (F., 1775): Schloßböckelheim, HÖHNER, 20.V.95, 1 Ex. auf *Carduus sp.*
- Lixus bardanae* (F., 1787): Monzingen, HÖHNER, 17.V.94, 1 Ex. auf *Rumex obtusifolius* - Schloßböckelheim, HÖHNER, 17.V.94 und 20.VI.94, 1 Ex. sowie 20.V.95, 4 Ex. auf *Rumex obtusifolius*.
- Lixus filiformis* (F., 1781): Monzingen, HÖHNER, 8.VI.95, 2 Ex. am Feldrand gekeschert und 20.VI.94, 1 Ex. auf *Carduus sp.*
- Cyphocleonus dealbatus* (GMEL., 1790): Schloßböckelheim, HÖHNER, 29.V.93, 1 Ex. auf *Salvia pratensis*.
- Pseudostyphlus pillumus* (GYLL., 1836): Monzingen, HÖHNER, 20.VI.94, 10 Ex. auf *Anthemis arvensis*.
- Smicronyx nebulosus* TOURN., 1874: Schloßböckelheim, BÖHME, 8.III.97, 1 Ex. im Hochwassergenist (KOSTAL det.).
- Tychius tibialis* BOH., 1843: Schloßböckelheim, HÖHNER, 17.VII.93, 1 Ex. am Feldrand gekeschert, 4.VIII.93, 2 Ex. auf *Dianthus cartusiorus*,

- 20.VI.94, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert und 24.IV.95, 4 Ex. von *Quercus*-Ästen.
- Sibinia subelliptica* (DESBR., 1873): Schloßböckelheim, HÖHNER, 17.V.94, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert und 17.VII.93, 4 Ex. am Feldrand gekeschert.
- Anthonomus humeralis* (PANZ., 1795): Oberhausen, BÖHME, 27.IV.95, 10 Ex. auf *Prunus spec.* - Schloßböckelheim, BÖHME, 28.V.98, 2 Ex. auf *Pyrus communis*.
- Anthonomus rufus* GYLL., 1836: Schloßböckelheim, BÖHME, 8.III.97, 1 Ex. auf *Genista spec.*
- Bradybatus kellneri* BACH, 1854: Schloßböckelheim, HÖHNER, 24.IV.95, 7 Ex. auf blühendem Feldahorn.
- Hypera ononidis* (CHEVR., 1863): Schloßböckelheim, HÖHNER, 8.VI.95, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Sphenophorus striatopunctatus* (GOEZE, 1777): Schloßböckelheim, HÖHNER, 24.IV.95, 1 Ex. unter Stein.
- Acalles lemur* (GERM., 1824): Schloßböckelheim, BÖHME, 12.X.96, 2 Ex. aus *Quercus*-Bodenstreu.
- Baris coerulescens* (SCOP., 1763): Schloßböckelheim, HÖHNER, 16.V.92, 2 Ex. gekeschert.
- Baris fallax* (BRIS., 1870): Schloßböckelheim, HÖHNER, 16.V.92, 1 Ex. gekeschert.
- Coeliodes ilicis* BEDEL, 1885: Schloßböckelheim, HÖHNER, 23.IV.94, 1 Ex. und 24.IV.95, 4 Ex. von *Quercus*-Ästen sowie BÖHME, 29.IV.96, 1 Ex. auf *Quercus spec.*
- Coeliodes trifasciatus* BACH, 1854: Schloßböckelheim, HÖHNER, 23.IV.94, 1 Ex. und 24.IV.95, 2 Ex. von *Quercus*-Ästen.
- Coeliodes ruber* (MARSH., 1802): Schloßböckelheim, HÖHNER, 24.IV.95, 2 Ex. von *Quercus*-Ästen.
- Thamiocolus signatus* (GYLL., 1837): Schloßböckelheim, HÖHNER, 30.V.94, 3 Ex. auf *Stachys recta*.
- Ceutorhynchus atomus* BOH., 1845: Schloßböckelheim, HÖHNER, 17.V.94, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Ceutorhynchus napi* GYLL., 1837: Langenlonsheim, BÖHME, 20.V.89, 1 Ex. auf *Isatis tinctoria* - Schloßböckelheim, HÖHNER, 16.V.92, 1 Ex. gekeschert.

- Ceutorhynchus inaeffectatus* GYLL., 1837: Monzingen, HÖHNER, 8.VI.95, 3 Ex. auf *Hesperis matronalis*.
- Ceutorhynchus rusticus* GYLL., 1837: Schloßböckelheim, BÖHME, 29.IV.96, 2 Ex. und HÖHNER, 17.V.94, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Ceutorhynchus resedae* (MARSH., 1802): Schloßböckelheim, HÖHNER, 30.V.94, 10 Ex. auf *Reseda luteola*.
- Ceutorhynchus pulvinatus* GYLL., 1837: Schloßböckelheim, HÖHNER, 20.V.95, 1 Ex. gekeschert.
- Ceutorhynchus rhenanus* SCHLTZ., 1895: Schloßböckelheim, HÖHNER, 29.V.93 und 20.V.95, je 1 Ex. gekeschert, 30.V.94, 5 Ex. auf *Stachys recta* - Sobernheim-Boos, Heimberg, HÖHNER, 29.V.93, 1 Ex.
- Oprohinus consputus* (GERM., 1824): Schloßböckelheim, HÖHNER, 8.VI.95, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Neoglocianus maculaalba* (HBST., 1795): Schloßböckelheim, HÖHNER, 30.V.94, 1 Ex. auf *Reseda luteola*.
- Gymnetron pascuorum* (GYLL., 1813): Schloßböckelheim, HÖHNER, 29.V.93, 1 Ex. gekeschert.
- Gymnetron melanarium* (GERM., 1821): Schloßböckelheim, HÖHNER, 16.V.92, 2 Ex. gekeschert.
- Gymnetron melas* BOH., 1838: Schloßböckelheim, HÖHNER, 30.V.94, 1 Ex. am Feldrand gekeschert.
- Gymnetron netum* (GERM., 1821): Schloßböckelheim, HÖHNER, 29.V.93, 3 Ex. gekeschert.
- Gymnetron collinum* (GYLL., 1813): Schloßböckelheim, HÖHNER, 16.V.92, 1 Ex. gekeschert, 30.V.94, 1 Ex. am Feldrand gekeschert und 8.VI.95, 1 Ex. auf einer Wiese gekeschert.
- Pseudorchestes ermischii* (DIECKM., 1958): Schloßböckelheim, HÖHNER, 4.VIII.93, 1 Ex. am Feldrand gekeschert.
- Tachyerges pseudostigma* (TEMP., 1982): Oberhausen, BÖHME, 27.IV.95, 1 Ex. auf *Salix spec.*

Joachim Böhme, Dieselstr. 3b, 67141 Neuhofen
 Wilhelm Höhner, Leipziger Str. 28, 63526 Erlensee
 e-Mail: wilhelm.hoehner@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Kolenpterologen](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Böhme Joachim, Höhner Wilhelm

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Käfernachweise \(Coleóptera\) im Nahetal zwischen Monzingen und Langenlonsheim 33-41](#)