

Cleonus cinereus SCHRK.

im Sommer 1932 erbeutet. Beide Arten sind aus dem Gebiet bisher noch nicht gemeldet worden.

Lixus sanguineus ROSSI.

Im Mai 1934 einmal in einem Lößhohlweg ob Ihringen a. K. angetroffen. Der Käfer saß am äußersten Ende eines Crataegus-Zweiges, wohin er aufgestiegen oder angefliegen war.

Baris fallax BRIS.

Die Meldung dieses äußerst seltenen, nach REITTER bisher in Deutschland nur einmal bei Nassau gefundenen Rüsslers möge die erste Reihe dieser Mitteilungen beschließen. Die beiden im Juni 1934 am Achkarrer Schloßberg von *Chenopodium Bonus Henricus* L. gekäscherten Stücke wurden von HUBENTHAL determiniert.

L i t e r a t u r.

1. Edmund Reitter. Fauna Germanica, Käfer. Stuttgart 1916.
2. F. Hartmann. Beiträge zu Badens Käferfauna I.—IV. Mitt. d. bad. Zoolog. Vereins Nr. 18 (1907) und Mitt. d. Bad. Landesvereins f. Naturkunde und Naturschutz Nr. 251—253 (1911), ebenda, Neue Folge Bd. I, H. 12/13 (1924), Bd. II, Heft IV (1926).
3. R. Lauterborn. Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins und des Bodensees, 1.—8. Reihe, Mitt. d. Bad. LV. Neue Folge Bd. I H. 5 (1921), H. 7 (1921), H. 10 (1922), H. 12/13 (1924), H. 16 (1925), ferner Bd. II H. 1/2 (1926).
4. Karl Strohm. Die Insekten. In: Der Kaiserstuhl, eine Naturgeschichte des Vulkangebirges am Oberrhein. Unter der Schriftleitung von R. Lais herausgegeben v. Bad. Landesverein f. Naturkunde und Naturschutz, Freiburg i. Br. 1933. S. 306—321.

Die Landschnecken der Umgebung von Konstanz.

Von Friedrich Ehrenfeld, Mainz-Mombach.

(Schluss.)

Arion empiricorum FER.:

Bodan: Mainauwald, Möggingen, Bodman.

Linzgau: Ueberlingen, Nußdorf, Aufkirch, Spetzgart-Tobel, Hödingertobel, Staad (alles B.).

Arion subfuscus DRAP.:

Bodan: Liggeringen, Bodman (B.).

Arion brunneus LEHMANN:

Bodan: Liggeringen (B.).

Arion hortensis FER.:

Linzgau: Ueberlingen (B.).

Arion circumscriptus JOHNSTON:

Bodan: Liggeringen (B.), Bogman (B.).

Linzgau: Ueberlingen, Spetzgart-Tobel, Birnau-Salem (alles B.).

Eulota fruticum MÜLLER:

Im Gebiet verbreitet.

Helicella ericetorum MÜLLER:

Bodan: Kiesgrube Wollmatingen q 4, Wollmatingen-Dettingen q 4, Konstanz (Ln.), Flugplatz q 4.

Linzgau: Ruine Niöderhohenfels o 3, Haldenburg mi 1, Meersburg mi 4, Goldbach (B.), Gletschermühle (B.), Aufkirch (B.), Spetzgart (B.), Süßenmühle (B.).

Hegau: Rickelshausen q 4, Nellenburg mi 1, Stockach W. o 3, Hohentwiel (Phonolith), Wahlwies-Orsingen q 4 (L., E.).

Schweizer Ufer: Salenstein mi 4.

Helicella obvia HARTM.:

Bodan: Sofienberg q 4 (bei Langenrain).

Hegau: Rickelshausen q 4.

Helicella candidula STUD.:

Bodan: Kiesgrube Wollmatingen q 4.

Fruticicola hispida L.:

Im Gebiet verbreitet.

Fruticicola sericea DRAP.:

Bodan: Mainau (B.) mi 4, Mainauwald q 4, Heiligenhölzle mi 4, Großer Abendberg q 4, Dettlingen q 4, Lorettohöhe q 4, Egg q 4, Wollmatingen - Dettingen q 4, Geisstall q 4, Ried bei Dingelsdorf q 4, Langenrain q 4, Mooswiese q 4, Zellerholz q 4, Kargegg q 4, Steckenloch mi 1, Bodenburg mi 1, Ruine Bodman mi 1, Liggeringen-Bodenburg mi 1, Schopflen q 4.

Linzgau: Meersburg mi 4, Ueberlingen (B., L.), Birnau-Salem (B.).

Hegau: Homboll (Basalt).

Schweizer Ufer: Töbeli bei Kreuzlingen mi 4.

Fruticicola villosa STUDER:

Hegau: Krebsbachtal bei Tudoburg wç, Hohenstoffeln-Nordgipfel und -Südgipfel (Basalt).

Fruticicola cobresiana v. ALTEN:

Bodan: Wollmatingen-Dettingen q 4, Ried bei Dingelsdorf q 4, bei Konstanz (Ln.), Bannbühl q 4, Wallhausen-Burghof mi 1, Kargegg q 4, zwischen Teufels- und Effletal o 3, Schlucht bei Ruine Dettingen mi 1, Geisstall q 4, Blissenwände o 3, Dettelbachtal o 3, Ruine Bodman mi 1.

Linzgau: Sommertal mi 4, Döbele bei Meersburg mi 4, Nußdorf, Ufer (B.), Hödingen (Ki.), bei Ueberlingen (G., Ln.).

Monacha incarnata MÜLLER:

Im Gebiet verbreitet.

Euomphalia strigella DRAP.:

Bodan: Liggeringen mi 1 (B.).

Linzgau: Bohnenbachtal bei Burghalde o 3, Niederhohenfels o 3, Goldbach (L., B.), Spetzgart (B.), Süßenmühle (B.).

Helicodonta obvoluta MÜLLER:

Im Gebiet verbreitet.

Chilotrema lapicida LEACH:

Im Gebiet verbreitet.

Arianta arbustorum L.:

Im Gebiet verbreitet.

Isognomostoma isognomostoma GMELIN:

Im Gebiet verbreitet.

Cryptomphalus aspersus MÜLLER:

Linzgau: Ueberlingen (lebend) 1927 (B.), 1932 (E.), mi 1, Kogenbach (lebend) (B.).

Balea perversa L.:

Bodan: Schloß Möggingen q 4.

Höri: Schrotzburg q 4.

Hegau: Mägdeberg (Phonolith), Hohenstoffeln, Nord- und Südgipfel (Basalt).

Cochlodina laminata MONTAGU:

Im Gebiet allgemein verbreitet.

Cochlodina orthostoma MENKE:

Bodan: Mainauwald q 4, Geisstall q 4, Kargegg q 4, Ruine Bodman mi 1.

Hegau: Hohenstoffeln-Nordgipfel (Basalt).

Schweizer Ufer: Töbeli bei Kreuzlingen mi 4, Ruine Kastel mi 4.

Clausilia parvula STUDER:

Bodan: Mainauwald q 4, Ruine Dettingen mi 1, Katharinenbachschlucht mi 1, bei Konstanz (K., Ln.), Kargegg q 4, Schloß Möggingen q 4, Wallhausen-Burghof mi 1, Steckenloch mi 1, zwischen Teufels- und Effletal o 3, Liggeringen-Bodenburg mi 1, Ruine Bodman (L., E.) mi 1, Ruine Bodman-Frauenberg mi 1, Frauenberg mi 1, Dettelbachtal o 3, Blissenhalde mi 1.

Linzgau: Freundschaftshöhlen q 4, Ueberlingen (L., B., E.) mi 1, Meersburg mi 4, Spetzgart-Tobel mi 1, Süßenmühle (B., E.) o 3, Niederhohenfels (L., E.) o 3, Nußdorf, Ufer (B.).

Hegau: Homburg q 1, Nellenburg mi 1, Aach, Burg wζ, Langenstein wζ, am Hohentwiel (Ln.), Mehlauf q 4, Tudoburg wζ, Engen q 4, Krebsbachtal bei Reute wζ, Tengen-Hinterburg wζ, Wasserburger Tal wζ, Hohenstoffeln - Nordgipfel (Basalt), Hohenhöwen (Basalt), Heilsberg (Basalt), Rosenegg (Phonolith), Hohenkrähen (Phonolith), Mägdeberg (Phonolith).

Höri: Hohenklingen mi 4, Schrotzburg q 4.

Schweizer Ufer: Zeeller Loch mi 4, Arenenberg mi 4, Salenstein mi 4, Ruine Kastel mi 4.

Clausilia dubia DRAP.:

Bodan: Schwackerten q 4, Mainauwald q 4, Exerzierplatz q 4, Heiligenhölzle mi 4, Schwallert q 4, Ruine Dettingen mi 1, Großer Abendberg q 4, Schlucht bei Ruine Dettingen mi 1,

Mooswiese q 4, Katharinenbachschlucht mi 1, St. Katharina q 4, Kargegg q 4, Wollmatingen-Dettingen q 4, Marienschlucht mi 1, Wallhausen-Burghof mi 1, zwischen Teufels- und Effletal o 3, Ruine Bogman mi 1 (L., E.), Blissenhalde mi 1, Ruine Bodman-Frauenberg mi 1, Bodenburg mi 1, Frauenberg mi 1, Dettelbachtal o 3, Langenrain q 4, Litzelhard mi 4, Liggeringen mi 1, Liggeringen-Bodenburg mi 1, Geisstall q 4.

Linzgau: Freundschaftshöhlen q 1, Nußdorf, Ufer (B.).

Hegau: Hohentwiel (Phonolith), Langenstein wç, Wasserburger Tal wç, Homburg q 1, Eckartsbrunn-Engen wç, Krebsbachtal bei Reute wç.

Höri: Schrotzburg q 4, Schrotzburg-Herrentisch q 4, Gaienhofen-Langenmoos mi 4, Gfellbachtal bei Waldheim mi 4,

Clausilia cruciata STUDER:

Bodan: Mooswiese q 4, Großer Abendberg q 4, Schwallert q 4, Mühlbergle q 4, Schwackerten q 4, St. Katharina q 4, Wollmatingen-Dettingen q 4, Mainauwald q 4, Liggeringen-Bodenburg mi 1, Ruine Dettingen q 1, Schlucht bei dieser mi 1, zwischen Teufels- und Effletal o 3, Steckenloch mi 1, Frauenberg mi 1, Ruine Bodman-Frauenberg mi 1, Ruine Bodman mi 1 (L., E.).

Hegau: Rosenegg (Phonolith).

Höri: Langenmoos - Schienen q 4, Gaienhofen-Langenmoos mi 4, Schrotzburg-Herrentisch q 4, Bankholzen-Schrotzburg mi 4.

Linzgau: Heiligenberg-Egg q 1 (L., E.), Freundschaftshöhlen q 1, Birnau-Salem (B.).

Iphigena ventricosa DRAP.:

Bodan: Mooswiese q 4, Schwallert q 4, Wollmatingen-Dettingen q 4, in der Gegend von Konstanz (Ln.), Dettingen q 4, Mainauwald q 4, Burghof-Wallhausen mi 1, Schlucht bei Ruine Dettingen mi 1, Blissenhalde mi 1, Blissenwände o 3, Steckenloch mi 1, Ruine Bodman mi 1 (L., E.), Freudental q 4.

Höri: Gfellbachtal bei Waldheim mi 4, Schrotzburg q 4, Bankholzen-Schrotzburg mi 4.

Linzgau: Sommertal mi 4, Nußdorf, Ufer (B.).

Hegau: Stockach o 3, Krebsbachtal bei Tudoburg wç.

Schweizer Ufer: Kastel mi 4.

Iphigena lineolata HELD:

Bodan: Mainauwald q 4, Heiligenhölzle mi 4, Wollmatingen Dettingen q 4, Konstanz (Ln.), Schwackerten q 4, Steinerberg q 4, Mühlbergle q 4, Schwallert q 4, Mooswiese q 4, Freudental q 4, Schloß Möggingen q 4, Litzelhard mi 4, Geisstall q 4, Schlucht bei Ruine Dettingen mi 1, Katharinenbachschlucht mi 1, Marienschlucht mi 1, zwischen Teufels- und Effletal o 3, Blissenhalde mi 1, Blissenwände o 3, Ruine Bodman mi 1 (L., E.), Dettelbachtal o 3.

Höri: Gfellbachtal bei Waldheim mi 4, Gaienhofen-Langenmoos mi 4, Bankholzen-Schrotzburg mi 4.

Linzgau: Nußdorf, Ufer (B.), Ueberlingen mi 1 (B., E.), Sommer-

tal mi 4, Döbele bei Meersburg mi 4, Bohnenbachtal bei Burg-
halde o 3, Spetzgart-Tobel mi 1 (B., E.), Birnau-Salem (B.),
Hödinger-Tobel (B.), Hagnau-Immenstaad.

Hegau: Kreuzhalde (Steißlingen) q 4.

Schweizer Ufer: Töbeli bei Kreuzlingen mi 4, Zeeller Loch beim
Mannenbach mi 4, Arenenberg mi 4, Salenstein mi 4.

Iphigena plicatula DRAP.:

Bodan: Schwallert q 4, Großer Abendberg q 4, Mooswiese q 4,
bei Konstanz (Ln.), Dingelsdorf q 4, Freudental q 4, Exerzier-
platz q 4, Gießendobel mi 4, Schwackerten q 4, St. Katharina
q 4, Wollmatingen-Dettingen q 4, Mainauwald q 4, Heiligen-
hölzle mi 4, Geisstall q 4, Ruine Dettingen mi 1, Schlucht bei
vorgenannter mi 1, Katharinenbachschlucht mi 1, Kargegg q 4,
zwischen Teufels- und Effletal o 3, Blissenhalde mi 1, Blissen-
wände o 3, Steckenloch mi 1, Zellerholz q 4, Langenrain q 4,
Bodenburg mi 1, Dettelbachtal o 3, Ruine Bodman mi 1 (L., E.),
Ruine Bodman-Frauenberg mi 1, Liggeringen-Bodenburg mi 1.

Höri: Hohenklingen mi 4, Gfellbachtal bei Waldheim mi 4,
Langenmoos - Schienen q 4, Gaienhofen - Langenmoos mi 4,
Schrotzburg - Herrentisch q 4, Schrotzburg q 4, Bankholzen-
Schrotzburg mi 4.

Hegau: Homburg q 1, Stockach o 3, Freundschaftshöhlen q 1,
Aach, Burg, wç, Mehlauf q 4, Kreuzhalde-Süd (Steißlingen) q 4,
Tudoburg wç, Eckhartsbrunn-Engen wç, Wasserburger Tal wç,
Hohenstoffeln, Nord- und Südgipfel (Basalt), Hohenhöwen
(Basalt), Hohentwiel (Phonolith), Heilsberg (Basalt), Rosenegg
(Phonolith), Staufen (Phonolith), Hohenkrähen (Phonolith),
Homboll (Basalt).

Linzgau: Hödinger-Tobel mi 1 (B., E.), Nußdorf, Ufer (B.), Spetz-
gart-Tobel (B.).

Schweizer Ufer: Arenenberg mi 4, Salenstein mi 4, Ruine Kastel
mi 4.

Laciniaria plicata DRAP.:

Bodan: Schloß Mainau mi 4, Heiligenhölzle mi 4, Ruine Dettingen
mi 1, bei Konstanz (K.), Mainauwald q 4, Großer Abendberg
q 4, Mooswiese q 4, Litzelhard mi 4, Dingelsdorf q 4, Schloß
Möggingen q 4, Geisstall q 4, Schwallert q 4, Mühlbergle q 4,
Exerzierplatz q 4, Liggeringen-Bodenburg mi 1, Gissendobel
mi 4, Schwackerten q 4, Marienschlucht mi 1, Wollmatingen-
Dettingen q 4, Schopflen q 4, Kargegg q 4, Mindelsee-Südufer
mi 1, Schlucht bei Ruine Dettingen mi 1, Katharinenbach-
schlucht mi 1, Burghof-Wallhausen mi 1, Blissenwände o 3,
Steckenloch mi 1, Blissenhalde mi 1, zwischen Teufels- und
Effletal o 3, Dettelbachtal o 3, Ruine Bodman-Frauenberg mi 1,
Ruine Bodman mi 1 (L., E.).

Linzgau: Hagnau-Immenstaad, Ueberlingen (B., L., E.), Lichten-
berg bei Deisendorf q 4, Freundschaftshöhlen q 1 (L., E.),
Meersburg mi 4, Döbele bei Meersburg mi 4, Spetzgart-Tobel
mi 1, Hödinger-Tobel o 3 B., L., E.), Nußdorf, Ufer (B.),
Goldbach, Hohlweg (B.).

Hegau: Heilsberg (Basalt), Hohenstoffeln, Nord- und Südgipfel (Basalt), Rosenegg (Phonolith), Hohenkrähen (Phonolith), (L., E.), Mägdeberg (Phonolith), Homboll (Basalt), Homburg q 1, Nellenburg mi 1, Langenstein wζ, Kreuzhalde q 4, Krebsbachtal bei Tudoburg wζ, Engen q 4.

Höri: Hohenklingen mi 4, Gaienhofen-Langenmoos mi 4, Schrotzburg q 4.

Schweizer Ufer: Ruine Kastel mi 4, Salenstein mi 4, Arenenberg mi 4, Zeeller Loch bei Mannenbach mi 4, Töbeli bei Kreuzlingen mi 4.

Laciniaria biplicata MONTAGU:

Bodan: Mainauwald q 4, Schwackerten q 4, Gissendobel mi 4, Gegend von Konstanz (Ln.), Wollmatingen - Dettingen q 4, Blissenhalde mi 4, Blissenwände o 3, Steckenloch mi 1, o 3, Bodenburg mi 1, Ruine Bodman-Frauenberg mi 1, Ruine Bodman mi 1 (L., E.).

Linzgau: Ueberlingen mi 1 (L., B., E.), Spetzgart-Tobel (albin) (B.), Meersburg (B.), Birnau-Salem (B.), Süßenmühle (B.), Hödinger-Tobel (B.).

Hegau: Engen q 4, Eckartsbrunn-Engen wε, Stockach o 3.

Laciniaria cana HELD:

Linzgau: Freundschaftshöhlen q 4 (L., E.), Heiligenberg-Egg q 1.
Höri: Gfellbachtal bei Waldheim mi 4.

Graciliaria filograna ROSSM.:

Schweizer Ufer: Nördlich von Salenstein mi 4, Ruine Kastel mi 4.
Trotz sorgfältigster Nachforschungen konnte diese Art auf der rechten Rheinseite nicht aufgefunden werden.

Succinia putris L.:

Im Gebiet verbreitet.

Succinia pfeifferi ROSSM.:

Bodan: Wollmatingen (B.).
Linzgau: Nußdorf, Ufer (B.).

Succinia oblonga DRAP.:

Bodan: Mindelsee (B.).
Linzgau: Nußdorf, Ufer (B.), Goldbach, Hohlweg (B.), Meersburg (B.), Süßenmühle (B.).
Höri: Bühlarz mi 4, Bankholzen-Schrotzburg mi 4.
Schweizer Ufer: Salenstein mi 4.

Vallonia pulchella MÜLLER:

Bodan: Mindelsee (B.), Möggingen (B.), Wollmatingen (B.), Kiesgrube Wollmatingen q 4, Dingelsdorf q 4, Wollmatingen-Dettingen q 4, Egg q 4, Lorettohöhe q 4.
Linzgau: Aufkirch (B.), Spetzgart-Tobel (B.), Süßenmühle (B., E.), Hödinger-Tobel (B.).
Schweizer Ufer: Ruine Kastel mi 4.

Vallonia costata MÜLLER:

Bodan: Mindelsee (B.), Möggingen (B.), Bodman (B.), Wollmatingen (B.), Kiesgrube Wollmatingen q 4, Dingelsdorf q 4.
Linzgau: Nußdorf, Ufer (B.), Aufkirch (B.), Süßenmühle (B., E.).
Schweizer Ufer: Kastel mi 4.

Abida secale DRAP.:

Bodan: Kargegg q 4, Frauenberg mi 1, Dettelbachtal o 3, Blissenhalde mi 1, zwischen Teufels- und Effletal o 3, Markelfingen q 4, Ruine Bodman (L., E.) mi 1.
Hegau: Langenstein wζ, Hohenhöwen (Basalt).
Höri: Schrotzburg q 4.
Linzgau: Ueberlingen mi 1, Freundschaftshöhlen q 1 (L., E.), Döbele bei Meersburg mi 4, Niederhohenfels o 3 (L., E.), Nußdorf, Ufer (B.).
Schweizer Ufer: Salenstein mi 4, Zeeller Loch mi 4, Hohenklingen mi 4.

Abida frumentum DRAP.:

Bodan: Kiesgrube bei Wollmatingen q 4, Wollmatingen-Dettingen q 4, Umgebung von Konstanz (Ln.), Sofienberg q 4, Egg q 4.
Hegau: Hohenstoffeln-Nordgipfel (Basalt).
Höri: Hohenklingen mi 4.
Linzgau: Döbele bei Meersburg mi 4, Süßenmühle (B., E.), Niederhohenfels o 3, Nußdorf, Ufer (B.), Goldbach, Hohlweg (B.), Gletschermühle (B.), Aufkirch (B.), Spetzgart (B.).
Schweizer Ufer: Berg mi 4, Salenstein mi 4.

Vertigo antivertigo DRAP.:

Linzgau: Nußdorf, Ufer (B.).
Bodan: Reichenau, Insel (Wägele, Stuttgart).

Vertigo pygmaea DRAP.:

Bodan: Kiesgrube bei Wollmatingen q 4, Ried bei Dingelsdorf q 4, bei Konstanz (Ln.).

Columella edentula DRAP.:

Bodan: Liggingen (B.).
Linzgau: Nußdorf, Ufer (B.).

Truncatellina cylindrica FER.:

Bodan: Kiesgrube bei Wollmatingen q 4.
Linzgau: Süßenmühle (B.).

Pupilla muscorum MÜLLER:

Bodan: Kiesgrube bei Wollmatingen q 4, Dingelsdorf q 4, Markelfingen-Kaltbrunn q 4, Wollmatingen-Dettingen q 4, Egg mi 4, Sofienberg q 4.
Höri: Hohenklingen mi 4.
Linzgau: Süßenmühle mi 1, Nußdorf (B.), Goldbach, Hohlweg (B.), Aufkirch (B.).
Schweizer Ufer: Kastel mi 4.

Orcula dolium DRAP.:

Bodan: Schopflen (1 Stück, angeschwemmt?) q 4.

Höri: Bankholzen-Schrotzburg mi 4, in der Gegend von Wangen am Untersee (Ln.), am Schienerberg (Ln.).

Orcula doliolum BRUGIERE:

Bodan: Blissenwände o 3.

Ena montana DRAP.:

Im Gebiet allgemein verbreitet.

Ena obscura MÜLLER:

Im Gebiet allgemein verbreitet.

Zebrina detrita MÜLLER:

Linzgau: Niederhohenfels o 3, Haldenburg mi 1, Gletschermühle (B.).

Hegau: Hohentwiel (Phonolith), Staufen (Phonolith), Hohenkrähen (Phonolith) (K., E.), Mägdeberg (Phonolith), Heilsberg (Basalt), Rosenegg (Phonolith), Aach wç.

Höri: Hohenklingen mi 4.

Caecilioides acicula MÜLLER:

Im Gebiet verbreitet.

Cochlicopa lubrica MÜLLER:

Im Gebiet verbreitet.

Carychium minimum MÜLLER:

Im Gebiet verbreitet.

Pomatias elegans MÜLLER:

Bodan: Frauenberg mi 1, Blissenwände o 3.

Linzgau: Döbele bei Meersburg mi 4, Bohnenbachtal bei Burg- halde o 3, bei Meersburg (Ln., B.), Niederhohenfels o 3.

Pupula lineata DRAP.:

Bodan: Blissenwände o 3, in der Gegend von Konstanz (Ln.).

Pupula sublineata ANDREAE:

Bodan: Bodman (L.).

Linzgau: Nußdorf (B.).

Es sind in Vorliegendem 78 Arten verzeichnet, dazu kämen noch die beiden Cepaeen und *Helix pomatia*, im Ganzen also 81 Arten.

L i t e r a t u r :

- D. Geyer, Unsere Land- und Süßwassermollusken, 3. Aufl., Stuttgart 1927.
A. Gysser, Die Mollusken-Fauna Badens, Heidelberg 1863.
C. Kreglinger, Verzeichnis der lebenden Land- und Süßwasser-Conchylien des Großherzogtums Baden, Karlsruhe 1864.
F. Lehmann, Einführung in die Mollusken-Fauna des Großherzogtums Baden, Karlsruhe 1884.
R. Lais, Beiträge zur Kenntnis der badischen Molluskenfauna, Freiburg i. Br. 1929. (Mitt. des Bad. Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz in Freiburg i. Br.) 1928, 1929, 1931.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1934-1938

Band/Volume: [NF_3](#)

Autor(en)/Author(s): Ehrenfeld Friedrich

Artikel/Article: [Die Landschnecken der Umgebung von Konstanz. \(1935\) 146-153](#)