© Entomologischer Verein Stuttgart e.V.;download www.zobodat.at



# Notizen zum Vorkommen einiger Apion-Arten in Baden

Von Joachim Rheinheimer, Ludwigshafen

| | |
|---|---|
| **Apion sedi** (14) | bei Bruchsal am 28.9.1980, im Kaiserstuhl im Mai und Oktober 1980. Ich habe die Art aber auch andernorts im Rheintal nachweisen können. |
| **A. rufirostre** (21) | Kaiserstuhl, Mai 1980. |
| **A. formaneki** (33) | bei Bruchsal an *Genista tinctoria* nicht selten. |
| **A. difficile** (34) | wie der Vorige. |
| **A. corniculatum** (35) | Singen/Hegau, 5.7.1980. |
| **A. fuscirostre** (38) | zwischen Karlsruhe und Mannheim an *Sarothamnus scoparius* häufig. |
| **A. pallipes** (40) | in Buchenwäldern an *Mercurialis perennis* nicht überall, aber dann oft in Anzahl. |
| **A. semivittatum** (41) | an *Mercurialis annua* an trocken, sonnenexponierten Stellen lokal. |
| **A. millum** (46) | Singen/Hegau, im September 1981 an Prunella vulgaris. |
| **A. flavimanum** (47) | an *Origanum vulgare* in der Umgebung von Karlsruhe. |
| **A. origani** (49) | an *Origanum vulgare* am Westabfall des Kraichgaus bei Karlsruhe überall, aber einzeln, besonders im Herbst. |
| **A. hoffmanni** (53) | Singen/Hegau, 5.7.1980. |
| **A. confluens** (54) | nördlich von Karlsruhe auf ehemaligen Rheinsönden an verschiedenen Stellen auf Kamillen (Juli - September 1980). |
| **A. stolidum** (55) | Kaiserstuhl, Mai 1981. |
| **A. sulcifrons** (57) | an *Artemisia campestris* im Kaiserstuhl mehrfach im Herbst gefunden (1980/81). |
| **A. penetrans** (62) | kommt im Rheintal und am Westrand des Kraichgaus an etlichen Stellen an *Centaurea* vor. |
| **A. alliariae** (63) | trotz intensiver Suche an vielen Stellen nie gefunden! |
| **A. laevigatum** (67) | nördlich von Karlsruhe an sandigen, trockenen Stellen auf *Anthemis* (neueste Funde: Mai 1989 und 1990). |
| **A. dispar** (69) | wie *laevigatum*, aber verbreiteter. |
| **A. intermedium** (84) | an *Onobrychis viciaefolia* bei Bruchsal 1980. |
| **A. afer** (90) | um Bruchsal nicht selten an *Lathyrus pratensis*. |
| **A. columbinum** (98) | bei Bruchsal ziemlich häufig an verschiedenen *Lathyrus*-Arten, besonders an *L. latifolius*. |
| **A. punctigerum** (100) | bei Bruchsal recht selten. Ich habe die Art bisher nur an *Vicia sepium* gefunden. In der Literatur werden aber auch andere Futterpflanzen angegeben. |
| **A. curtisi** (105) | Kaiserstuhl, 22.10.1980; Umg. Bruchsal, 22.10.80; Singen/Hegau, 5.7.1980; Werbach/Tauber, 25.6.1989. An *Hippocrepis comosa* vielerorts häufig. |
| **A. pavidum** (108) | überall häufig an *Coronilla varia*. |
| **A. vorax** (109) | bemerkenswerterweise immer nur einzeln. |
| **A. astragali** (125) | bei Bruchsal ziemlich häufig an *Astragalus glyciphyllum*. |
| **A. ruficrus** (132) | im Kaiserstuhl an *Trifolium alpestre*, ebenso bei Crailsheim, knapp außerhalb Baden-Württembergs. |
| **A. interjectum** (133) | einmal bei Wiesental (nordwestlich von Bruchsal) gefunden (28.9. 1980), außerdem am 15.5.1980 im Kaiserstuhl. |
| **A. dissimile** (140) | an *Trifolium arvense* auf sandigen, kargen Flächen bei Bruchsal 1980 und am 24.7.1988. |

Joachim Rheinheimer, Merziger Straße 24, 6700 Ludwigshafen

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: 25_1990

Autor(en)/Author(s): Rheinheimer Joachim

Artikel/Article: Notizen zum Vorkommen einiger Apion-Arten in Baden. 110