

Käfer- und Holzwespenfunde an Stieleichen aus der "Teningen Allmend", Lkr. Emmendingen (Coleoptera et Hymenoptera: Siricidae)

Von Andreas R. Braun, Rheinau-Honau

Im Rahmen einer von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg i. Br. durchgeführten Versuchsreihe fiel im Zeitraum Dezember 1992 bis Oktober 1993 umfangreiches Insektenmaterial (Eklektorenfänge) von drei Stieleichen aus der "Teningen Allmend" Lkr. Emmendingen (TK 7813), an.

Nachfolgend wird eine Liste der nachgewiesenen Käfer- und Holzwespenarten gegeben (Coleoptera et Hymenoptera: Siricidae).

Für die Durchsicht einiger kritischer Coleopteren danke ich Herrn Christian Maus, Freiburg i. Br.

Artenliste

1. Coleoptera

Carabidae

- Calosoma inquisitor* (L.)
- Bembidion lunulatum* (Fourcr.)
- Diachromus germanus* (L.)
- Abax parallelus* (Duft.)
- Dromius agilis* (F.)
- Dromius spilotus* (Ill.)
- Dromius quadrinotatus* (Panz.)

Silphidae

- Necrophorus vespilloides* Hbst.

Orthoperidae

- Sacium nanum* (Muls.)

Staphylinidae

- Metopsia clypeata* (Müll.)
- Coprophilus striatulus* (F.)
- Tachyporus obtusus* (L.)
- Tachyporus hypnorum* (F.)
- Tachyporus atriceps* Steph.
- Leptusa ruficollis* (Er.)
- Aleochara sparsa* Heer
- Aleochara fumata* Grav.

Cantharidae

- Cantharis livida* L.
- Rhagonycha lutea* (Müll.)
- Rhagonycha lignosa* (Müll.)

Malthinus punctatus (Hbst.)
Malthinus seriepunctatus Kiesw.

Melyridae

Aplocnemus impressus (Marsh.)
Dasytes plumbeus (Müll.)

Elateridae

Ampedus pomorum (Hbst.)
Dalopius marginatus (L.)
Melanotus rufipes (Hbst.)
Denticollis linearis (L.)
Hemicrepidius niger (L.)
Athous vittatus (F.)
Athous subfuscus (Müll.)

Throscidae

Trixagus brevicollis Bonv.
Trixagus dermestoides (L.)

Buprestidae

Agrilus biguttatus (F.)
Agrilus sulcicollis Lacord.

Dermestidae

Anthrenus museorum (L.)

Nitidulidae

Pocadius ferrugineus (F.)

Rhizophagidae

Rhizophagus bipustulatus (F.)
Rhizophagus dispar (Payk.)

Laemophloeidae

Laemophloeus testaceus (F.)
Lathropus sepicola (Müll.)

Erotylidae

Dacne bipustulata (Thunb.)

Cryptophagidae

Telmatophilus typhae (Fall.)
Cryptophagus acutangulus Gyll.
Cryptophagus saginatus Strm.
Atomaria fuscata (Schönh.)

Latridiidae

Stephostethus angusticollis Gyll.
Aridius bifasciatus Rtt.
Aridius nodifer Westw.
Corticarina fuscula (Gyll.)

Corticarina gibbosa (Hbst.)

Mycetophagidae

Litargus connexus (Fourcr.)

Coccinellidae

Rhyzobius litura (F.)

Rhyzobius chrysomeloides (Hbst.)

Stethorus punctillum Weise

Oenopia conglobata (L.)

Propylea quatuordecimpunctata (L.)

Salpingidae

Vincenzellus ruficollis (Panz.)

Rhinosimus planirostris (F.)

Rhinosimus ruficollis (L.)

Melandryidae

Orchesia micans (Panz.)

Lagriidae

Lagria hirta (L.)

Cerambycidae

Rhagium mordax (Geer)

Strangalia quadrifasciata (L.)

Phymatodes testaceus (L.)

Xylotrechus antilope (Schönh.)

Mesosa nebulosa (F.)

Pogonocherus hispidus (L.)

Leiopus nebulosus (L.)

Chrysomelidae

Cryptocephalus flavipes F.

Phyllotreta flexuosa (Ill.)

Phyllotreta vittata (F.)

Phyllotreta atra (F.)

Phyllotreta cruciferae (Goeze)

Lythraia salicariae (Payk.)

Crepidodera aurea (Fourcr.)

Chaetocnema hortensis (Fourcr.)

Bruchidae

Spermophagus calystegiae Lukj. Ter-Min.

Bruchus rufimanus Boh.

Bruchus luteicornis Ill.

Bruchidius varius (Ol.)

Anthribidae

Platyrhinus resinosus (Scop.)

Tropideres albirostris (Hbst.)

Enedreutes sepicola (F.)
Brachytarsus nebulosus (Forst.)

Scolytidae

Scolytus intricatus (Ratz.)
Xyleborus monographus (F.)
Xyleborus peregrinus (Rz.)
Xyleborus germanus (Blandf.)
Xyloterus signatus (F.)

Curculionidae

Lasioryhynchites cavifrons (Gyll.)
Polydrusus undatus (F.)
Polydrusus sericeus (Schall.)
Barypeithes araneiformis (Schrk.)
Strophosoma melanogrammum (Forst.)
Anthonomus humeralis (Panz.)
Leiosoma deflexum (Panz.)
Nanophyes marmoratus (Goeze)
Nanophyes brevis Boh.
Rhynchaenus pilosus (F.)
Rhynchaenus quercus (L.)
Rhynchaenus erythropus (Germ.)
Rhynchaenus fagi (L.)

Apionidae

Apion malvae (F.)
Apion fulvipes (Fourcr.)

2. Hymenoptera

Siricidae

Xiphydria longicollis Geoffr

Literatur:

- BRAUN, A. (1993): Untersuchungen zum Käfer- und Holzwespenbefall an Stieleichen aus zwei Forstbezirken der Oberrheinischen Tiefebene (FA Emmendingen, FA Kehl) im Zusammenhang mit dem Ursachenkomplex des Eichensterbens. Unveröff. Bericht, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 81 S., Freiburg i. Br.
- FREUDE, H., HARDE, K.W. & LOHSE, G. A. (Hrsg., 1965-1983): Die Käfer Mitteleuropas. Bde. 1-11, Krefeld.
- LOHSE, G. A. & LUCHT, H. W. (Hrsg., 1989-1994): Die Käfer Mitteleuropas. Bde. 12-14, Krefeld.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [29_1994](#)

Autor(en)/Author(s): Braun Andreas

Artikel/Article: [Käfer- und Holzwespenfunde an Stieleichen aus der "Teninger Allmend", Lkr. Emmendingen \(Coleoptera et Hymenoptera: Siricidae\). 85-88](#)