

Quatre Histeridae nouveaux dans Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates

Par J. Théron

Dans une boîte d'*Histeridae* indéterminés appartenant au Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, que le Dr. H. Freude a bien voulu me communiquer, j'ai relevé ces quatre espèces inédites, qui méritent d'être décrites:

1. — *Exorhabdus angolensis* nov. sp.

Grosse espèce, de la taille d' *E. mayumbensis* Burgeon, dont il est très proche, ayant, comme lui, les mandibules concaves et rebordées et la strie frontale transformée en carène. Il s'en éloigne, à première vue, par sa forme générale plus courte et plus large, la présence d'une strie subhumérale externe, la bien plus forte ponctuation des pygidia, etc.

Brièvement ovale, large, convexe, noir, luisant. Mandibules creusées, rebordées extérieurement et intérieurement, portant au côté interne une large lame bidentée; labre en bourrelet transversal; carène clypeo-frontale en relief, presque droite en devant, formant, de chaque côté avec les stries supraorbitales, des angles presque droits; front finement ponctué en avant et portant, derrière la carène, une double dépression plus ou moins sensible.

Pronotum transversal, lisse sur le disque, peu rétréci en avant, fortement échancré derrière la tête, avec les angles abaissés, très avancés; strie marginale entière sur les côtés, interrompue derrière chaque oeil; deux stries latérales parallèles: l'interne complète et l'externe entière sur les côtés, mais cessant après avoir contourné l'angle antérieur; entre les deux stries latérales, l'intervalle est finement ponctué dans sa partie antérieure.

Elytres transversaux pris ensemble, imponctués; stries externes profondes: subhumérale externe basale, largement arquée à l'épaule; subhumérale interne et trois dorsales entières; qua-

trième apicale, beaucoup plus fine, n'atteignant pas le milieu; cinquième obsolète, indiquée par quelques points apicaux; suturale subapicale, arrivant au milieu, mais ne partant pas tout à fait de l'apex. Epipleures bistriés.

Propygidium couvert de points très gros et serrés à la base, plus petits au sommet; pygidium ponctué de même, avec l'extrême sommet lisse.

Mentonnière arrondie, rebordée, finement ponctuée; sterna lisses; le mesosternum droit en devant, entièrement rebordé.

Tibias antérieurs armés de trois dents, dont l'apicale est très grande, un peu creusée en dessous, convexe en dessus, curvilinéaire en avant.

Long. 8 mill.

Angola: Alto Cubal Chimbassi, X-1953, 3 exemplaires (Schmiedeknecht leg.). Type dans Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates à Munich, un paratype dans la même collection et un dans la mienne.

2. — *Anaglymma tanganyikai* nov. sp.

Ovale, déprimé, d'un brun rouge ferrugineux, luisant; antennes et pattes concolores. Tête un peu concave au milieu; front finement pointillé, bordé de chaque côté et en arrière d'une strie bien marquée.

Pronotum peu transversal, rétréci en avant, superficiellement, éparsément et irrégulièrement ponctué, les points visibles surtout sur les côtés. Derrière chaque oeil se trouve une légère impression qui, décomposée ou non, s'étend sur le disque, de sorte que les bords latéraux du prothorax paraissent légèrement surélevés.

Elytres imperceptiblement pointillés, ponctués à l'apex sur une bande transversale, les points remontant peu dans les interstries; stries fines, nettes, équidistantes, parallèles: subhumérale longue, partant de la base et raccourcie peu avant le sommet; humérale très petite, basale, difficile à voir; trois premières dorsales entières, à peine sinueuses; quatrième un peu raccourcie en arrière, au niveau de la zone subapicale ponctuée; cinquième et suturale médianes, également écourtées en avant et en arrière.

Propygidium et pygidium densément et fortement ponctués, chagrinés entre les points; le propygidium est légèrement déprimé de chaque côté; le pygidium est bombé au milieu.

Prosternum échancré à la base, à stries divergentes en avant; mentonnière pointillée, non rebordée. Mesosternum lisse, bisinué au bord antérieur, portant une strie transversale régulièrement arquée, rapprochée du bord. Metasternum lisse, strié latéralement; les sutures transversale et longitudinale visibles seulement par transparence et sous un certain jour. Premier segment de l'abdomen avec deux stries longitudinales.

Tibias antérieurs étroits, garnis en dehors d'un denticule médian et de trois petites épines au dernier quart.

Long. à peine 2 mill.

Tanganyika, trois exemplaires étiquetés „Usembara-Berge, Sakarani 1500 m., 9-XI-1952, lg. Lindemann und Pavlitzki“. Type et paratype au Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, un paratype dans ma collection.

Sa couleur, sa petite taille, sa forme en ovale plus allongé, sa striation elytrale, etc. ne permettent de le confondre avec aucune espèce d'*Anaglymma* du groupe ne portant qu'une strie suturale simple.

3. — *Pachyeraerus bicoloratus* nov. sp.

En ovale allongé, convexe, brillant; tête, pronotum, pygidia et dessous noirs; antennes et pattes rousses.

Tête pointillée; front plan, épistome légèrement déprimé, bordé d'une strie entière, bien marquée.

Pronotum plus large que long, portant une double ponctuation: un pointillé très fin avec des points forts et espacés, qui paraissent plus forts sur les côtés et en avant; strie marginale largement interrompue derrière la tête.

Elytres de la largeur du pronotum à la base, presque deux fois plus longs que lui, arrondis au bout, formant un angle sutural laissant voir une partie du dernier tergite; finement pointillés avec des gros points espacés à l'apex; strie subhumérale externe apicale, atteignant le milieu; cinq dorsales et une suturale, la première longue mais un peu abrégée en arrière, les 2ème, 3ème et 4ème plus longues, presque entières, ne cessant dans la partie apicale qu'au niveau de l'étroite bande de gros points; 5ème apicale, jusqu'au milieu; suturale subapicale s'étendant en avant jusqu'au milieu et cessant un peu avant l'apex en arrière; strie marginale fine, mais bien distincte; une strie épipleurale.

Propygidium couvert de points ronds, ocellés, avec, dans les intervalles, un pointillé très fin; pygidium ponctué de même, plus irrégulièrement, presque lisse au bout.

Carène prosternale portant deux stries longues et parallèles; mentonnière arrondie, marquée d'une ponctuation nette, plus forte latéralement, séparée de la carène par une suture transversale. Mesosternum en pointe avancée, bordé d'une strie entière, qui suit le bord.

Tibias antérieurs armés de cinq dents, les deux de la base très petites, la dernière bifide.

Long. 3,5 mill. (tête et pygidia exclus); larg. 2,25 mill.

S. W. Africa, Abachaus, Otjiwarongo district, diverses dates de 1950 à 1959, 8 exemplaires (G. H o b o h m) et 1 exemplaire (C. K o c h). Type et paratypes dans Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, paratypes dans ma collection.

Se place près de *P. pluricolor* Desbordes, dont il se distingue par sa forme plus large, sa ponctuation un peu plus forte, sa striation élytrale avec les 5ème et 6ème stries n'atteignant pas le milieu, la dentelure de ses tibias antérieurs et aussi par le contour de ses élytres, qui, arrondis au bout, forment à la suture un angle bien marqué.

4. — *Pachycaerus philippinensis* nov. sp.

Ovale, bombé, noir, luisant; pattes, antennes, mandibules, labre et, bien souvent aussi, angles antérieurs du pronotum roux.

Tête pointillée, convexe, avec une légère dépression sur le vertex au milieu; strie frontale largement interrompue en devant, reliée en angle obtus de chaque côté à la strie supraorbitale; une fine strie formant un arc sur le clypeus en avant.

Pronotum plus large que long, profondément échancré derrière la tête; l'échancrure un peu bisinueuse, avec les angles abaissés, aigus, fort avancés; largement arqué à la base avec un point allongé antéscutellaire; couvert d'une ponctuation double; strie marginale entière.

Elytres un peu transversaux pris ensemble, de la largeur du pronotum à la base, faiblement rétrécis en arrière, arrondis au bout largement, extérieurement et intérieurement, de façon à former un angle sutural qui découvre une portion en triangle transverse du tergite; ponctués à l'apex, la ponctuation localisée, ne remontant pas dans les interstries externes, remontant

à peine contre la suture; stries fortement crénelées: subhumérale externe complète, contournant l'apex jusqu'à l'angle sutural; subhumérale interne s'étendant du milieu jusqu'à une courte distance de l'extrémité, disjointe de l'humérale, qui est oblique; quatre premières dorsales entières, cinquième apicale jusqu'au milieu; suturale entière, tournée en crochet, à la base, vers le cinquième, qui est surmontée d'un point appendiculaire basal; strie marginale fine; épipleures pointillés, unistriés.

Propygidium transversal, couvert d'une ponctuation double; pygidium perpendiculaire, invisible de dessus, éparsément et finement ponctué.

Prosternum en carène, échancré à la base; les stries longues, d'abord convergeant entre les hanches, puis subparallèles; mentonnière finement ponctué sur fond alutacé, émarginée en devant, rebordée, séparée du prosternum par une suture; mesosternum acuminé au milieu, finement ponctué, portant une strie marginale entière. Metasternum ponctué finement avec une ligne longitudinale au milieu; suture mesometasternale droite.

Tibias antérieurs élargis, armés de cinq dents, les deux de la base très petites.

Long. 3 mill. (tête et pygidia exclus); larg. 2,5 mill.

Luzon, Rizal, Montalban (leg. W. Schultze), 22 exemplaires. Type et paratypes au Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates à Munich, paratypes aussi dans ma collection.

Anschrift des Verfassers:

Jean Théron, 41, rue Séguier, Nîmes, Frankreich.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [053](#)

Autor(en)/Author(s): Therond J.

Artikel/Article: [Quatre Histeridae nouveaux dans Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates. 108-112](#)