

Diagnosen neuer Coleopteren aus dem innern Afrika.

Von E. v. Harold.

Meiner Bearbeitung der von den Herren Pogge und Hohmeyer im inneren Guinea, insbesondere bei Kábebe, gesammelten Coleopteren, welche für die Verhandlungen der Leopoldina Carolina in Aussicht genommen ist, schicke ich heute, da die Beigabe von Tafeln voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, nachstehende Diagnosen voraus.

1. *Cicindela Poggei*: Opaca, nigra, capite thoraceque interdum subcupreis, scutello medio albo-piloso, elytris plaga utriusque ante medium transverso-obliqua maeulaque minore marginali ante apicem albis; labio nigro, margine lineaque media flavis. — Long. 26 mill. Proxima accedit *C. rufomarginata*, quae autem signaturis elytrorum differt.

2. *Cicindela muata*: Parallelia, opaca, supra nigra, elytris vitta angusta laterali, longe ante apicem ramo obliquo instructa, vitta suturali antice nonnihil latiore striolaque utrinque basali flavis. — Long. 16 mill. Proximae accedunt *C. lugubris*, *cincta* et *Deyrollei*.

3. *Anthia calida*: Nigra, subdepressa, thoracis margine laterali elytrorumque limbo albido-pubescentibus, capite thoraceque fortiter rugoso-punctatis, hoc in ♂ angulis posticis dentato-productis, elytris postice truncatis, interstitiis leviter convexis. — Long. 32—36 mill. Proxima accedit *A. maxillosa*, quae statura convexa elytrisque non truncatis omnino diversa.

4. *Anthia crudelis*: Nigra, thorace laevi, medio linea longitudinali impressa, elytris elongato-ovalibus, limbo marginali flavo-pubescente, punctato-striatis, interstitiis modice convexis, apice et ad latera tantum punctis rarissimis adspersis. — Long. 40—50 mill. Proxima fere accedit *A. Fornasinii*, quae thorace rude punctato diversa.

5. *Graphipterus laticollis*: Niger, capite vitta utrinque flavo-pubescente, thorace brevi, transverso, lateribus medio angulato-rotundatis, ochraceo-pubescente, vitta media alteraque breviore laterali denudatis, elytris fusco-pubescentibus, sutura late nigro-tomentosa, margine vittisque tribus, interna nonnihil latiore, albido-pubescentibus. — Long. 17—21 mill. Proximus fere accedit *G. vittatus*, at thorace lateribus non angulatis omnino discrepans.

6. *Eudema muata*: Nigrum, thorace orbiculari, elytris ovalibus, utriusque maculis duabus aurantiacis, una transversa pone basin, altera ante apicem. — Long. 19 mill. Proximum accedit *E. pretiosum*, thorace latiore maculaque a basi elytrorum magis remota diversum.

7. *Tefflus muata*: Niger, thorace valde rugoso, lateribus medio angulato-rotundatis, postice valde angustatis, angulis posticis rectis. — Long. 36—37 mill. Species propter angulos posticos thoracis rectos omnino distincta.

8. *Cybister semirugosus*: Sat convexus, piceus, thoracis margine laterali, epipleuris cum pectoris lateribus pedibusque piceo-rufis, elytris antice laevibus, postice transversim dense subtiliter rugulatis. — Long. 37 mill.

9. *Tinotarsus Poggei*: Ater, subnitidus, thorace dense punctulato, ad latera striolato, elytris fortius et dense subrugose punctatis, stria humerali et dorsalibus septem extus carinatis, interioribus antico abbreviatis, stria suturali antice abbreviata; prosterno antice lobato-producto, lobo medio emarginato, mesosterno margine antico sub-rotundato, integro. — Long. 11.5 mill.

10. *Nigidius perforatus*: Piceus, nitidus, thorace ad latera fortiter punctato, medio laevi, longitudinaliter foveato, ad angulos anticos profunde foveolato-exciso, angulo posteriore spinose porrecto, elytrorum intersticiis subtilissime et vix perspicue punctulatis. — Long. 20 mill. Proximi accedunt *N. grandis* et *cribricollis*.

11. *Nigidius laevigatus*: Piceus, subcylindricus, genis extus non sinuatis, thorace medio longitudinaliter foveato, laevissimo, ad latera tantum parce punctulato, angulis anticis integris, elytris sulcatis, sulcis obsolete punctatis, intersticiis laevibus. — Long. 17 mill.

12. *Passalus duplicatus*: Deplanatus, antennarum capitulo triarticulato, clypei margine quinquedentato, thorace lateribns fortiter punctato, metasterno medio punctato, elytris in striis serie punctorum duplici, tibiis intermediis denticulis duobus approximatis. — Long. 26 mill.

13. *Scarabaeus paganus*: Sat convexus, viridis, thorace dense rugose punctato, medio linea laevigata, margine laterali postice non crenato, elytris subopacis, interstitiis punctis magnis parum profundis sat dense et subseriatim adspersis, carina marginali integra. — Long. 38 mill.

14. *Heliocopris Samson*: Statura *H. Pirmal*, capite lateribus postice ante oculos non angulatis, subparallelis, vertice medio carina transversa elevata, thorace rugoso, dorso elevato utrinque dentato, medio lobo brevi tridentato, angulis anticis valde spinosis, elytris intra marginem et carinam lateralem iterum carinatis. ♂. — Long. 55 mill.

15. *Catharsius dux*: Ater, parum nitidus, capite antice rotundato, fronte carina transversa breviter tridentata, thorace aequaliter dense granulato, ante medium carina transversa, elytris coriaceis, subtiliter striatis. ♀. — Long. 38—40 mill.

16. *Catharsius peregrinus*: Picens, nitidus, dorso subdeplanatus, clypeo obtuse bidentato, vertice breviter cornuto, thorace lato, disco laevi, antice obtuse bituberculato, elytris laevibus, subtiliter striatis, tibiis anticis tridentatis, margine omnino integro. — Long. 25 mill.

17. *Onthophagus extensus*: Viridi-metallicus, elytris badiis, dense punctulatis, interstitiis 3 et 5 distincte altioribns, antennis rufo-testaceis. Mas: Cornu frontali longissimo, leviter recurvo, thorace antice utrinque pone angulos laminato-dentato. — Long. 12—13 mill. Proximus accedit *O. lamista*.

18. *Rhopaea pruinosa*: Fusca, supra pruinosa, thorace punctato, margine laterali crenulato, elytris obsolete bicostatis, pilis squamiformibus parvis et raris irregulariter adspersis, pectore flavo-pubescente, abdome nudo, punctato. — Long. 26 mill.

19. *Camenta Westermanni*: Nitida, rufo-picea vel castanea, capite transversim tricarinato, labio profunde emarginato, thorace dense punctulato, linea longitudinali impressa, elytris dense punctatis, sub-

rugulosis, non striatis, antennis in ♂ 7-, in ♀ 6-lamellatis. — Long. 20 mill.

20. *Cyclomera rugipennis*: Elongato-oblonga, castanea, thoracis basi fulvo-ciliata, corpore subtus longe flavo-setoso, abdomine nudiusculo, clypeo rotundato, concavo, a fronte rugose punctata carina diviso, elytris rugulosis, vix striatis, antennis 10-articulatis, clava trifoliata, tibiis posticis crassis, carina acuta transversa, tarsis, praecipue intermediiis, elongatis. — Long. 30 mill.

21. *Anomala interna*: Rufo-testacea, capite antice, thorace postice elytrisque late ad suturam et ad marginem apicalem rufo-piceis, pedibus testaceis, tibiis tarsisque piceis. — Long. 17 mill.

22. *Popillia princeps*: Omnino aurato-viridis, tarsis cyaneo-nigris, elytris stria suturali alteraque discoidali geminata exceptis sat irregulariter punctatis, pygidio basi utrinque macula alba. — Long. 16—19 mill.

23. *Popillia serena*: Viridis, elytris sat regulariter striato-punctatis, pygidio basi albo-bimaculato, tarsis aeneo-nigris. — Long. 13 mill.

24. *Phileurus Poggei*: Convexus, subcylindricus, fronte tuberculis duobus parvulis, thorace margine antice medio tuberculato, dorso antice impresso et usque ad basin fere sulcato, elytris striato-punctatis, tibiis anticis quadridentatis, posticis carinis tribus transversis. — Long. 28—30 mill.

25. *Fornasinius peregrinus*: Piceus, thorace elytrisque fuscorufescens, illo lateribus anguste albomarginato, his seriatim maculis parvis numerosis albis ornatis, scutello lateribus sulcatis albomarginatis, baseos latitudine longitudine aequali, tibiis anticis in utroque sexu tridentatis. Mas: Clypeo cornu e lateribus subcompresso, apice dilatato et tridentato, postice basi in verticem transeunte. — Long. 50 mill. Proximus accedit *F. (Goliathinus) insignis* Bert., at scutello angustiore et clypei cornu denticulo tertio medio deficiente imprimis diversus.

26. *Tmesorrhina Barthi*: Prasina, e latere visa griseo-coeruleo-scens, clypeo emarginato. Mas: Tibiis anticis bidentatis, femoribus

posticis valde incrassatis, margine superiore arcuato. Fem.: Tibiis anticis tridentatis. — Long. 30—33 mill. Proxima accedit *T. concolor*, femoribus in ♂ multo gracilioribus sicut et colore omnino diversa.

27. *Heterorrhina mutica*: Laete viridis, elytris plus minusve testaceo-auratis, subtiliter punctato-striatis, pedibus omnino viridibus, clypei margine reflexo rotundato, medio non lobato. — Long. 20—22 mill. Proxima accedit *H. africana*, at clypei margine medio breviter lobato-producto diversa.

28. *Heterorrhina picturata*: Oblongo-quadrata, capite antice fusco-rufo, postice piceo, thorace rufo-testaceo, medio rufo et nigro-trivittato, elytris testaceis, plaga suturali, apice, macula humerali alteraque apicali rufo-piceis, pedibus, processu mesosterni marginibusque segmentorum abdominalium rufis. — Long. 18 mill.

29. *Heterorrhina subaenea*: Capite piceo vel rufo-piceo, thorace leviter virescente, ferrugineo, margine laterali vittisque duabus interdum confluentibus piceis, scutello laevi, aeneo-piceo, elytris flavis, vase punctatis, sutura, macula humerali apiceque piceis, pygidio rufo, corpore subtus rufo-castaneo, nigro-variegato, tibiis tarsisque piceis. Capite tibiisque anticis in utroque sexu muticis. — Long. 20—24 mill. Simulat *H. umbonatam*, at capite latiore et clypeo truncato inter alia valde diversa.

30. *Oxythyrea cognata*: Opaca, capite ferrugineo, viridi-aeneo suffuso, thorace testaceo, maculis duabus discoidalibus et anticis duabus, medio longitudinaliter divisis, viridibus, elytris viridibus, parce albo-guttatis, gutta alba callo apicali apposita. — Long. 10 mill. Si-millima *O. lunatae*, thoracis maculis medio separatis guttaque ad collum apicalem discedens.

31. *Cetonia frontalis*: Corpore subtus cum pedibus testaceo, supra ut in *C. sinuata*, cui simillima, fuscoplagiata, clypei lateribus et fascia transversa verticali testaceis imprimis dignoscenda. — Long. 32—36 mill.

32. *Cetonia Poggei*: Opaca, fusco-nigra, thoracis margine laterali anguste elytrisque rufotestaceis, his plaga magna postmediana

discoidali fusca, antice oblique usque ad scutellum producta. — Long. 23 mill.

33. *Goniochilus*: n. g. corpore supra longitudinaliter sulcato, mandibulis parte externa cornea elongata, filiformi, interna membranacea, maxillis mala externa cornea, apice brevissime dentata, penicillata; mesosterno inter coxas angustissimo; juxta gen. *Hoplostomus*.

33. *G. rufiventris*: Niger, nitidus, thorace elytrisque interdum vitta piceo-rufa, subtus niger, abdomine et pygidio fusco-rufis; elytris juxta suturam late profunde sulcatis. — Long. 21—22 mill.

34. *Goniochilus bicolor*: Capite nigro, thorace rufo-testaceo, anguste nigro-limbato, scutello elytrisque rufo-testaceis, his sutura limboque laterali, apice latius, nigris, corpore subtus cum pedibus omnino nigro. — Long. 21 mill. Etsi omnino aliter coloratus, praecedentis forsan tantum varietas.

35. *Sternocera Iris*: Capite thoraceque nigro-aeneis, hoc minus dense inaequaliter punctato, elytris obscure viridi-vel aurato-aeneis, vittis tribus purpurascensibus, duabus anticis valde obliquis et ad suturam confluentibus, tertia laterali ante apicem. — Long. 30—40 mill. Species colore insignis.

36. *Sternocera morio*: Nigra, subaenescens, capite thoraceque parce albido-pilosus, elytris foveis utrinque dñabus basalibus parum profundis vittulaque postica marginali albido-pubescentibus. — Long. 34 mill. Proximae accedunt *St. luctifera* et *funebris*.

37. *Chrysaspis cuneata*: Supra aenea, subtus anrato-cuprea, thorace dorso deplanato, dense punctato, lateribus ante angulos posticos vix sinuatis, mesosterno plano dense punctato. — Long. 50 mill.

38. *Steraspis calida*: Supra viridis, elytris purpureo-limbatis, thoracis vitta media marginaque laterali cyaneis, subtus coeruleo-viridis, abdomine dense et fortiter punetato, longius parum dense villosa. — Long. 35—38 mill. Proxima accedit *St. ambigua* Boh.

39. *Psiloptera cylindrica*: Elongata, subcylindrica, fusco-aenea, thorace absque areis laevibus, elytris punctato-striatis, interstitiis

planiusculis, 3, 5, 7 et 9 punctis acervatis obsitis, reliquis parce subseriatim punctatis. — Long. 29 – 31 mill. Proxima accedit *P. rugulosa*.

40. *Psiloptera erosa*: Obscure aenea, thorace rude punctato, areis duabus dorsalibus et antico-lateralibus minus distinctis laevibus, elytris sat dense punctatis et leviter subelevato-tessellatis, margine laterali sub humeros scabroso. — Long. 29 mill. Proxima *Ps. suspecta*, at diversa colore metallico, thorace lateraliter foveato.

41. *Psiloptera muata*: Aenea, elytris viridi-aeneis, subcyanescentibus et leviter inauratis, thorace rugoso, lateribus postice rectis, elytris fortiter punctato-striatis, interstitiis planis, punctatis, lateralibus rugulosis, corpore subtus cum pedibus purpureo. — Long. 27 mill. Proximae accedunt *Ps. limbalis* et *piperata*.

42. *Chrysodema fugax*: Elongata, subaurato-viridiaenea, subtus laetius viridiaenea, elytris valde punctato-striatis, interstitiis leviter convexis, quinto apicem versus altiore, ibidem cum opposito coniuncto, margine laterali postice denticulato. — Long. 26 mill. Proxima accedit *Ch. chrysochlora*.

43. *Belionota ritticollis*: Elongata, depressa, capite thoraceque aeneis, hoc medio vitta cyanea, elytris aeneo-virescentibus, e latere visis subcupreis, corpore subtus aeneo, tarsis, segmentis abdominalibus margine ultimoque apice cyaneis. — Long. 30 mill. Proxima accedit *B. chrysotis* Illig.

44. *Chrysobothris fatalis*: Obscure aenea, subtus purpurea, thorace subtiliter punctato, lateribus strigulosis, elytris dense punctulatis, leviter quadricostatis foveolaque submarginali post medium parum profunda. — Long. 19 mill.

45. *Lycoreus figuratus*: Piceus, elytris rufo-piceis, capite thoraceque flavo-tomentosis, hoc medio carinato et macula utrinque oblonga fusca carinae approximata, elytris tomentose maculatis, fascia denudata media maculisque duabus ante apicem minus distinctis, antennis piceis, pedibus pectoreque rufescensibus. — Long. 23 mill.

46. *Pantolamprus rufipes*: Cyaneus, pedibus rufis, tarsis nigris,

thorace parce et subtilissime, antice tantum ad latera fortius punctato, basi ad receptionem scutelli profunde emarginato. — Long. 24 mill. Proximus accedit *P. perpulcher*, qui autem multo minor et thorace fortius punctato discedit.

47. *Dicronychus tibialis*: Elongatus, postice attenuatus, fusco-rufescens, breviter flavo-pubescent, fronte inter oculos profunde foveolata, tibiis omnibus, imprimis anticus, dilatatis. — Long. 29—31 mill.

48. *Melyris apicalis*: Viridis vel cyaneo-viridis, pedibus et abdominis apice rufis. — Long. 7.5—9.5 mill. Proxima accedit *M. ruficentris*, quae autem abdomine omnino rufo praeter alia discedit.

49. *Psammodes infernalis*: Niger, opacus, thorace dense rugoso-punctato, elytris amplis, dilatato-ovalibus, obsolete grosse rugatis, non costatis. — Long. 33—38 mill. Proximus accedit *Ps. coriaceus*, qui autem differt metatarso multo breviore et thorace non rugoso.

50. *Psammodes punctipennis*: Elongato-ovalis, niger, subnitidus, thorace densissime subrugose punctato, elytris punctulatis, plus minusve, evidenter undulato-rugulatis. — Long. 30 mill.

51. *Psammodes rufipes*: Subelongato-ovalis, nigro-piceus, interdum obscure rufo-piceus, antennis pedibusque plus minusve dilute rufis, thorace parce subtiliter punctulato, elytris subnitidis, parce obsolete punctulatis, in ♂ abdominis segmentis 1—3, hoc obsoletius, medio rufosetosis. — Long. 31—35 mill. Proximus accedit *Ps. rotundicollis*.

52. *Psammodes glabratus*: Nitidus, aterrimus, antennis pedibusque rufo-piceis, thorace valde convexo, subtiliter punctulato, elytris obsolete longitudinaliter elevato-undulatis, apice explanato-productis et ibidem vase granulatis. — Long. 30 mill. Proximus fere accedit *Ps. Pierreti*.

53. *Psammodes mutata*: Aterrimus, nitidus, thorace convexo sublaevi, elytris apice deplanato-productis, postice et ad latera fortiter tuberculatis, disco subsulcatis et leviter deplanatis. — Long. 28—32 mill. Proximus *Ps. Pierreti*.

54. *Psammodes subaeneus*: Angustato-ovalis, niger, elytris

obsolete undulato-rugatis leviter subaeneis, thorace dense, ad latera rugose punctato, margine clytrorum ad humeros reflexo. — Long. 20 mill. Proximus accedit *Ps. vicinus*, at antennarum articulis apicalibus multo longioribus discedens.

55. *Odontopus regalis*: Subopacus, atro-violaceus, elytris laetius purpureo-violaceis, subtiliter ad latera nonnihil densius punctatis, corpore subtus cum pedibus antennisque nigro. — Long. 33—34 mill. Species elytris subtiliter tantum punctulatis insignis.

56. *Pyenocerus exaratus*: Elongatus, subcylindricus, nigroviridiaeneus, thorace minus nitido, subtilissime punctulato, elytris sulcatis, sulcis crenato-punctatis, lateralibus obsoletis, interstitiis costatis, femoribus omnibus apice bidentatis, dente uno in margine superiore, altero in inferiore posito. — Long. 28—30 mill.

57. *Aspidosternum antiquum*: Obscure aeneum, thorace transverso lateribus rotundatis, elytris fortiter et subrugoso punctatis, leviter costatis, tibiis omnibus apice leviter incurvis, femoribus apice breviter bidentatis. — Long. 28 mill.

58. *Aspidosternum sumptuosum*: Parce villosum, cyaneum, elytris viridi-aeneis, fortiter, dorso biseriatim punctatis, interstitiis leviter elevatis, corpore subtus obscure aeneo, antennis pedibusqne nigro-cyaneis. — Long. 23 mill.

59. *Eupezus brevicollis*: Piceus, opacus, thorace sat dense punctulato parum convexo, longitudine duplo latiore, elytris obsoletissime punctulato-striatis; interstitiis planis. Mas: Tibiis anticis et mediis densissime, anticis multo brevius, intus aurato-villosis, abdominis segmentis 3 et 4 in medio marginis posterioris bituberculatis, quinto apice rotundato. — Long. 24—27 mill.

60. *Anomalipus asperulatus*: Nigro-fuscus, opacus, dorso deplanatus, thorace dense ruguloso punctato, medio areis duabus parvis laevibus, elytris dense asperato-punctulatis, obsolete substriatis, interstitiis transversim obsolete undulato-impressis. — Long. 22 mill.

61. *Praogenia procera*: Aurato-viridis, nitidissima, corpore subtus rufo-piceo, pedibus rufo-testaceis, femorum apice, tibiis ultra medium tarsisque nigris. — Long. 26 mill.

62. *Strongylium Poggei*: Obscure viridi-aeneum, pedibus nigro-cyanescens, thorace transverso sat dense punctato, linea marginali antica medio retrorsum angulata, elytris parallelis, crenato-punctato striatis, punctis apice minoribus at distinctis. — Long. 27—29 mill. Proximum *St. aeratum*, at multo minus.

63. *Strongylium muata*: Obscure viridi-aeneum, pedibus nigro-cyanescens, thorace longitudine vix latiore, subtiliter parum dense punctulato, elytris fortiter striatis, striis medio-fortiter, basi subtilius, apice omnino obsolete punctatis. — Long. 30 mill.

64. *Strongylium internum*: Obscure viridi-aeneum, subitus cyanescens, pedibus obscure cyaneis, thorace transverso, dense et fortiter punctato, elytris crenato-striatis, interstitiis convexis, evidenter punctulatis. — Long. 18 mill.

65. *Strongylium luridipenne*: Cyaneum, elytris sordide rufo-badiis, ad latera subaenescens, fortiter, etiam apice distincte, crenato-striatis, thorace dense rude punctato. — Long. 16.5 mill. *Juxta cyanipes* F. et *caffrum* Mäkl.

66. *Bruchus* (Geoffr.) *muata*: Niger, antennis rufo-testaceis, articulis 1 et 2 piceis et apice rufescentibus, elytris flavis, basi juxta scutellum, fasciis duabus plerumque in maculis solutis, apiceque nigris. — Long. 19—22 mill.

67. *Bruchus* (Geoffr.) *internus*: Niger, antennis nigris, elytris rufo-testaceis, fasciis tribus nigris, 1 a basi longe remota, 2 post medianum, 3 ante apicem. — Long. 13—15 mill. Proximi accedunt *B. sanguinolentus* et *incertus*.

68. *Lytta atrocoerulea*: Supra opaca, omnino nigro-coerulea, capite thoraceque fortiter rugose punctatis, elytris dense granulato-punctatis, antennarum articulis apicem versus depressis, metasterno medio rufescente. — Long. 28 mill.

69. *Lytta episcopalis*: Obscure purpurea, subitus cum pedibus cyanea, thorace dense punctato, linea media longitudinali impressa, antennis apicem versus attenuatis. — Long. 24 mill.

70. *Eletica colorata*: Nigra, nitida, elytris testaceis, fascia

media apiceque nigris, leviter tricostatis, costa prima basali juxta scutellum brevissima. — Long. 26 mill.

71. *Mylabris* (Geoffr.) *muata*: Nigra, rotundato-quadrata, vertice longitudinaliter cristato, thorace brevi lateribus rotundatis, femoribus posticis valde incrassatis, tibiis posticis arcuatis, antennis late pectinatis, tarsis anticecum tibiarum apice obscure rufescensibus. — Long. 3.5 mill.

72. *Colpoderus forcipatus*: Piceus vel obscure rufo-piceus, thorace valde transverso, lateribus late explanatis, dorso minus convexo, elytris minus nitidis, tarsis posticis subtus medio longitudinaliter concavis et laevigatis. Mas: Mandibulis porrectis maximis, angulato-arcuatis; palpis longissimis. — Long. 36—40 mill. (sine mandib.)

73. *Colpoderus substriatus*: Piceus, fronte antice utrinque foveolata, vertice linea impressa longitudinali, thorace laevi, ante angulos posticos valde emarginato, elytris vage rugulosis, disco substriatis, intersticiis leviter convexit. ♀. — Long. 35 mill. (sine mandib.).

74. *Aulacopus forciceps*: Piceus, nitidus, fronte longitudinaliter late et profunde sulcata, thorace dorso depresso, margine lateraliter sat deflexo, vage crenulato, elytris quadricostatis, interpositis costis alteris brevioribus. — Long. 32 mill. Proximus *A. (Navosomopsis) Feisthameli*.

75. *Pachydissus elongatus*: Obscure rufo-piceus, griseo-tomentosus, antennarum articulo tertio primo vix longiore, tibiis posticis leviter curvatis. — Long. 40 mill. Proximus *P. natalensis*, qui inter alia tibiis non curvatis differt.

76. *Ploecoderus formosus*: Niger, thorace transversim irregulariter valde rugato, elytris fuseo-violaceis, dense subtilissime punctulatis, brevissime griseo-pubescentibus, apice emarginatis, pedibus antennarumque articulo primo rufo-badiis. — Long. 34 mill. *P. vidripennis* differt antennis gracilibus elytrisque multo fortius punctatis.

77. *Ptycholuemus latirittis*: Niger, nitidus, vertice, thoracis lateribus maculaque media sublateraliter sicut et elytrorum vittis dñabus

flavo-aurato-sericeis. Valde affinis *P. Troberti*, qui autem vittis angustioribus minus flavis discedit.

78. *Prosopocera Poggei*: Fuscoferrugineo-tomentosa, thorace macula parvula utrinque basali et elytrorum utriusque tribus magnis, albis, una basali, secunda elongata media, tertia apicali; subtus metasterni lateribus et episternis albis. — Long. 30—34 mill. Quoad elytrorum, non thoracis, signaturam simillima *Anoplostetha lactator*, quae autem differt mesosterno non tuberculato.

79. *Anoplostetha bimaculata*: Fuscoferrugineo-tomentosa, elytris singulo macula media, extus latiore, alba, subtus thoracis pectorisque lateribus albis. — Long. 30 mill. *Prosopocera bipunctata* similis at macula nigra elytrorum et mesosterno tuberculato omnino diversa.

80. *Sternotomis consularis*: Nigra, signaturis metallico-viridibus notata: capite vitta frontali, oculari et fascia postica, thorace margine antieo fasciisque duabus, una media, altera ante basin, elytris fascia basali alteraque arcuata post basin, extus interrupta, praeterea utriusque octo, 3 marginalibus, prima transversa, majore, suturam nunquam attingente, tribus ad suturam, majore prima in medio, ultima anteapicali et extus hamata, macula in disco transversa longe post medium et punctulo apicali. — Long. 24—32 mill. Proxima accedit *Dubocagei*, quae differt fascia tertia elytrorum et puncto apicali in vittulam elongato.

81. *Tragocephala histrionica*: Capite nigro, macula frontali rotundata, linea verticali margineque postico utrinque ochraceis, thorace brevi, nigro, lateribus late ochraceis, extus ad basin albis, elytris testaceis ad marginem ochraceis, macula comuni media, striola humerali, fascia ante apicem valde irregulari, utrinque punctum album includente, margineque apicali nigris; subtus nigra, albo-variegata. — Long. 21 mill. Proxima accedit *T. formosa*, propter thoracem brevem, at inter alia corpore subtus nigro, abdomine tantum ochraceo-maculato, valde diversa.

82. *Tragocephala nigropunctata*: Fusco-ochracea, capite nigro-fasciato, thorace nigro-bivittato, elytrisque punctis in singulo 6 nigris, duobus humeralibus alterisque discoidalibus, uno medio altero ante

apicem; subtus griseo-tomentosa et testaceo-variegata, absque maculis nigris. — Long. 20 mill. Proxima *T. variegata*, quae autem omnino aliter colorata.

83. *Zographus ferox*: Niger, thorace margine antico albo, transversim rugato nec inter rugas punctato, elytris fascia utrinque abbreviata laterali ante medium, antennis articulis 4 basilibus nudis, reliquis albidocinereo-tomentosis; corpore subtus omnino nigro. — Long. 30—38 mill. *Z. aulicus* similis at thorace punctato et signaturis numerosis tomentosis paginae superioris et inferioris discedens.

84. *Ceroplesia Poggei*: Subnitida, nigro-subaenea, capite vittis duabus frontalibus maculaque genali, thoracis margine antico et postico elytrorumque maculis transversis irregularibus plus minusve inter se confluentibus, metasterni lateribus abdominisque maculis transversis pallide griseo-rufis; antennis basi valde approximatis. — Long. 27—30 mill.

85. *Nitocris leucostigma*: Capite thoraceque rufis, hoc subtus ad latera et ante scutellum albo, scutello albo, elytris nigris, macula communis post scutellum alba, corpore subtus nigro, albomaculato. — Long. 18 mill.

86. *Nitocris chrysostigma*: Capite nigro, labio rufotestaceo, thorace rufo-castaneo, spina laterali obtusa valida, elytris nigris, opacis, vitta brevi suturali aureo-tomentosa, corpore subtus cum pedibus testaceo-rubo, abdominis segmentis 2—4 basi nigrofasciatis. — Long. 24 mill.

87. *Megalodaena magnifica*: Elongata, picea, thorace macula annulari lateralii, elytris striola basali fascia que arcuata, altera semi-lunari ante apicem testaceis, apice rufobadio, corpore subtus nigro, pedibus abdominisque segmentis duobus ultimis rufo-badiis. — Long. 28—32 mill.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Münchener Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [002](#)

Autor(en)/Author(s): Harold Edgar Freiherr von

Artikel/Article: [Diagnosen neuer Coleopteren aus dem inneren Afrika. 99-111](#)