

Voyage
de **M. E. Steinheil**
à la Nouvelle Grenade.

Eumolpides

par

M. Ed. Lefèvre,

Membre des Sociétés entomologiques de France et de Belgique.

15. Mai 1878.

Chrysodina.

Baly. Journ. of Entom. 1864. II. p. 221.

Chr. laevigata (n. sp.): Rotundato-ovata, maxime convexa, cyanea, nitida, antennis nigris, articulis 3 basalibus obscure ferrugineis; capite punctulato, supra antennarum insertionem spatio laevi subcalloso utrinque instructo; prothorace laevi, impunctato, lateribus concinne reflexo-marginato; scutello laevissimo; elytris subtiliter striato-punctatis, interstitiis laevibus sed versus apicem et ad latera subelevatis, stria juxta marginem lateralem utrinque magis profunde impressa; corpore subtus viridi-aeneo, pedibus cyaneis, tarsis fascis. — Long. $3\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{2}$ mill.

Cañas.

Lamprosphaerus.

Baly. Ann. nat. Hist. 1859. p. 124.

1. *L. amabilis* (n. sp.): Subrotundato-ovatus, convexus, subtus viridi-aeneus, supra viridi-metallicus vel cupreo-aureo-micans, nitidus, labro sicut et palpis obscure brunneis, pedibus antennisque rufotestaceis, harum articulis 7^o. et 11^o. nigris; capite punctato, vertice magis minusve longitudinaliter sulcato; prothorace minutissime remote alutaceo, disperse punctulato; scutello laevi, apice subrotundato; elytris infra humeros late transversim impressis, substriato-punctatis, punctis intra impressionem majoribus et sensim versus apicem minoribus. — Long. $3\frac{1}{2}$ —4, lat. 2— $2\frac{1}{4}$ mill.

Copér.

2. *L. luctuosus* (n. sp.): E minoribus, breviter ovatus, subrotundatus, subtus niger, supra obscure cyaneus, nitidus, labro, palpis antennisque brunneo-testaceis, harum articulis quinque ultimis nigris; capite antice fortiter, postice subtilius punctato, vertice longitudinaliter sulcato; prothorace sat dense punctulato; scutello laevi; elytris sat fortiter substriato-punctatis, punctis infra humeros et ad latera majoribus, versus apicem autem subtilioribus, juxta marginem lateralem utrinque stria magis impressa instructis, humeris rotundatis, laevibus; pedibus duobus anticis obscure brunneis, quatuor posticis piceis. — Long 2, lat. $1\frac{1}{2}$ mill.

Muzo.

Nota.

Chapuis. Gen. Col. X. 1874. p. 240.

1. *N. pustulata* Harold. Col. Heft. XII. p. 62.

Columb. orient. (Winkler).

2. *N. challeca* (n. sp.): Ovalis, convexa, viridi-vel cupreo-aenea, nitida, antennis ferrugineis, articulis quinque ultimis cyaneo-nigris; capite dense fortiter punctato; prothorace subtilissime undique alutaceo, antice posticeque laevi, in medio disci remote disperse punctulato, punctis aciculatis; elytris infra humeros obsolete transversim impressis, regulariter seriatim subgeminato-punctatis, versus apicem sat fortiter punctato-striatis. — Long. 3— $3\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{2}$ —2 mill.

♀ Elytris infra humeros multo magis fortiter impressis, juxta impressionem tuberculis duobus parvis magis minusve elevatis, callo humerali ipso calleso.

San Carlos, Muzo, Medellin.

3. *N. ocañana* (n. sp.): Ovalis, convexa, cupreo-aenea vel aeneo-viridis, interdum saturate cyanea, nitida, antennis ferrugineis, apice magis minusve infuscatis; capite crebre sat fortiter punctato; prothorace dense subtiliter undique punctulato; elytris infra humeros vix perspicue transversim impressis, sat regulariter seriatim subgeminato-punctatis, versus apicem evidenter punctato-striatis, punctis ad latera majoribus; corpore subtus cum pedibus obscure viridi-aeneo, tibiis apice tarsisque ferrugineis. — Long. 3— $3\frac{1}{4}$, lat. 2— $2\frac{1}{4}$ mill.

♀ Elytris infra humeros magis evidenter transversim impressis,

ad latera pone medium tuberculo rotundato costulisque tribus abbreviatis, quarum externa magis elevata, instructis.

Ocaña (Landolt!).

4. *N. Landolti* (n. sp.): Ovalis, convexa, viridi-cyanea vel viridi-aenea, nitida, antennis ferrugineis, articulis quinque ultimis nigris; capite crebre fortiter punctato; prothorace dense undique subaequaliter punctulato, lateribus utrinque rotundatis; scutello laevi; elytris subtiliter seriatim subgeminato-punctulatis, ad latera et versus apicem fortius punctato-striatis, infra humeros transversim evidenter impressis, callo humerali ipso elongato, calloso; corpore subtus obscure viridi-aeneo, pedibus saturate rufo-brunneis, genubus nigricantibus. — Long. $3\frac{3}{4}$ —4, lat. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mill.

♀ Elytris infra humeros profunde transversim impressis, callo humerali ipso in cretam elevatam producto et infra impressionem tuberculo rotundato vel oblongo costisque duabus elevatis quarum interna obliqua, longitudinaliter instructis.

Ocaña (Landolt!).

5. *N. bogotana* Harold. Col. Heft. XII. p. 62.

Ibagué-Tapias, Fusagasugá. — Columb. orient. (Winkler!).

6. *N. scutellaris* (n. sp.): ♂ Ovalis, convexa, subtus viridi-aenea, supra cyanea, labro, antennis pedibusque rufo-testaceis; capite punctato, supra antennarum insertionem spatiis duobus subcallosis nitidissimis instructo; prothorace minutissime undique punctulato; scutello lato, subpentagono, laevi; elytris infra humeros vix perspicue transversim impressis, minute punctulatis, disco solo subnitido, lateribus utrinque late opacis. — Long. 4, lat. $2\frac{1}{2}$ mill.

♀ Invisa.

Ocaña (Landolt!).

7. *N. Winkleri* (n. sp.): Ovalis, viridi-aenea, nitida, antennis nigro-cyaneis, articulis 4 vel 5 basalibus rufis; capite grosse subconfluentem punctato; prothorace crebre undique punctato, punctis aciculatis, majoribus et minoribus intermixtis, lateribus utrinque rotundato, angulis anticis acutis; scutello sublaevi; elytris intra callum humeralem et infra humeros fortiter impressis, dorso sat regulariter seriatim subgeminato-punctatis, ad latera versus apicem fortius punc-

tato-striatis, interstitiis minutissime alutaceis; pedibus viridi-aeneis, nitidis, tarsis fuscis. — Long. 3—3 $\frac{1}{4}$, lat. 2 mill.

♀ Elytris ad latera costulatis, callo humerali utrinque in cretam satis elevatam producto, impressione basali profunda.

Columb. orient. (Winkler!). — Ubáque.

8. *N. virgulata* (n. sp.): Ovalis, convexa, subtus viridi-aenea, subopaca, supra viridi-metallica, nitida, palpis antennisque fuscis; capite sat crebre punctato; prothorace disperse inaequaliter punctulato, ad latera sublaevi, lateribus utrinque medio ampliatis ibique angulatis; elytris fortius inordinatim punctatis, callo humerali elevato, impressione basali nulla; pedibus viridi-metallicis, tarsis nigro-fuscis. — Long. 3—3 $\frac{1}{2}$, lat. 1 $\frac{3}{4}$ —2 mill.

♀ Elytris crebrius punctatis, punctis versus apicem sensim minoribus, infra medium ad latera tuberculo oblongo instructis, callo humerali in cretam satis elevatam producto, impressione basali obsoleta.

Columb. orient. (Winkler!). — Fusagasugá.

9. *N. callosa* (n. sp.): Ovato-elongata, convexa, viridi-vel cupreo-aenea, nitida, antennis nigris articularibus 3 basalibus obscure rufescentibus; capite antice punctato, vertice sublaevi; prothorace sat crebre magis minusve fortiter punctato, lateribus utrinque rotundato; elytris in medio disci et ad latera inordinatim, prope suturam subgeminatim punctatis, apice summo callosis ibique punctis rarioribus et seriebus simplicibus, callo humerali elevato, laevi, impressione basali fere nulla; corpore subtus viridi-aeneo, subopaco, pedibus aeneo-cupreis, nitidis. — Long. 3—3 $\frac{1}{2}$, lat. 1 $\frac{3}{4}$ —2 mill.

♀ Elytris ad latera infra medium tuberculis duobus oblongis parum elevatis instructis.

Ubáque.

10. *N. medellina* (n. sp.): Ovalis, subtus viridi-aenea, supra cupreo-aenea, nitida, antennis pedibusque fulvo-testaceis; capite crebre sat fortiter punctato; prothorace disperse undique punctulato, punctis aciculatis; scutello laevi; elytris basi subtilissime punctulatis, ad latera et versus apicem distincte et fortius punctato-striatis, interstitiis vix elevatis. — Long. 2 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{3}{4}$, lat. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ mill.

♀ Elytris intus pone callum humeralem tuberculis 2 vel 3 parvis parum elevatis.

Medellin, Ambalema, Muzo.

11. *N. aurulenta* Lef. Rev. et mag. de zool. 1876. p. 284.

Ubáque.

12. *N. modesta* (n. sp.): Ovalis, aenea, nitidula, antennis rufotestaceis, apice summo paululum infuscatis; capite punctato; prothorace magis minusve opaco, disperse minute punctulato; scutello laevi, apice subrotundato; elytris nitidis, dorso leviter, ad latera et versus apicem magis fortiter, substriato-punctatis, impressione basali obsoleta; pedibus viridi-aeneis, tibiis apice tarsisque obscure rufotestaceis. — Long. $2\frac{3}{4}$ — $3\frac{1}{4}$, lat. $1\frac{1}{2}$ —2 mill.

♀ Elytris infra humeros magis evidenter impressis et infra impressionem tuberculo parvo subelevato instructis.

Colón, La Vega, Muzo.

13. *N. luteipes* (n. sp.): Ovalis, convexa, aeneo-viridis, nitida, pedibus antennisque luteis, harum articulis quatuor ultimis nigris; capite punctulato; prothorace in medio disci laxo, ad latera sat crebre, subtiliter punctato; scutello laevi; elytris subtilissime alutaceis, punctulatis, versus apicem regulariter punctato-striatis, infra humeros obsolete transversim impressis, callo humerali ipso elevato. — Long. $2\frac{1}{4}$, lat. 1 mill.

Ubáque.

14. *N. columbina* (n. sp.): Breviter ovata, convexa, aenea, nitida, antennis, tibiis tarsisque pallide fulvis, illis apice infuscatis; capite subtilissime undique alutaceo, in media fronte vage fossulato; prothorace laevi; elytris substriato-punctatis, punctis sensim versus apicem minoribus. — Long. $2\frac{1}{2}$ —3; lat. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mill.

Ambalema.

15. *N. atra* Harold. Col. Heft. XIII. p. 31.

Fusagasugá, San Carlos.

16. *N. rufipes* (n. sp.): Ovalis, convexa, viridi-aenea, nitidula, palpis, pedibus antennisque rufotestaceis, harum articulis quinque ultimis nigris; capite crebre sat fortiter punctato; prothorace in medio disci disperse, ad latera autem crebrius et magis aequaliter, punctato, antice et basi anguste laevi; elytris subtiliter inordinatim punctulatis,

prope suturam et versus apicem punctato-striatis, infra humeros evidenter transversim impressis, callo humerali ipso elevato. — Long. 3, lat. 2 mill.

♀ Invisa.

Medellin.

17. *N. peregrina* (n. sp.): Ovalis, convexa, subtus aenea, supra cyanea, interdum aenea, nitida, antennis ferrugineis, saepe apice nigro-infuscatis; capite dense fortiter punctato; prothorace subtiliter crebre punctulato; elytris infra humeros vage transversim impressis, sat fortiter punctatis, juxta suturam et versus apicem punctato-substriatis; femoribus cyaneis, tibiis tarsisque ferrugineis. — Long. $2\frac{1}{2}$ —3, lat. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mill.

La Vega, Amalfi, Muzo. — Ocaña (Landolt), Columb. orient. (Winkler!).

18. *N. lacta* (n. sp.): Breviter ovata, convexa, viridi-metallica, interdum viridi-coerulea, nitidissima, labro, antennis pedibusque laete fulvis; capite, prothorace sicut et elytris sat crebre punctatis, his versus apicem evidenter punctato-striatis. — Long. 2— $2\frac{1}{2}$, lat. 1— $1\frac{1}{4}$ mill.

Columb. orient. (Winkler!).

Agbalus.

Chapuis. Gen. Col. X. 1874. p. 242.

1. *A. plagiatus* (n. sp.): Suboblongo-ovalis, convexus, viridi-metallicus, nitidus, antennis nigris, articulis quatuor basalibus subtus obscure fulvis, labro piceo; capite punctato, inter oculos impresso; prothorace punctis aciculatis sat dense undique adperso; elytris magis fortiter lineatim punctatis, singulo plaga magna basali testacea, prope suturam attingente, transversim ornatis. — Long. 4— $4\frac{3}{4}$, lat. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mill.

♂ Primo tarsorum quatuor anticorum articulo valde dilatato; tibiis duobus posticis intus paulo ante apicem calcare valido armatis.

Var. β . Subtus cum pedibus cyaneus, supra viridi-metallicus, elytrorum plaga basali rufo-sanguinea. ♀

Var. γ . Paulo major, omnino nitide cyaneo-violaceus, elytrorum plaga basali rufo-testacea. ♂

Guayabál, Columb. orient. (Winkler!).

2. *A. chalybaeus* (n. sp.): Suboblongo-ovalis, convexus, subtus viridi-aeneus, supra cyaneus, nitidus, labro, palpis antennarumque basi piceis, his apice nigro-fuscis; capite antice fortiter punctato, vertice longitudinaliter sulcato; prothorace sat dense minute punctulato, lateribus utrinque reflexo-marginato ibique evidenter viridi-aeneo; scutello laevissimo; elytris regulariter lineatim punctatis, juxta suturam versus apicem unistriatis, infra humeros late transversim impressis, margine laterali utrinque viridi-aeneo; pedibus viridi-aeneis, tarsis piceis. — Long. 5, lat. 3 mill.

♂ Primo tarsorum quatuor anticorum articulo dilatato; tibiis duobus posticis intus calcare elongato, apice longe pubescente, armatis. San Carlos.

3. *A. aeneus* (n. sp.): Obovatus, convexus, subtus nigro-piceus, supra aeneus, nitidus, antennis obscure testaceis, articulis 5—7 nigricantibus; capite sat fortiter punctato; prothorace disco modice, ad latera crebrius remote punctulato; elytris infra humeros late sed parum profunde transversim impressis, subseriatim punctatis, punctis intra impressionem majoribus et sensim versus apicem minoribus; pedibus testaceis, femoribus magis minusve aeneo-reflexo-micantibus. — Long. $3\frac{1}{2}$, lat. 2 mill.

La Vega.

4. *A. rufimanus* (n. sp.): Praecedenti affinis, sed major. Obovatus, convexus, subtus piceus, supra metallico-aeneus, nitidus, antennis testaceis, articulis quinque ultimis nigro-infuscatis; capite punctulato; prothorace disco sat dense, ad latera minus crebre, disperse punctato; elytris multo fortius substriatim punctatis, punctis infra humeros et ad latera majoribus, impressione basali obsoleta; pedibus saturate rufo-testaceis. — Long. $4-4\frac{1}{2}$, lat. 3 mill.

Ocaña (Landolt!).

5. *A. mutabilis* (n. sp.): Obovatus, convexus, subtus rufo-fulvus vel piceus, supra brunneo-aeneus, glaucescens, labro, palpis antennisque fulvo-testaceis, harum articulis 6—7, duobusque ultimis, nigris; prothorace sat dense remote punctulato; elytris infra humeros late transversim impressis, substriatim fortius punctatis, punctis sensim versus apicem minoribus; pedibus rufo-fulvis, interdum nigro-infuscatis. — Long. $3\frac{1}{2}-4$, lat. $1\frac{3}{4}-2$ mill.

Var. β . Rufo-fulvus, capite, prothorace, elytrorumque dimidia parte postica, magis minusve aenescentibus.

Var. γ . Totus rufo-fulvus.

Muzo, La Vega.

6. *A. rufo-testaceus* (n. sp.): Subrotundato-ovatus, valde convexus, rufo-testaceus, subtus dilutior, antennis nigris, articulis quatuor basalibus fulvis: capite fere laevi; prothorace vix visibiliter subtilissime punctulato; elytris subtiliter subseriatim punctatis, impressione basali fere nulla; pedibus fulvis, tibiis tarsisque nigro-infuscatis. — Long. $3\frac{1}{4}$, lat. 2 mill.

Nare.

Polysarcus.

Lef. Rev. et mag. de Zool. 1876. p. 286.

1. *P. dichrous* (n. sp.): Suboblongus, modice convexus, rufus, pedibus antennisque cyaneo-nigris, harum articulis 3 basalibus rufis: capite grosse undique confluentur punctato, scrobiculato, vertice postice laevi; prothorace transverso, in medio baseos obsolete lobato, superne laevi, punctis nonnullis in medio disci disperse instructo, lateribus subarcuato ibique vix perspicue sinuato; elytris infra humeros late obsolete transversim impressis, dense substriatim punctatis, punctis intra impressionem et ad latera majoribus, sensim versus apicem minoribus. — Long. $5\frac{1}{2}$ —6, lat. 3 mill.

♂ Capite magno; 1^o. tarsorum quatuor anticorum articulo valde dilatato; elytris saturate cyaneis.

♀ Capite minore; 1^o. tarsorum anticorum articulo triangulari; elytris rufis.

Manizales.

Metaxyonycha.

Marshall. Ann. nat. Hist. 1864. p. 382.

1. *M. Lefevrei* Harold. Col. Heft. XIV. p. 139.

San Carlos.

2. *M. sanguinea* (n. sp.): Oblongo-elongata, corpore subtus cum pedibus nigro, supra rufo-sanguinea, oculis antennisque nigris, harum articulis 2 vel 3 basalibus fulvis; prothorace transverso, grosse inaequaliter disperse punctato, lateribus untrunque medio fortiter unidentato; elytris thorace multo latioribus, sat profunde longitudinaliter costatis, inter costas disci uniseriatim, ad latera subgeminatim rugose

punctatis; tibiis intermediis extus modice emarginatis. — Long. 8, lat. $3\frac{1}{2}$ mill.

Copér.

Prionodera.

Chapuis. Gen. Col. X. 1874. p. 248.

1. *P. ocañana* (n. sp.): Oblongo-elongata, flavo-testacea, elytris laete aeneo-viridibus aut viridi-coeruleis, nitidissimis, margine laterali sicut et apicali late flavis, antennis nigris, articulis quinque basalibus fulvis; capite punctato, in media fronte sat profunde foveolato; prothorace grosse disperse punctato, utrinque medio valde transversim impresso, lateribus distincte tridentatis; scutello laevi, flavo; elytris infra basin transversim evidenter impressis, fortiter punctato-striatis, punctis grossis, plerumque praesertim ad latera geminatim dispositis, interstitiis subelevatis, lucidis; pedibus omnino flavo-testaceis. — Long. 8—10, lat. 3—4 mill.

Ocaña (Landolt!).

Colaspis.

Fabricius. Syst. Eleuth. I. 1801. p. 411.

1. *C. leucopus* Harold., Col. Heft. XIV. p. 139.

Copér.

2. *C. prasina* (n. sp.): Suboblongo-ovalis, convexa, subtus viridi-metallica vel viridi-cyanea, nitida, supra laete viridis, vel viridi-aenea, gennea, palpis sicut et antennis laete fulvis, labro brunneo, oculis mandibulisque nigris; capite fortiter et confluentem punctato; prothorace transverso, utrinque subimpresso, grosse profunde punctato, punctis hic illic confluentibus, interstitiis praesertim in medio disci callosis, lucidis, lateribus obsolete uni- vel bi-denticulato; scutello parvo, laevissimo; elytris dense profunde grosseque seriatim punctatis, interstitiis tribus primis prope suturam et versus apicem elevatis, interstitio penultimo a callo humerali usque ad apicem subcostato, lucido, callo humerali ipso calloso, laevi. — Long. 7—8, lat. $3\frac{1}{2}$ —4 mill.

Fnsagasugá, Guayabál, Muzo, Copér.

Cette espèce se trouve également au Mexique; elle ressemble au *C. chlorites* Erichs. Consp. Faun. Peruanae, p. 160, mais la ponctuation du prothorax et des élytres est beaucoup plus grosse et plus profonde.

3. *C. callichloris* (n. sp.): Suboblongo-ovata, convexa, subtus viridi-metallica vel viridi-cyanea, supra laete viridis, gemmea, interdum cupreo-aurato-micans, labro, palpis, pedibus antennisque fulvis, harum articulis 5—7 nigricantibus; capite crebre fortiter punctato; prothorace transverso, lateribus subunidentulato, grosse confertim et profunde punctato, punctis praesertim ad latera confluentibus, interstitiis subcallosis, lucidis; scutello parvo, laevisimo, apice rotundato; elytris costatis, costis parum elevatis, laevibus, interstitiis grosse profunde seriatim geminato-punctatis. — Long. 6—8, lat. 3—4 mill.

Canoas, Ocaña (Landolt!).

Cette espèce est voisine du *C. aeruginosa* Germar. Ins sp. nov. p. 570; elle m'en paraît bien distincte par sa couleur générale toujours plus brillante, par les côtes des élytres moins élevées et la ponctuation des intervalles beaucoup plus grosse et plus profonde; elle se trouve également au Mexique.

4. *C. Lebasi* (n. sp.): Obovata, leviter convexa, subtus viridi-aenea, abdomine nigro-aeneo, nitido, supra laete viridis, gemmea, interdum cupreo-aurato-micans, labro, palpis antennisque fulvo-testaceis; capite punctato, inter oculos obsolete impresso; prothorace transverso, creberrime fortiter et confluentur undique punctato, lateribus medio unidentulato; scutello parvo, sublaevi; elytris densissime profundeque substriato-punctatis, punctis grossis plerumque confluentibus et ad latera transversim plicato-rugulosis. — Long. 4—5, lat. 2—2 1/4 mill.

Muzo, Paime, Ubáque, El Regidor-Chucuri. — Columb. orient. (Winkler!).

5. *C. strigata* (n. sp.): Obovata, convexiuscula, viridi-metallica, leviter aurato-reflexo-micans, labro, palpis antennisque fulvo-testaceis; capite punctato, vertice sublaevi; prothorace valde convexo, grosse disperse parum dense punctato, interstitiis laevibus, lateribus utrinque 3-denticulato, angulis anticis acutis, extus productis; scutello parvo, laevi; elytris juxta suturam et apicem versus punctato-striatis, lateribus utrinque transversim fortiter plicato-strigatis, impressioue basali obsoleta. — Long. 4, lat. 2 mill.

Muzo.

6. *C. hypoxantha* (n. sp.): Obovata, subtus cum pedibus rufo-testacea, supra viridi-metallica, nitida, antennis nigris, articulis 4 basalibus obscure brunneis; capite punctato, in media fronte sat fortiter impresso; prothorace transverso, grosse inaequaliter punctato, punctis ad latera confluentibus, spatio basilari laevi, lateribus medio unidentato; elytris fortiter punctatis, disco exteriori et ad latera transversim elevato-strigosis, versus apicem prope suturam longitudinaliter punctato-striatis, interstitiis elevatis. — Long. 4—4 $\frac{1}{2}$, lat. 2—2 $\frac{1}{4}$ mill.

San Carlos.

7. *C. compta* Lef. Ann. Soc. ent. Fr. 1877, p. 144.
Columb. orient. (Winkler!).

8. *C. femoralis* (n. sp.): Obovata, obscure coerulea, nitidula, labro palpisque brunneo-testaceis, antennis cyaneo-nigris, articulis 4 basalibus fulvis; capite dense confluentur punctato; prothorace convexo, crebre sat fortiter punctato, punctis aciculatis, lateribus utrinque subrotundato ibique medio angulato, angulis anticis subacutis, extus productis; scutello parvo, sublaevi; elytris grosse undique substriato-punctatis, apicem versus sat fortiter punctato-sulcatis, interstitiis elevatis; pedibus nigro-cyaneis, femoribus totis rufo-testaceis. — Long. 4, lat. 2 mill.

Muzo.

9. *C. inconstans* (n. sp.): Oblonga, subtus viridi-aenea, supra aeneo-viridis, vel viridi-cyanea, interdum cyaneo-nigra, nitida, labro, palpis antennisque brunneo-testaceis, his filiformibus, articulis 5 ultimis nigris; capite magis minusve punctato, inter oculos transversim sat fortiter impresso et supra antennarum insertionem spatiis duobus subcallosis laevibus nitide instructo; prothorace transverso, convexo, superne crebre minute punctulato, lateribus utrinque medio unidentato vel fortiter angulato, angulis anticis sicut et posticis subacutis, extus productis; scutello laevi; elytris infra humeros magis minusve evidenter transversim impressis, dense fortiter substriato-punctatis, punctis intra impressionem et ad latera paulo majoribus; pedibus fulvo-vel rufo-testaceis, interdum nigro-piceis, genubus duobus posticis plerumque nigro-infuscatis. — Long. 3—4, lat. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{3}{4}$ mill.

Muzo, Ocaña. — Columb. orient. (Winkler!).

10. *C. Gemmingeri* Harold. Col. Heft. XII. p. 81, sub *Chalcophana*.

San Carlos.

11. *C. formosa* (n. sp.): Oblonga, pallide fulva, oculis, mandibulis antennisque nigris; prothorace sat dense punctulato, lateribus medio unidentato; elytris disco interiore subtiliter, ad latera grosse, remote punctatis, apicem versus punctato-striatis, interstitiis subelevatis, laevibus; flavis, sutura tota, margine laterali, macula magna rotundata, inter scutellum et callum humeralem posita, vittisque tribus transversis communibus (quarum altera media, altera paulo ante apicem tertiaque apicalis) nigro-violaceis; pedibus pallide flavis, tibiis apice tarsisque piceis. — Long. 4, lat. $1\frac{1}{3}$ mill.

San Carlos.

12. *C. suturalis* (n. sp.): Ovalis, corpore subtus cum capite viridi-metallico, oculis, mandibulis antennisque nigris, harum articulis 2 basalibus obscure fulvis; prothorace fulvo, disperse punctulato, lateribus utrinque rotundato, in medio obsolete angulato, anguste marginato et viridi-metallico; scutello viridi-metallico; elytris grosse regulariter punctato-striatis, interstitiis elevatis, costaeformibus; fulvis, epipleuris, limbo laterali suturaque tota magis minusve late coeruleo-viridibus; pedibus pallide flavis, genibus, tibiis apice tarsisque piceis. — Long. $3\frac{1}{2}$ —4, lat. $1\frac{3}{4}$ —2 mill.

Nare — se retrouve au Mexique.

13. *C. hypochlora* (n. sp.): Ovalis, corpore subtus viridi-metallico, supra cum pedibus flava, vel fulva aut brunnea, mandibulis oculisque nigris, antennis fulvis, articulo septimo duobusque ultimis piceis; prothorace disco subremote, ad latera autem crebrius sat grosse punctato, lateribus utrinque anguste marginatis et viridi-metallicis, in medio obsolete angulatis; elytris grosse regulariter punctato-striatis, punctis geminatis, interstitiis costaeformibus, apice et ad latera magis elevatis, epipleuris margineque laterali utrinque anguste viridi-metallicis. — Long. $4\frac{1}{2}$ —5, lat. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mill.

Variat corpore subtus fulvo, metasterno tantum viridi-metallico.

Colón. Se trouve également au Mexique.

14. *C. fulvo-testacea* (n. sp.): Oblongo-elongata, omnino fulvo-testacea, capite inter oculos fortiter impresso ibique punctulato, ver-

tice laevi, antennis fulvis, articulis septimo ultimoque nigris; prothorace convexo, disperse punctulato, lateribus rotundatis, marginatis, in medio magis minusve evidenter sinuatis vel denticulatis; elytris oblongo-elongatis, infra humeros transversim impressis, seriatim subgeminato-punctatis, punctis versus apicem attenuatis et seriebus simplicibus. — Long. 5—6, lat. 2—3 mill.

♀ Elytris praesertim ad latera magis fortiter punctatis, ibique longitudinaliter costulatis.

San Carlos, Cañosas.

15. *C. luridula* (n. sp.): Oblonga, omnino fulvo-testacea, superne magis minusve viridi-aeneo-reflexo-micans, antennis fulvis, articulo septimo infuscato vel nigro; capite antice grosse punctato, inter oculos impresso, vertice punctulato; prothorace convexo, in medio disci disperse, ad latera densius et fortius punctato, lateribus utrinque rotundato, marginato, anguste viridi-aeneo et in medio sat fortiter denticulato; scutello laevi; elytris infra humeros obsolete transversim impressis, dorso leviter, ad latera multo fortius punctatis, pone medium usque ad apicem punctato-striatis; pedibus fulvis. — Long. $4\frac{1}{2}$ —5, lat. 2 — $2\frac{1}{2}$ mill.

♀ Elytris fortius et crebrius punctatis, callo humerali in cretam parum elevatam evidenter producto.

San Carlos.

Aletes.

Chapuis. Gen. Col. X. 1871. p. 250.

1. *A. annulicornis* (n. sp.): Oblongo-elongatus, parallelus, viridi-aeneus, nitidus, labro brunneo, palpis fulvis, antennis nigris, articulis totis apice pallide testaceis; capite disperse punctato, inter oculos vage impresso; prothorace transverso, convexo, subtiliter parum dense punctulato, lateribus rotundato, immarginato, ibique medio late trisinuato, angulis anticis subacutis, extus productis; scutello parvo, laevi; elytris infra humeros transversim sat fortiter impressis, prope suturam leviter et subseriatim, ad latera autem paulo fortius et remote, disperse punctatis, punctis sensim apicem versus minoribus, callo humerali ipso calloso; pedibus obscure brunneis, femoribus magis minusve aeneo-reflexo-micantibus, tarsis piceis. — Long. 5 — $5\frac{1}{4}$, lat. 2 — $2\frac{1}{4}$ mill.

♀ Elytris basi juxta callum humeralem breviter subelevato-costulatis et ad latera utrinque tuberculis nonnullis parvis (quorum anticis majoribus) remote longitudinaliter instructis.

La Luzéra.

2. *A. vagabundus* (n. sp.): Suboblongo-ovatus, convexus, viridi-aeneus, subcupreus, nitidus, labro-piceo, antennis fuscis, articulis quatuor basalibus obscure testaceis; capite disperse punctato, inter oculos sat fortiter impresso; prothorace transverso, convexo, crebre undique subtiliter punctulato, lateribus rotundato ibique medio magis minusve fortiter trisinuato, angulis anticis subacutis, extus productis; scutello parvo, laevi; elytris infra humeros late transversim impressis, fortiter subseriatim punctatis, apicem versus profunde sulcatis, interstitiis convexis, subrugulosis, callo humerali ipso calloso, nitido, limbo laterali utrinque viridi-metallico; pedibus rufo-fulvis, tarsis piceis. — Long. 5—5½, lat. 2½—3 mill.

♀ Elytris basi breviter subelevato-costulatis et infra humeros tuberculo oblongo distincte instructis.

Fusagasugá, Guayabál, La Vega, Paine, Copér. — Columb. orient. (Winkler!).

3. *A. intricatus* (n. sp.): Suboblongus, parallelus, aeneo-viridis vel aeneus, nitidus, labro palpisque brunneis, antennis validis, fuscis, articulis 3 basalibus rufo-fulvis; capite antice sat fortiter et substrigatim, postice subtilius, punctato; prothorace transverso, disperse inaequaliter punctulato, lateribus utrinque rotundato, ibique medio ampliato et vage sinuato; scutello parvo, laevi; elytris subelongatis, infra humeros vage impressis, prope suturam subtiliter, ad latera fortius et crebrius, subseriatim punctatis, versus apicem satis profunde sulcatis, interstitiis convexiusculis, ad latera utrinque costula satis elevata, a callo humerali usque ad apicem extensa, notatis; pedibus rufis vel piceis, tibiis apice infuscatis, tarsis cyaneo-nigris. — Long. 5½, lat. 3¾ mill.

Medellin, Manizalès.

4. *A. Landolti* (n. sp.): Oblongo-elongatus, parallelus, parum convexus, viridi-aeneus, nitidus, labro, palpis antennisque brunneis, his apice nigro-fuscis; capite sat dense punctato; prothorace transverso, vage undique punctulato, infra marginem anticum late trans-

versim impresso, lateribus utrinque rotundato ibique medio fortiter bisinuato, angulis anticis subacutis, extus productis; scutello laevi; elytris infra humeros vage transversim impressis, disco interiore subtiliter, ad latera autem magis fortiter et substrigatim punctatis, punctis undique majoribus et minoribus intermixtis, interstitio penultimo costaeformi, callo humerali ipso calloso; pedibus fulvo brunneis. — Long. 6, lat. $3\frac{1}{2}$ mill.

Ocaña (Landolt!).

5. *A. bogotanus* (n. sp.): Suboblongo-ovalis, convexus, subtus saturate viridi-aeneus, supra aeneo-subcuprens, parum nitidas, labro, palpis antennisque saturate fulvis, his apice brunneis; capite sat crebre punctato, inter oculos vage impresso; prothorace valde convexo, crebre undique punctulato, lateribus utrinque rotundato ibique obsolete sinuato; scutello laevi; elytris minus nitidis, infra humeros late transversim impressis, subtiliter remote punctulatis, punctis antice majoribus et subgeminatim dispositis, postice autem sensim minoribus et seriebus simplicibus, callo humerali ipso calloso et juxta impressionem basalem tuberculo oblongo, in ♀ magis elevato; pedibus brunneo-fulvis, femoribus magis minusve aeneo-reflexo-micantibus. — Long. $4\frac{1}{2}$ —5, lat. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mill.

Bogotá.

Dolometis.

Harold. Coleopt. Heft. XIV. p. 139.

1. *D. discoidalis* Harold. loc. cit.

Guyabál.

Rhabdophorus.

Nov. gen.

Caput deflexum, usque ad oculos in thoracem insertum. Oculi magni, convexi, intus leviter emarginati. Antennae distantes, juxta oculorum marginem anteriorem insertae, subfiliformes, articulo 1^o. incrassato, 2^o. subgloboso, tertio duplo brevior, 3—6 multo gracilioribus inter se aequilongis, quinque ultimis nonnihil longioribus, leviter incrassatis. Prothorax transversus, basi elytrorum latitudinem aequans, lateribus medio ampliatus ibique angulatus, dein versus apicem convergens, angulis anticis extrorsum productis. Prosternum latum, planum, inter coxas vix perspicue contractum, basi recte truncatum.

Thoracis episterna margine antico leviter concavo. Pedes robusti, tibiis a basi ad apicem dilatatis, fortiter canaliculatis, quatuor anticis praesertim in mare saepius incurvis, tarsis brevibus, articulo 1^o. duobus sequentibus simul sumptis fere aequilongo, unguiculis appendiculatis.

Ad genus *Colaspis* prope accedit, sed prothoracis structura et prosterno multo latiore praecipue optime distinctum.

Huc pertinet *Colaspis hypochalcea* Harold. Col. Heft. XIV. p. 139.

1. *R. tuberculatus* (n. sp.): Ovatus, supra aeneus vel aeneo-cupreus, corpore subtus piceo magis minusve viridi-metallico, antennis brunneo-testaceis, articulis 5—7 duobusque ultimis nigris; prothorace grosse irregulariter punctato, punctis hic illic aggregatis confluentibusque, interstitiis elevatis, laevibus vel minutissime vix visibiliter punctulatis, margine laterali utrinque anguste reflexo-marginato, viridi-metallico, medio ampliato ibique magis minusve angulato; elytris grosse irregulariter sat dense punctatis, ad latera tuberculis rotundatis elevatis in seriebus tribus dispositis longitudinaliter instructis, basi autem, juxta suturam et apicem versus profunde longitudinaliter sulcatis, interstitiis convexis, laevibus, margine laterali utrinque anguste viridi-metallico; pedibus nigro-piceis, femoribus tibiisque basi dilutioribus, illis magis minusve aeneo-reflexo-micantibus. — Long. 5½—6, lat. 3—3¼ mill.

♂ Elytris sine tuberculis, grosse tantum irregulariter punctatis, 1^o. tarsorum quatuor anticorum articulo valde dilatato.

Cañas, San Carlos.

2. *R. caliginosus* (n. sp.): Ovatus, nigro vel piceo-aeneus, antennis testaceis, articulis 5—7 duobusque ultimis nigris; prothorace multo minus grosse irregulariter punctato, punctis hic illic aggregatis, interstitiis minutissime sat dense punctulatis, margine laterali utrinque reflexo-marginato, viridi-metallico, medio ampliato ibique subangulato; elytris grosse irregulariter subcicatricoso-punctatis, juxta suturam et apicem versus profunde longitudinaliter sulcatis, interstitiis convexis, laevibus, margine laterali utrinque vix perspicue viridi-metallico; pedibus nigris vel piceis, unguiculis rufescentibus. — Long. 6—7, lat. 3½—4 mill.

♂ Tibiis quatuor anticis curvatis, 1^o. tarsorum quatuor anticorum articulo valde dilatato, subquadrato.

Muzo, Copér. — Columb. orient. (Winkler!).

3. *R. curtus* (n. sp.): Subrotundato-ovatus, convexus, piceus, supra obscure aeneus, labro rufo, antennis testaceis, articulo septimo duobusque ultimis nigris; prothorace disperse remote punctato, punctorum interstitiis laevibus, margine laterali utrinque rotundato, vix perspicue angulato, anguste reflexo-marginato, obscure viridi-aeneo; elytris sat fortiter punctatis (punctis prope suturam minoribus et seriatim subgeminatim dispositis), pone medium usque ad apicem profunde longitudinaliter sulcatis, interstitiis minutissime punctulatis; pedibus piceis. — Long. 4, lat. 3 mill.

Columb. orient. (Winkler!).

Otilea.

Lef. Ann. Soc. entom. Fr. 1877. p. 154.

1. *O. collaris* (n. sp.): Suboblongo-ovalis, testacea, oculis mandibulisque nigris, capite crebre punctato, inter oculos valde foveolato, vertice profunde sulcato; prothorace transverso, viridi-aurato, nitido, grosse inaequaliter punctato, punctis hic illic aggregatis, interstitiis laevibus subcallosis, ad latera utrinque late sat fortiter impresso, lateribus medio acute angulato, angulis anticis extus curvato-productis; elytris testaceis, nigro-punctatis, prope suturam regulariter punctato-striatis, basi et apicem versus profunde sulcatis, interstitiis convexis, laevibus, callo humerali subacuto, abrupte interrupto et in costam acutam usque ad apicem extensam producto, impressione basali optime distincta. — Long. 5—7, lat. 2½—3 mill.

♂ Paulo minor, 1^o. tarsorum quatuor anticorum articulo modice dilatato.

Ocaña (Landolt!).

Chalcophana.

Chevrolat. d'Orbigny Dict. d'Hist. nat. III. p. 372.

1. *Ch. versicolor* Harold. Col. Heft. XII. p. 68.

Fusagasugá, Ubáque. — Columb. orient. (Winkler!).

2. *Ch. bogotana* Harold. Col. Heft. XII. p. 78.

Fusagasugá, Muzo, Paine, La Vega.

Variat corpore subtus cum capite, prothorace pedibusque (tibiis tarsisque nigris exceptis) rufo.

3. *Ch. Haroldi* (n. sp.): Oblongo-ovalis, elongata, rufa vel rufo-picea, elytris varicoloribus, viridibus, purpureis aut viridi-aeneis; antennis omnino rufis vel in medio aeneo-nigris; capite sat denso punctulato, inter oculos valde foveolato; prothorace magis minusve remote punctato, lateribus utrinque medio obsolete angulato; elytris parallelis, dorso subdepressis, densissime minus grosse punctatis, ad latera subtiliter transversim rugulosis ibique costis duabus (quarum prima ante apicem desinente, secunda autem versus apicem magis elevata) longitudinaliter instructis, impressione basali nulla. — Long. 7--9, lat. 3--4 mill.

♂ Minor, antennis crassis, prothorace lateribus rotundato, elytris utrinque versus marginem lateralem longitudinaliter subcostatis, 1^o. tarsorum quatuor anticorum articulo dilatato.

Medellin.

4. *Ch. suavis* Harold. Col. Heft. XII. p. 73.

Fusagasugá, Guayabál, Ocaña, Agnada, Rio negro, La Vega. — Columb. orient. (Winkler!).

5. *Ch. servula* (n. sp.): Ovalis, rufo-sanguinea, elytris cyaneis, viridibus vel auratis, epipleuris, margine ipso et apice pedibusque rufo-sanguineis, tarsis, tibiis (basi excepta) sicut et antennis cyaneo-nigris, harum articulis 2 basalibus rufis; capite inter oculos sat fortiter foveolato, vertice longitudinaliter canaliculato; prothorace punctis nonnullis hic illic disperse adperso; elytris apice acuminatis, basi et ad latera sat fortiter costatis, costis dorsalibus pone medium desinentibus, duabus autem lateralibus usque ad apicem fere extensis ibique magis elevatis; inter costas sat fortiter geminatim punctatis, punctis prope suturam et versus apicem minoribus et seriebus simplicibus, impressione basali maxime profunda, angulo apicali tumido. — Long. 5--7, lat. 2 $\frac{1}{4}$ —3 mill.

Cañoas, Muzo, Copér, San Carlos, La Vega.

6. *Ch. Landolti* (n. sp.): Ovalis, rufa vel rufo-picea, elytris lacte aeneo-viridibus vel cupreo-aeneis, margine laterali utrinque anguste ferrugineis, oculis mandibulisque nigris, tarsis sicut et antennis

cyaneo-nigris, harum articularis 3 vel 4 basalibus rufis; capite sat dense punctulato, inter oculos foveolato; prothorace remote punctato, interstitiis minutissime vix perspicue punctulatis; elytris convexis, fortiter sublineatim remote punctatis, punctis in medio disci et versus apicem paulo minoribus, juxta suturam praesertim versus apicem sat profunde longitudinaliter unistriatis, ad latera distincte tricostulatis, costulis versus apicem magis elevatis, impressione basali profunda. — Long. 4—6, lat. 2—4 mill.

♂ Multo minor, elytris non costulatis, 1^o. tarsorum quatuor anticorum articulo dilatato.

Ocaña (Landolt!). — Medellin.

7. *Ch. puncticollis* (n. sp.): Ovalis, rufa vel rufo-picea, elytris laete viridibus vel viridi-auratis, epipleuris, margine apicali pedibusque rufis, tarsis nigris, antennis ferrugineis, articulis 5—8 nigris; capite crebre punctulato, inter oculos foveolato; prothorace punctis majoribus et minoribus intermixtis irregulariter adperso; elytris convexis, dense subtiliter punctulatis, juxta suturam praesertim versus apicem sat profunde longitudinaliter unistriatis, ad latera pone impressionem basalem obsoletam brevissime bicostulatis, angulo apicali grosse punctato. — Long. 6½—7, lat. 3—4 mill.

♂ Paulo vix minor, costulis elytrorum obsoletis.
Guayabál, Ibagué.

8. *Ch. seminigra* Harold. Col. Heft. XII. p. 80.
Medellin, La Mesa.

9. *Ch. lutulenta* Harold. Col. Heft. XII. p. 79.
Columb. orient. (Winkler!).

Habrophora.

Erichs. Wieg. Arch. 1847. I. p. 163.

1. *H. tibialis* (n. sp.): Oblonga, fulva, aequaliter fulvo-pubescentis, mandibulis, oculis, antennis apice, genibus, tibiis tarsisque nigris, prothorace elytrisque densissime punctulatis — Long. 5, lat. 2 mill.
Muzo.

Sphaeropsis.

Lef. Rev. et mag. de Zool. 1876. p. 302.

1. *Sph. humeralis* (n. sp.): Breviter oblongo-ovata, subviridi-

aenea, interdum subcuprea, nitidula, pube molli grisea dense undique vestita, labro, palpis, antennis pedibusque brunneis, his interdum dilutioribus; capite prothoraceque crebre undique sat fortiter punctatis; elytris densissime subtiliter inordinatim punctulatis, impressione basali fere nulla. — Long. 3—3½, lat. 1¼—1½ mill.

♂ Callo humerali simplici.

♀ Paulo major, callo humerali in cretam elevatam producto.

Nare, Muzo, Paimé, Cartago. — Ocaña (Landolt!).

Argolis.

1. *A. Steinhelli* (n. sp.): ♀ Oblongo-ovalis, convexus, viridi-aeneus, subcupreo-reflexo-micans, nitidus, labro, palpis, pedibus antennisque brunneo-testaceis, harum articulis quinque ultimis nigricantibus; capite crebre undique punctato, vertice obsolete longitudinaliter sulcato; prothorace minutissime remote punctulato, punctis multo majoribus disperse intermixtis; scutello laevi; elytris fortiter punctatis, ad latera transversim subconfluentem strigatis, versus apicem (praesertim juxta suturam) punctato-striatis; corpore subtus cum pedibus pube albida sat dense obtecto. — Long. 5½, lat. 3½ mill.

Cañas.

Myochrous.

1. *M. explanatus* Baly. Trans. ent. Soc. of Lond. 1865. p. 335. Magdalena.

2. *M. dubius* Fabr. Syst. El. II. p. 53. Muzo, Ocaña (Landolt!).

Glyptoscelis.

Leeonte. Proc. Ac. Phil. 1859. p. 81.

1. *Gl. fascicularis* Baly. Trans. ent. Soc. of Lond. 1865. p. 334. Nare. — Ocaña (Landolt!).

Typophorus.

Erichs. Wieg. Arch. 1847. I. p. 163.

1. *T. nigrinus* Fabr. Syst. El. I. p. 421. (1801.)

Var. β. *T. nitidulus* Fabr. loc. cit. p. 421.

Mompox-el-Regidor, Muzo, Nare, Copér, La Vega, Cartago. — Columb. orient. (Winkler!).

2. *T. Steinheili* (n. sp.): Obovatus, rufo-testaceus, nitidus, pedibus antennisque nigris, harum articulis 4 basalibus fulvis; capite prothoraceque laevibus; elytris infra humeros vix perspicue impressis, subtiliter striato-punctatis, punctis ultra medium fere omnino evanescentibus. — Long. 3—3 $\frac{1}{2}$, lat. 1 $\frac{3}{4}$ —2 mill.

Nare.

3. *T. exilis* (n. sp.): Minor, obovatus, subtus niger, supra cyaneus, nitidus; prothorace laevissimo; elytris lineatim punctatis, punctis ultra medium omnino evanescentibus, impressione basali obsoleta; pedibus nigro-piceis, tibiis pro parte tarsisque fulvis. — Long. 2—2 $\frac{1}{4}$, lat. 1—1 $\frac{1}{4}$ mill.

Columb. orient. (Winkler!).

Phanaeta.

(Nov. gen.)

Caput deflexum, usque ad oculos in thoracem insertum, oculis distantibus, rotundatis, integris. Antennae robustae, articulo 1^o. inflato, 2^o. incrassato tertio parum longiore, 3—6 minus validis, inter se aequilongis, quinque ultimis crassioribus, cylindricis. Prothorax convexus, lateribus utrinque medio angulatus vel minime denticulatus. Prosternum planum, latissimum, basi recte truncatum; thoracis episterna margine anteriore convexo. Mesosternum subquadratum, minus latum. Femora mutica; tibiae rectae, basi ad apicem, sensim leviter dilatatae, extus canaliculatae; unguiculi appendiculati.

Ad genus *Colaspoides* accedit, sed antennarum, prothorace sicut et prosterni structura maxime distinctum.

Huc sane pertinent *Chalcophana striata* Suffr. et *Chalcophana varicornis* Suffr., quae insulam Cuba incolant.

1. *Ph. ruficollis* (n. sp.): Oblongo-ovata, convexa, capite prothoraceque rufis, elytris cyaneis, pectore, abdomine pedibusque nigris vel nigro-piceis, femoribus anticis basi rufescentibus, antennis nigris, articulis quatuor primis testaceis; prothorace nitido, punctis nonnullis hic illic tantum adperso, lateribus utrinque medio minime sed evidenter bidentulatis. — Long. 3 $\frac{1}{2}$ —4, lat. 1 $\frac{3}{4}$ —2 $\frac{1}{3}$ mill.

♂ Elytris fortiter, ad latera crebrius, substriato-punctatis.

♀ Latior, elytris fortiter substriato-punctatis, ad latera utrinque longitudinaliter manifeste costatis, inter costas confluentes subrugose punctatis.

Paimo, Cañosas. — Ocaña (Landolt!).

Colaspoides.

Castelnau. Silb. Rev. 1833. p. 20.

1. *C. fasciata* Lef. Rev. et mag. de zool. 1875. p. 135.

La Vega.

2. *C. viridicornis* (n. sp.): Late ovata, convexa, subtus viridicyanea, supra saturate cyanea, nitidissima, labro viridi-aeneo, antennis filiformibus, viridi-metallicis, articulis 3 basalibus fulvis, 1^o. macula fusca superne notata, 3^o. duobus sequentibus simul sumptis aequilongis; capite crebre fortiter punctato, vertice sat profunde longitudinaliter sulcato; prothorace transverso, laevi, vix perspicue hic illic disperse subtilissime punctulato; scutello laevissimo; elytris subtiliter punctatis, punctis sensim versus apicem minoribus, apice juxta suturam unistriatis; pedibus cyaneis, tibiis apice tarsisque viridibus, unguiculis obscure ferrugineis. — Long. 6, lat. 4 mill.

Medellin.

2. *C. varicolor* (n. sp.): Ovata, valde convexa, viridi-metallica vel cyaneo-viridis, vel cyanea, nitida, pedibus concoloribus, tarsis fuscis, antennis nigris, articulis 4 vel 5 basalibus testaceis; capite crebre undique punctato; prothorace punctis majoribus et minoribus intermixtis sat dense instructo, lateribus utrinque concinne marginato; scutello laevi; elytris infra humeros late sed parum profunde transversim impressis, sat crebre punctulatis, punctis aciculatis et sensim versus apicem minoribus, apice juxta suturam stria impressa. — Long. 5—6, lat. 3½—4 mill.

Cañosas.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Münchner Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [002](#)

Autor(en)/Author(s): Lefevre Edouard

Artikel/Article: [Eumolpides 112-133](#)