

Stilbops limneriaeformis Schmiedeknecht, 1888

Aubert, 1978, p. 30

Die Art ist weit verbreitet, wird aber immer nur in Einzeltieren gefangen. Ich fing sie so bei Einbeck und Eschwege (BRD), Rila-Kloster (V. R. Bulgarien), Włodzimierz (V. R. Polen) und am Col des Montets und bei Montroc-le-Planet (Französische Alpen). Die Art fliegt später als *vetula*, sie sollte ihrem Körperbau entsprechend eine sehr ähnliche Lebensweise haben. Bei Eschwege kommen an größeren Incurvariiden noch *Adela degeerella* L. und eine braune *Nemophora*-Art vor. Vielleicht ist eine von diesen als Wirt anzusehen.

Stilbops plementaschi Hensch, 1930

Hensch, 1930, p. 71

Holotypus: ♀: (Horstmann, 1980): „Krapina 15. 5. 23. Gr.“

„*Stilbops* ♀ n. sp. Abd. mitte rot.“ (Institut za zaštitu bilja, Zagreb)

Man kennt bisher nur den Holotypus. Sein Körperbau läßt auf eine der *vetula* ähnliche Lebensweise schließen, jedoch ist das von Hensch angegebene Habitat „heiße Sandberge“ völlig andersartig.

Stilbops asper (Schmiedeknecht, 1913)

Schmiedeknecht, 1913, p. 2724

Aubert, 1978, p. 30

Lectotypus: ♀: „Blankenburg Thüringen Schmiedeknecht“

„Sumpfwiesen im ... (unleserlich) 21. Mai 1903“

„*Eritrachynus asper* ♀ n. sp.“ „Coll. Schmiedeknecht“

„Typus“ „Zool. Mus. Berlin“

Paralectotypus: ♀: „Coll. Schmiedeknecht“ „*Eritrachynus asper* ♀ Schmied.“ „Typus“ „Zool. Mus. Berlin“.

Auch für diese Art muß man eine der *vetula* ähnliche Lebensweise annehmen. Schmiedeknecht fing seine beiden Tiere auf einer „sumpfigen Bergwiese“.

Literatur

Aubert, J. F. (1978): Les Ichneumonides Ouest-Palearctiques et leurs hôtes. — 2 Banchinae et Suppl. aux Pimplinae. — Paris 1978.

Hensch, A. (1929—1930): II. Beitrag zur Kenntnis der jugoslavischen Ichneumonidenfauna. — *Konowia*, 8, 123—153; 9, 71—78, 235—250.

Schmiedeknecht, O. (1902—1936): Opuscula Ichneumonologica. 3, Pimplinae und 5, Tryphoninae. — Blankenburg i. Thür.

Townes, H. (1970): The genera of Ichneumonidae. Part 3. — *Memoirs of the American Entomological Institute* Number 13. — Ann Arbor.

Anschrift des Verfassers:

Rolf Hinz, Fritz-Reuter-Str. 34, D-3352 Einbeck

Aus der Münchner Entomologischen Gesellschaft

Die **Gemeinschaftsexkursion der südbayerischen Koleopterologen** findet heuer am 18. Juli zur Winklmoos-Alm im Chiemgau statt. Treffpunkt: 9.00 Uhr auf dem Parkplatz unmittelbar an der Ausfahrt „Bernau“ der Autobahn München-Salzburg.

Am darauffolgenden Tag (19. 7.) wird für interessierte Teilnehmer ebenfalls eine Führung zu weiteren Zielen im Chiemgau organisiert, doch muß für die Übernachtungsmöglichkeit selbst gesorgt werden. Bei schlechtem Wetter werden alle Termine um eine Woche verschoben. Den Teilnehmern wird deshalb empfohlen, bei unklarer Witterung Herrn Chr. Hirsstetter unter (0 80 51) 45 15 anzurufen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [030](#)

Autor(en)/Author(s): Anonym

Artikel/Article: [Aus der Münchner Entomologischen Gesellschaft. 64](#)