© Münchner Ent. Ges., download www.biologiezentrum.at

Kurze Mitteilungen

Die Staubeule *Caradrina (Platyperigea) kadenii* (FREYER, 1836) in Südostbayern nachgewiesen

(Lepidoptera, Noctuidae)

Christian ZEHENTNER

Nachdem mein Freund, Walter SAGE aus Kirchdorf am Inn, mich im Frühling 2005 gebeten hatte, besonders auf *Caradrina (Platyperigea) kadenii* zu achten, war ich auf diese Art sehr sensibilisiert. Er hatte mir erzählt, dass er die Art bei sich in Kirchdorf/Inn schon am 19.VIII. und 08.IX.2003 gefangen und als *C. kadenii* bestimmt hat, aber nach Vergleichen mit publizierten Verbreitungsdaten (z. B. EBERT 1997, FAJCIK 1998: kein Vorkommen in Deutschland und im angrenzenden Oberösterreich) als helle Form von *Caradrina* (*Paradrina*) *clavipalpis* (SCOPOLI, 1763) angesprochen hat. Am 04.IX.2004 hatte er erneut ein solches Tier am Licht. J. BRANDSTETTER bestimmte ihm damals das Tier als *Platyperigea kadenii* (FREYER, 1836). W. SAGE fing im darauf folgenden Jahr 2005, vom 24.VI. - 10.IX.2005 weitere 6 Exemplare. Am 03.IX. 2005 und 08.IX. 2005 konnte ich die Art dann auch bei mir nachweisen. Ich hatte jeweils ein Männchen am Haus in Fridolfing/Nilling 2 am Licht. Beide Falter waren taufrisch.

Abb. 1: Die Staubeule *Caradrina (Platyperigea) kadenii* (FREYER, 1836) (Foto: Johann SCHILD/Fridolfing)

Diese interessante Art befindet sich anscheinend in Ausbreitung (vergl. HACKER 2004, Esperiana **10**, S. 77). Von W. SAGE wird vermutet, dass die Art die Flüsse stromaufwärts entlangzieht und ihr Areal erweitert.

Funddaten

Bayern: Landkreis Rottal/Inn Kirchdorf/Inn Ortsteil Ramerding 350m; Leg. und Coll. W. SAGE: 19.VIII.2003, 08.IX.2003, 04.IX.2004, 24.VI.2005, 23.VII.2005, 07.IX.2005, 09.IX.2005 je 1 Falter - 10.IX.2005 - 2 Falter. Landkreis Altötting-Emmerting; Leg. und Coll. G. KARL: 26.IX.2005 - 1 Falter.

Aktuelle Funde von 2006: 20.VI.2006 - 2 Falter; 04.VII.2006 - 1 Falter.

© Münchner Ent. Ges., download www.biologiezentrum.at

Bayern: Landkreis Traunstein - Fridolfing / Nilling 390m; Leg. und Coll. C. ZEHENTNER; je 1 Falter am 03.IX.2005 und 08.IX.2005

Im Jahr 2006 sollte in der näheren Umgebung der Salzach, in Richtung Laufen / Oberndorf - Anthering - Salzburg – Hallein, sowie entlang der anderen Flüsse, besonders an Isar und Inn, auf *C. kadenii* (FREYER, 1836) geachtet werden. Es sollte nicht verwundern, wenn die Art dieses Jahr schon im Bundesland Salzburg, im Landkreis Berchtesgadener Land sowie im Landkreis Landshut gefunden wird.

Literatur

EBERT, G. 1997: Die Schmetterlinge Baden-Würtenbergs, Band **6**, Ulmer – Stuttgart

FAJCIK, J. 1998: Die Schmetterlinge Mitteleuropas II. Band Noctuidae. - Polygrafia, SAV, Bratislava

FORSTER, W. & TH. A. WOHLFAHRT 1971: Die Schmetterlinge Mitteleuropas, Band **4**, Eulen (Noctuidae). - Franck´sche Verlagshandlung, Stuttgart, 329 S.

HACKER, H. H. 2004: Revision of the Genus *Caradrina* OCHSENHEIMER, 1816, with notes on other genera of the Tribus CARADRINA. - Esperiana **10**, 2-690.

SAGE,W. 2005: Die Staubeule *Platyperigea kadenii* (FREYER,1836) erobert den Süden Deutschlands. Mitteilung Zoologische Gesellschaft Braunau **9** (1), 37-40

Anschrift des Verfassers:
Christian ZEHENTNER, Nilling 2, D-83413 Fridolfing

Zum Phänomen extremer Populationsschwankungen bei *Zygaena carniolica* (SCOPOLI, 1763)

(Lepidoptera: Zygaenidae)

Ekkehard FRIEDRICH

Abstract

Numerous examples for extreme fluctuation of abundance in *Zygaena carniolica* in Baden-Württemberg/Germany allow a new interpretation of former observations and publications on this subject.

Zur Populationsdynamik von *Z. carniolica* in Baden-Württemberg

HOFMANN (1994, S. 245-246) berichtet von einer aktuellen "Rückzugstendenz dieser Art", die bis zum völligen Erlöschen von *Z. carniolica*-Populationen gehen kann. "Selbst so geschützte und anscheinend ideale Standorte wie das NSG Badberg am Kaiserstuhl (…) waren kein Garant für den Erhalt einer (…) Population (…).". "Die Gründe für solcherlei zyklische (?) Langzeitschwankungen sind noch völlig unzureichend geklärt (Parasitoide?, Umwelteinflüsse?, endogene Faktoren?)". Aber auch bereits aus dem 19. Jahrhundert sowie aus Regionen außerhalb Baden-Württembergs zitiert HOFMANN Quellen, welche das hier diskutierte Phänomen belegen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: 055

Autor(en)/Author(s): Zehentner Christian

Artikel/Article: Kurze Mitteilungen - Die Staubeule Caradrina (Platyperigea) kadenii (FREYER, 1836) in Südostbayern nachgewiesen (Lepidoptera, Noctuidae) 85-86