© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

8. Helix (Fruticicola) carpatica Friv. } neu für die
9. » » unidentata Drp } Grafschaft Glatz.
10. Buliminus montanus Drap.
11. Clausilia dubia Drap.
12. » orthostoma Menke nebst mut. viridana West.

Kleinere Mittheilungen.

Planorbis corneus als Gärtnergehülfe. Im botanischen Garten zu Breslau wird in einem Gewächshause die zierliche Gitterpflanze Aponogeton fenestrale Hook. fil., Ouvirandra fenestralis Thouars von Madagaskar kultivirt Das fröhliche Gedeihen derselben wurde jedoch durch eine Alge, welche zwischen den gitterartigen Blattrippen wuchert, derartig beeinträchtigt, dass die weitere Existenz der werthvollen Pflanze dadurch geradezu in Frage gestellt wurde. Da erinnerte sich der mit der Pflege der Pflanze betraute Gärtner, Herr Bornemann, dass grössere Wasserschnecken, welche er früher im Aquarium gehalten, mit grosser Begierde die an den Glaswänden wachsenden Algen abgeweidet hatten und brachte zum grossen Entsetzen des Garteninspectors einige Exemplare von Planorbis corneus in den Wasserbehälter der Ouvirandra. Nicht ohne Schwierigkeit gelang es ihm, die Genehmigung zur weiteren Fortsetzung des gewagten Versuches zu erhalten, doch der Erfolg war ein überraschender. Nach kurzer Zeit waren die Blätter der Pflanze von der Alge vollständig befreit, ohne dass die Blattsubstanz selbst angegriffen worden wäre, und seitdem gedeiht der interessante Fremdling unter dem Schutze seines neuen Freundes in ausgezeichneter Weise. E. Merkel.

Literatur.

Pollonera, Carlo, Molluschi fossili postpliocenici del Contorno di Torino. Aus Mem. R. Acad. Sc. Torino, Serie II, vol. 38. 4. 34 pag. mit 1 Tafel.

Die Fauna der Colline de Torino weicht durch das Fehlen aller Deckelschnecken und das Vorkommen von Clausilien der Gruppe Charpentieria von der gegenwärtigen Fauna der piemontesischen Ebene ab und schliesst sich eng an die alpine; dazu stimmt auch, dass Hel. holoserica durch obvoluta ersetzt ist, sylvatica durch nemoralis, und dass im gleichaltrigen Torfmoor von Trana Lymnaea stagnalis und Paludinen fehlen. Helix lapicida und arbustorum finden sich nicht. Als neu beschrieben und abgebildet werden: Limax taurinensis, Hyalina Sismondae, Brady-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: 18

Autor(en)/Author(s): Merkel Eduard

Artikel/Article: Kleinere Mittheilungen 151