

## Verzeichniss der Brutvögel der Umgegend von Diebzig.

Von

**E. Baldamus.**

Das Niederungsdelta zwischen der Elbe und Saale, in dessen Mitte mein Dörfchen liegt, ist bereits durch die Schriften Dr. J. F. Naumanns und Dr. L. Thienemanns als ein sehr vogelreiches bekannt. Offenbar das frühere Flussbett der Elbe bezeichnend, erstreckt sich diese Niederung vom zum Theil ziemlich hohen rechten Elbufer in weitester Ausdehnung über  $1\frac{1}{2}$  Meilen weit, bis zum alten Flussbettufer, und wird auf der dritten Seite durch die Saale, auf der vierten durch die Zusammenrückung des jetzigen und frühern Elbufers begrenzt. Diese Niederung, fast alljährlich durch die Hochwasser beider Flüsse grösstentheils überschwemmt, besteht aus Brücken, Teichen, Gräben, Sandfeldern und dem schönsten Auenboden, und hält nicht viel über eine Quadratmeile. Dieser Auenboden gibt theils fruchtbare Aecker, theils trägt er die schönen Forstreviere von Diebzig und Lödderitz, letzteres in forstlicher Hinsicht von weitverbreitetem Rufe. Eine solche Verschiedenheit des Bodens begründet eine reiche und theilweise höchst üppige Flora, sowie auch eine reiche Fauna der wirbellosen Thiere, und mit beiden zusammenhängend auch eine an Species und Individuen reiche Vogelwelt, und nachstehendes Verzeichniss der von mir seit Jahren hier beobachteten Brutvögel wird den besten Beweis für die Behauptung geben, dass nicht leicht eine andere Lokalität von gleichem Umfange die gleiche Zahl, mindestens von Species, der Brutvögel aufweisen dürfte; denn ohne Repräsentanten sind eigentlich nur die Küsten- und Alpen-Bewohner. Dass, dieser Bodenverschiedenheit entsprechend, auch die Zahl der Zugvögel bedeutend ist, ebenfalls an Arten wie an Individuen, bedarf keiner Versicherung. Indess halte ich namentlich das sporadische oder höchst seltene Vorkommen einzelner Zugvögel für weniger wichtig, als zunächst die Abgrenzung des eigentlichen Vaterlandes, als welches doch lediglich die Brutzone anzusehen ist. So werden z. B. jährlich hier und in Kleinzerbst, dem Wohnorte eines der grössten praktischen Vogelkenner, des Försters Naumann, *H. albicilla* und gar manche andere Vögel erlegt, deren Aufführung ich in der That für weniger wichtig halte \*).

---

\*) Während allerdings die seit einer langen Reihe von Jahren geführten, beispiellosen Schusslisten dieses ausgezeichneten Schützen und Vogelkenners interessante Aufschlüsse über das

Ich führe zunächst die von mir selbst seit 12 Jahren beobachteten Brutvögel auf, und lasse sodann die wenigen von mir noch nicht nistend gefundenen folgen.

1. Aq. naevia.	30. Pic. canus.
2. Pand. Haliaet.	31. " major.
3. But. vulgaris.	32. " medius.
4. Pern. apivorus.	33. " minor.
5. Milv. ater.	34. Cuc. canor.
6. " regalis.	35. Lan. Excub.
7. F. peregr.	36. " minor.
8. " Subbut.	37. " rufus.
9. " tinnunc.	38. " Collurio.
10. Ast. palumb.	39. Hir. ripar.
11. Acc. Nisus.	40. " rust.
12. Circ. rufus.	41. " urb.
13. " cyanus.	42. Musc. atricap.
14. " cinerac.	43. " grisola.
15. S. Aluco.	44. Sax. Oenanthe.
16. A. Noctua.	45. Prat. rubetra.
17. N. dasypus.	46. " rubicola.
18. Str. flammea.	47. Rut. atra.
19. Otus vulgaris.	48. " phoenicura.
20. Capr. europ.	49. Turd. Merula.
21. Cyps. apus.	50. " pilaris.
22. Alc. ispid.	51. " musicus.
23. Corac. garrul.	52. L. rubecula.
24. Up. Epops.	53. " coerulec.
25. Cert. famil.	54. " Luscinia.
26. " brachid.	55. Sylv. nisoria.
27. Synx torq.	56. " cinerea.
28. Sitta caesia.	57. " Curruca.
29. Pic. viridis.	58. " hortens.

Vorkommen vieler Vögel geben dürften. Herr Förster Naumann, ich ersuche Sie hiermit auch öffentlich, die Resultate aus ihren Büchern zu ziehen, oder mir diese Arbeit aufzutragen. Mit mir bittet Sie auch Ihr Herr Bruder in Ziebigk!

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 59. Sylv. atricap.     | 94. Emb. hortul.      |
| 60. Phyll. sibilatr.   | 95. " citrin.         |
| 61. " Trochilus.       | 96. " miliar.         |
| 62. " rufa.            | 97. Fring. coelebs.   |
| 63. Hyp. vulgaris.     | 98. Pass. domest.     |
| 64. Cal. palustr.      | 99. " campestr.       |
| 65. " arundin.         | 100. L. Chloris.      |
| 66. " turdina.         | 101. " cannab.        |
| 67. " phragmit.        | 102. " carduelis.     |
| 68. " aquatica.        | 103. Cocc. vulg.      |
| 69. " Locustella.      | 104. Pyrrh. vulg.     |
| 70. Trogl. parvulus.   | 105. Col. Oenas.      |
| 71. Acc. modul.        | 106. " Palumb.        |
| 72. Par. caudatus.     | 107. " Turtur.        |
| 73. " coerul.          | 108. Tetr. Tetrix.    |
| 74. " major.           | 109. Phas. colchic.   |
| 75. " palustr.         | 110. Perd. ciner.     |
| 76. " cristat.         | 111. Coturn. comm.    |
| 77. Corv. Corax.       | 112. Otis tarda.      |
| 78. " Corone.          | 113. Oed. crepit.     |
| 79. " Cornix.          | 114. Aeg. minor.      |
| 80. " Monedula.        | 115. Van. crist.      |
| 81. Pica melanol.      | 116. Mach. pugn.      |
| 82. Garr. glandar.     | 117. Act. hypoleuc.   |
| 83. Sturn. vulg.       | 118. Tot. Glareola.   |
| 84. Oriol. Galb.       | 119. " Calidris.      |
| 85. Motac. alba.       | 120. Telm. Gallinago. |
| 86. Bud. flava.        | 121. Scol. rusticola. |
| 87. Anth. arbor.       | 122. Ard. cinerea.    |
| 88. " pratens.         | 123. Bot. minut.      |
| 89. " campestris.      | 124. " stellaris.     |
| 90. Al. nemorosa.      | 125. Cic. nigra.      |
| 91. " crist.           | 126. " alba.          |
| 92. " arvens.          | 127. Crex prat.       |
| 93. Cynchr. Schoenicl. | 128. Rall. aquat.     |

129. Gall. porz.	137. An. Boschas.
130. Stagn. chlorop.	138. " strepera.
131. Ful. atra.	139. " acuta.
132. Sterna nigra.	140. " Querqued.
133. " minut.	141. " clyp.
134. " Hirundo.	142. Plat. leucophth.
135. X. ridibund.	143. Pod. minor.
136. Ans. cinereus.	144. " cristat.

Vögel, die ich den ganzen Sommer beobachtet, deren Nester ich aber nicht aufgefunden habe.

1. Parus ater.
2. Tot. ochropus.
3. " Glottis. (?)

Vögel, die nach andern Beobachtungen hier gebrütet haben.

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 1. Falco rufip.  | 6. Gall. pygmaea.      |
| 2. Bubo maxim.   | 7. " pusilla.          |
| 3. Turd. visciv. | 8. Lar. canus. (?)     |
| 4. Tot. stagnat. | 9. An. Crecca.         |
| 5. Telm. major.  | 10. Pod. subcristatus. |

## Beitrag zur Naturgeschichte von *Fringilla serinus*

von

**Julius Hoffmann** in Stuttgart.

Als kleiner Knabe machte ich mir oft das Vergnügen, mit einem Waldkautze, deren ich immer mehrere lebendig hielt und noch halte, in den an das Haus stossenden Garten zu gehen, jenen auf einen Baum oder einen Zaun zu setzen, und, im Grase liegend, die durch den Kautz herbeigelockten Vögel zu beobachten. Unter den vielen, die Eule umgebenden kleinen Vögeln, von denen ich die meisten doch schon kannte, fiel mir ein kleines gelbgrünes Vögelchen auf, das sich regelmässig einstellte, auf den zunächst stehenden Bäumen niedersass, sich unruhig rechts und

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: [2\\_3](#)

Autor(en)/Author(s): Baldamus August Karl Eduard

Artikel/Article: [Verzeichniss der Brutvögel der Umgegend von Diebzig 55-58](#)