

*d. tenella* Schaer. — *Peltigera horizontalis* Hoffm. — *Pell. polydactyla* Hoffm. — *Ramatina calicaris d. farinacea* Schaer. — *R. pollinaria* Ach. — *R. polymorpha* Ach. — *Usnea barbata* A. a. *florida* Hoffm. et A. b. *hirta* Hoffm. — *Prasiola crispa* Rbhst.

*Andreaea atpina* Hedw. — *Aneura pinguis* Nees. — *Anomodon curtipendulum* Hook. — *Barbula ruralis* Hedw. — *Bartramia fontana* Swed. — *B. Oederi* Sw. — *B. pomiformis* Hedw. — *Bryum bimum* Schreb. — *Br. caespit. b. gracilescens* Br. Sch. — *Br. pyriforme* Hedw. — *Dicranum pellucidum* Hedw. — *D. undulatum* Ehrh. — *Eucalypta streptocarpa* Hedw. — *E. vulgare* Hedw. — *Euccladium verticillatum* Br. Sch. — *Fissidens bryoides* Hedw. *Fontinalis antipyretica* L. — *Grimia ovata* Web. M. — *Hypnum cupressif. d. fistiforme* Brid. — *H. curvatum* Sw. — *H. torenum* L. — *H. tutescens* Hedw. — *H. riparium* L. — *H. ruscifolium* Hüb n. — *H. striatum* Schreb. — *Leskea patulosa* Hedw. — *L. sericea* Hedw. — *L. trichomanoides* Hedw. — *Orthotrichum affine* Schrad. — *O. anomatum* Hedw. — *O. crispum* Hedw. — *Physomitrium pyriforme* Brid. — *Polytrichum navum* Hedw. — *Racomitrium heterostichum* Brid. — *Rivcia fluitans* L. — *Schistidium apocarp. rivulare* Nees. — *Thysanomitrium flexuos. b. saxicola* Rbhst. Sämmtliche *Cryptogamen* aus Baiern und Böhmen, eingesandt von Dr. Walther und Karl.

## Mittheilungen.

— Eine Ausstellung von Gartenproducten in Pesth hat Dr. Topperzer, aus Gr. Petersdorf, veranstaltet. Selbe umfasste 1200 Gegenstände, darunter 220 Arten Kartoffel, 100 Arten Rüben, 50 Arten Getreide u. s. w.

— Die russische geographische Gesellschaft eröffnete neuerdings ihre Sitzungen am 4. November. Die Gesellschaft steht im Begriffe mehrere Unternehmungen auszuführen, deren erste in einer Expedition nach Ost-Sibirien und Kamtschatka besteht, welcher sich mehrere bekannte Gelehrte anschliessen werden, die Forschungen in Bezug auf Landwirtschaft, Naturwissenschaft und Geologie anstellen wollen. (Nord. Bica.)

— Das Klima von Siam und sein Boden in den der Ueberschwemmung ausgesetzten Landestheilen sind der Pflanzenentwicklung sehr günstig. Der Reiss ist vortreflich. Cocounuss wird vielfach gezogen. Beakok ist von einem Walde von Fruchtbäumen umgeben, deren Erträgnisse eben so mannigfaltig als ausgesucht sind und die Früchte von Bengalen, Bombay, Ceylon und Java noch übertreffen. Die gesuchtesten Früchte sind die des Mongo, des Mongustan, des Durion, die Orangen und Ananas. Der Anbau des Zuckerrohrs hat beiläufig seit 40 Jahren unter den chinesischen Colonisten begonnen. Pfeffer, Cardamome, Tabak, Baumwolle, Gummigut, Adlerholz, Sapanholz etc. wird in grossen Mengen ausgebeutet.

— *Laurus nobilis* L. ist ein in Grossbritannien sehr gewöhnlicher Gartenbaum und zwar ist derselbe im Süden Englands in Cornwall und Irlands, in Tipperary naturalisirt, er pflanzt sich nämlich daselbst durch Früchte freiwillig fort, weiter nach Norden ist er blos noch akklimatisirt, d. h. er trägt noch Früchte, pflanzt sich jedoch freiwillig nicht mehr fort, noch nördlicher blühet er zwar, trägt aber keine Früchte mehr. Endlich an den nördlichsten Puncten seines Vorkommens in Schottland blühet er nicht einmal mehr, gedeihet blos an den Meeresküsten und kommt im Innern des Landes gar nicht mehr fort. Dabei ist der 30'/ hohe Lorbeerbaum des Südens im Norden nur noch ein kümmerlicher Strauch von 3' Höhe.

— Correspondenz. — Herrn T—i, in T—t, und B—k, in F—n: „Bereits vergriffen.“ — Herrn N.: — „Von den in Nr. 46 angeführten Werken sind vergriffen die Nummern: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 17.“

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-  
Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische  
Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: [002](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mittheilungen. 416](#)